R Holt 00050

BIBLIOTHECA
CARCINOLOGICA
L.B. Holthuis

Est. VI
Prat. II

11
Restaurar

CAROLI A LINNÉ
SYSTEMA
NATURÆ

CAROLI A LINNÉ
SYSTEMA
NATVRÆ.

CAROLI LINNÆ

SYSTEMA

NATURÆ

CAROLI A LINNÉ,

EQVITIS AVRATI DE STELLA POLARI,

ARCHIATRI REGII, MED. ET BOTAN. PROFESS. VPSAL.,
ACAD. PARIS. VPSAL. HOLM. PETROPOL. BEROL. IMPER.
LOND. ANGL. MONSPEL. TOLOS. FLORENT.
EDINB. BERN. SOC.

SYSTEMA NATVRÆ,

PER REGNA TRIA NATVRÆ,

SECVNDVM CLASSES, ORDINES, GENERA, SPECIES,
CVM CHARACTERIBVS, DIFFERENTIIS,
SYNONYMIS, LOCIS.

TOMVS QVINTVS.

EDITIO IN LVSITANIA PRIMA

CORRECTA SECVNDVM EDITIONEM DECIMAM TERTIAM,
AVCTAM, ET REFORMATAM CVRA

JO: FRID. GMELIN,

Philos. & Med. Doctor. hujus & Chem. in Georgia Augusta Prof. P. O.
Acad. Cæsar. Naturæ Curiosorum & Electoral. Moguntin. Erfordensis,
necnon Societ. Reg. Scient. Goettingensis, Physicæ Tigurin.
& Metallicæ Membri.

CONIMBRICÆ,
TYPIS ACADEMICIS A. D. CIↃDCCLXXXXIII.

*Cum facultate Regiæ Curiæ Commissionis Generalis
pro Examine & Censura Librorum.*

CLASSIS V.

INSECTA.

In his tam parvis, atque tam nullis
Quæ ratio! quanta vis!
Quam inextricabilis perfectio.

PLIN. XI. 2.

ANIMALCVLA polypoda, *spiraculis* lateralibus respirantia, *cute* cataphracta aut pilis hirta; *antennis* mobilibus sentientibus instruuntur.

CORPVS horum dividitur in *caput*, *truncum*, *abdomen*, *artus*.

CAPVT plerisque distinguendum *instruitur* cerebro minuto, oculis, antennis, sæpius ore; *destituitur* naribus, auribus, etsi nonnullis certe evidenter competat olfactus & auditus.

Oculi plerisque bini, absque palpebris, simplices parvi, aut compositi magni hemisphærici vel polyedri, rarius mobiles aut stipitati; his vident colores.

Antennæ binæ, articulatæ, sensu tactus, ut videtur, instructæ, sunt *setaceæ*, *filiformes*, *moniliformes*, *clavatæ*, *capitatæ*, *fissiles*, *pectinatæ*, *barbatæ*, corpore *breviores*, *longiores*, *mediocres*.

Pal-

Palpi articulati, ori affixi, plerisque quatuor ſ. ſex: articulis 2, 3, 4.

Os paucioribus nullum, plurimis ſub capite, quibuſdam in pectore; *roſtro*, *labio*, *maxillis* tranſverſis ad latera mobilibus, *dentibus*, *lingua*, *palato*.

Stemmata verticis puncta tria elevata nitida.

TRVNCVS, inter caput & abdomen, pedatus, *thorace* ſupra *dorſo*, poſterius *ſcutello*, ſubtus *pectore ſternoque*.

ABDOMEN ventriculo, inteſtinis, viſceribusque fœtum, inciſuris 5, annulatum, *ſpiraculis* poroſis, lateribus pertuſum, ſupra *tergo*, ſubtus *ventre*, poſterius *ano* terminatum.

ARTVS ſunt *cauda*, *pedes*, plurimisque *alæ*.

Cauda abdomen terminans, cit vel *ſolitaria*, vel *bicornis*; ſimplex vel armata *forcipe*, *furca*, *ſeta* vel *aculeo* ſimplici vel compoſito, lævi vel ſerrato.

Pedes trunci *femoribus*, *tibiis*, plantæ *tarſis*, digitorum *unguibus*; manus (*chela*) nonnullis, ſimplex pollice mobili; poſteriores pro uſu *ſaltatorii*, *curſorii*, *natatorii*.

Alæ duæ vel quatuor ſunt vel *planæ*, *plicatiles*, *erectæ*, *patentes*, *incumbentes*, *deflexæ* vel *reverſæ*, *dentatæ*, *caudatæ*, *reticulatæ*, *maculis*, *faſciis*, *ſtrigis*, *lineis*, *punctis* pictæ, vel *ſtigmatibus* notatæ, *ocellis* ornatæ, idque vel in *primoribus* vel in *ſecundariis*, tam in *pagina ſuperiore*, quam *inferiore*.

Elytra (alæ ſuperiores) cruſtaceæ bina, ſæpius mobilia, *truncata*, *ſpinoſa*, *ſerrata*, *ſcabra*, *ſtriata*, *porcata*, *ſulcata*, *punctata*, tegentia alas inferiores. *Hemelytra* media quaſi alas inter & elytra.

Halteres ſub alis dipterorum ex petiolo capitati.

SEXVS *Mas* & *Femina* generant perfecta.

Neutra nonnullis (formicæ, veſpæ, api) ſocietate fœderatis.

ME-

METAMORPHOSIS plurimis triplex, mutanda ſtructura, exutis ovi tunicis, una poſt alteram.

OVVM ſub minima mole veſicaria excluditur.

LARVA (Eruca) ſuccoſa, mollior, major, aptera, ſterilis, tardior, interdum apus, ſæpeque polypus, vorax alimento proprio.

PVPA (Nympha, Chryſalis) ſiccior, coarctata, durior, *nuda* vel *folliculata*, ſæpe ſine ore, vel *pedata* 1, 2, 3, vel *apus* 4, 5.

1. *completa*, omnibus partibus agilis (aranea, acarus, oniſcus.)
2. *ſemicompleta* ſolis alarum rudimentis (gryllus, cicada, cimex, libellula, ephemera.)
3. *incompleta*, alis pedibusque immobilis (apis, formica, tipula.)
4. *obtecta*, thorace abdomineque diſtincto corticata (lepidoptera) eaque vel nuda, vel folliculata.
5. *coarctata* intra globum (muſca, œſtrus.)

IMAGO revelata, declarata, perfecta generans, agilis, antennis inſtructa.

Triplex itaque ſtructura & cognitio ejuſdem animalis.

HÆC *muta*, niſi alio proprio inſtrumento, tympano thoracico, alisve ſonora; *ſarda*, (pleraque) ſtridorem ætheris licet percipiant; *plura* ubique plantarum ſpeciebus, ſed ob regionem ſibi magis patentem in orbe pauciora, *tropica*, *arctica* & *antarctica*; ſingula demum *minima*, annua, exceptis aquaticis aliisque paucioribus, ſed univerſa maximæ molis animantia, effectuque pariter maxima, & magis occulto magisque diſperſo, ideoque minus coercendo; totidem enim ſunt naturæ annui miniſtri, propriis negotiis peragendis præfixi, quot muniis ſufficiant, proportionem inter plantas ſervando, erronea, ſuperflua, mor-

---

Verboſitas præſente ſeculo calamitas artis inſectorum, ut pauciloquium vermium.

mortua, putrida, consumendo, aliis demum, imprimis avibus, in alimentum cedendo.

HABITANT insecta in iis tantum plantis, e quibus (non in quibus) victitant, unde sæpius nomina *trivialia* optima, ut ars cum *politia naturæ* combinetur; aliis alia muneribus præfixa præparant, purgant, destruunt necessaria.

ENTOMOLOGI præstantiores delineando figuras, designando attributa & characteres, disponendo ordines inclaruere.

Veteres *Mouffet*, *Aldrovandi*, *Jonston*, *Raj.*

Metamorphosii *Goedart*, *Meriana*, *Albin*, *Frisch*, *Roesel*, *Wilkes*, *Kleemann*, *Ammiral*, *Harris.*

Philosophi *Swammerdam*, *Lesser*, *Reaumur*, *de Geer*, *Bonnet*, *Lyonnet*, *Goeze*, *Koch.*

Iconographi *Clerck*, (*) *Sepp*, *Roesel*, *Hœffnagel*, *Bradley*, *Robert*, *Petiver*, *Schæffer*, *Voet*, *Fuessli*, *Holtar*, *Amiral*, *Drury*, *Cramer*, *Esper*, *Knoch*, *Jablonsky*, *Bergstræsser*, *Herbst*, *Capieux.*

Descriptores *Rai*, Fauna suecica, (*edit.* 2. *Holm.* 1761. 8.) Museum Reginæ *Holm.* 1764, *Kœlreuter*, *Pallas*, *Thunberg*, *Schranck*, *a Laicharting*, *Schreber*, *J. R. Forster*, *Pollich*, *Lang*, *Harrer*, *Bjercander*, *Knoch*, *Schaller*, *Scriba*, *Schrœter*, *Mayer.*

Monographi *Lister*, *Schaffer*, *Clerck*, *v. Gleichen*, *O. Fr. Muller*, *Herbst*, *Kob*, *Lofelge*, *Panzer.*

Systematici *Systema naturæ*, *Poda*, *Sulzer*, *Geoffroi*, *Scopoli*, *Gronovius*, *T. Bergmann*, *de Geer*, *Schluga*, *Brunnich*, *Schiefermuller*, *Fabricius.*

OR-

(*) Clerckii icones insectorum *pulcherrimum opus, quod Academia Regia scientiarum Holmiensis ab interitu vindicavit.*

ORDINES insectorum ab alis desumpti.

Alæ 4.	Superiores	crustaceæ	futura recta —	*Coleoptera*	1.
		semicrustaceæ	incumbentes	*Hemiptera*	2.
	Omnes	imbricatæ	squamis —	*Lepidoptera*	3.
		membranaceæ	inermi	*Neuroptera*	4.
		ano	aculeato	*Hymenoptera*	5.
Alæ 2, halteres loco posteriorum			— —	*Diptera*	6.
Alæ 0 s. absque alis & elytris			— —	*Aptera*	7.

Quæso ne hæc legentes,
quoniam in his spernunt multa,
etiam relata fastidio damnent,
cum in contemplatione naturæ
nil possit videri supervacaneum.

PLIN.

CHA-

CHARACTERES INSECTORVM.

I. COLEOPTERA.

* *Antennis clavatis extrorſum incraſſatis.*

a) *clava* lamellata.

189. SCARABÆVS. *Tibiæ* anteriores dentatæ.
190. LVCANVS. *Penicilli* duo ſub labio palpigeri.

b) *clava perfoliata.*

191. DERMESTES. *Caput* inflexum ſub thorace vix marginato.
MELYRIS. *Labium* clavatum, emarginatum.
195. BYRRHVS. *Labium* porrectum, bifidum.
196. SILPHA. *Thorax* & *elytra* marginata.
TRITOMA. *Palpi* anteriores ſecuriformes.
HYDROPHILVS. *Maxillla* bifida.

c) clava *ſolida.*

193. HISTER. *Caput* retractile intra thoracem.
PAVSVS. *Antennæ* biarticulatæ: clava uncinata.
BOSTRICHVS. *Caput* inflexum ſub thorace vix marginato.
ANTHRENVS. *Maxilla* bifida.
NITIDVLA. *Thorax* & *elytra* marginata.
198. COCCINELLA. *Palpi* anteriores ſecuriformes, poſteriores filiformes.
202. CVRCVLIO. *Roſtrum* elongatum corneum.

** *Antennis moniliformibus.*

BRENTVS. *Roſtrum* elongatum, corneum, rectum.

203. ATTELABVS. *Roſtrum* elongatum, incurvum.
ERODIVS. *Labium* corneum, emarginatum.
217. STAPHYLINVS. *Elytra* dimidiata, alas tegentia. *Veſiculæ* 2 *ſupra caudam exſerendæ.*
SCAVRVS. *Labium* truncatum, integrum.
ZYGIA. *Labium* elongatum, membranaceum.
215. MELOE. *Thorax* ſubrotundus. *Caput* gibbum, inflexum.
214. TENEBRIO. *Thorax* marginatus. *Caput* exſertum. *Corpus* oblongum.
197. CASSIDA. *Cornua* ovatum. *Elytra* marginata. *Caput* tectum clypeo.
OPATRVM. *Thorax & elytra* marginata.
216. MORDELLA. *Laminæ* ad baſin abdominis. *Caput* inflexum.
199. CHRYSOMELA. *Corpus* ovatum, immarginatum.
HORIA. *Palpi* inæquales. *Maxillæ* bifida. *Labium* rotundatum.

*** *Antennis filiformibus.*

APALVS. *Thorax* ſubrotundus. *Caput* gibbum, inflexum.
MANTICORA. *Maxillæ* exſertæ, dentatæ. *Oculi* prominuli.
PIMELIA. *Thorax* marginatus. *Caput* exſertum. *Corpus* oblongum.
194. GYRINVS. *Antennæ* rigidulæ. *Oculi* 4.
CVCVJVS. *Labium* breve, bifidum: laciniis diſtantibus.
CRYTOCEPHALVS. *Corpus* ovatum, immarginatum.

201.

Genera *naturalia auctorum*, metamorphoſi demonſtranda, vitam ſcientiæ largiebantur.

Genera *falſa tironum*, ex iudicio principio deducta, totidem fœtidiſſimis ulceribus artem pulcherrimam commacularunt.

201. BRVCHVS. *Antennæ* extrorſum craſſiores.
192. PTINVS. *Thorax* caput recipiens. *Antennæ* articulis ultimis longioribus.
200. HISPA. *Antennæ* porrectæ, approximatæ, filiformes.
211. BVPRESTIS. *Caput* dimidium intra thoracem rectum.
206. NECYDALIS. *Elytra* dimidiata: alis nudis.
207. LAMPYRIS. *Elytra* flexilia: *Thoracis* clypeus caput obumbrans recipiensque.
208. CANTHARIS. *Elytra* flexilia. *Abdomen* lateribus plicato-papilloſum.
NOTOXVS. *Labium* bifidum: laciniis conniventibus obtuſis.
209. ELATER. *Pectoris* mucro e poro abdominis reſiliens.
CALOPVS. *Thorax* ad latera mucronato-calloſus.
ALVRNVS. *Maxilla* fornicata.
213. CARABVS. *Thorax* obcordatus, poſterius truncatus.
LYTTA. *Thorax* ſubrotundus. *Caput* gibbum, inflexum.

**** *Antennis ſetaceis.*

SERROPALPVS. *Palpi* anteriores profunde ſerrati.
204. CERAMBYX. *Thorax* ad latera mucronato-calloſus.
205. LEPTVRA. *Elytra* apice attenuata. *Thorax* teretiuſculus.
RHINOMACER. *Antennæ* roſtro inſidentes.
ZONITIS. *Labium* emarginatum.
210. CICINDELA. *Maxillæ* exſertæ dentatæ. *Oculi* prominuli.

212. DYTISCVS. *Pedes* posteriores ciliati, natatorii.

218. FORFICVLA. *Elytra* dimidiata : alis tectis. *Cauda* forcipata.

II. HEMIPTERA.

219. BLATTA. *Os* maxillosum. *Alæ* coriaceæ, planæ. *Pedes* cursorii.

PNEVMORA. *Os* maxillosum. *Alæ* membranaceæ, deflexæ. *Pedes* cursorii. *Corpus* cavum inflatum, diaphanum.

220. MANTIS. *Os* maxillosum. *Pedes* anteriores ferrati : ungue unico.

221. GRYLLVS. *Os* maxillosum. *Pedes* posteriores saltatorii.

222. FVLGORA. *Rostrum* inflexum. *Frons* producta, inermis. *Antennæ* capitatæ.

223. CICADA. *Rostrum* inflexum. *Pedes* posteriores saltatorii.

224. NOTONECTA. *Rostrum* inflexum. *Pedes* posteriores natatorii (ciliati.)

225. NEPA. *Rostrum* inflexum. *Pedes* anteriores cheliferi.

226. CIMEX. *Rostrum* inflexum. *Pedes* cursorii. *Antennæ* thorace longiores.

MACROCEPHALVS. *Rostrum* inflexum. *Antennæ* breviſſimæ.

227. APHIS. *Rostrum* inflexum. *Abdomen* bicorne.

228. CHERMES. *Rostrum* pectorale. *Pedes* posteriores saltatorii.

229. COCCVS. *Rostrum* pectorale. *Abdomen* (maribus) posterius setosum.

230. THRIPS. *Roſtrum* obſoletum. *Alæ* incumbentes abdomini reflexili.

III. LEPIDOPTERA.

231. PAPILIO. *Antennæ* extrorſum craſſiores. *Alæ* erectæ.

232. SPHINX. *Antennæ* medio craſſiores.

233. PHALÆNA. *Antennæ* introrſum craſſiores.

IIII. NEVROPTERA.

234. LIBELLVLA. *Cauda* forcipata. *Os* multi-maxilloſum. *Alæ* extenſæ.

235. EPHEMERA. *Cauda* ſetis 2-3. *Os* edentulum. *Alæ* erectæ.

238. MYRMELEON. *Cauda* forcipata. *Os* bidentatum. *Alæ* deflexæ.

236. PHRYGANEA. *Cauda* ſimplex. *Os* edentulum. *Alæ* deflexæ.

237. HEMEROBIVS. *Cauda* ſimplex. *Os* bidentatum. *Alæ* deflexæ.

239. PANORPA. *Cauda* chelata. *Os* roſtratum. *Alæ* incumbentes.

240. RAPHIDIA. *Cauda* filo 1. *Os* bidentatum: *Alæ* deflexæ.

V. HYMENOPTERA.

241. CYNIPS. *Aculeus* ſpiralis!

242. TENTREDO. *Aculeus* ſerratus! bivalvis.

243. SIREX. *Aculeus* ſerratus ſub abdominis ſpina terminali.

244. ICHNEVMON. *Aculeus* exſertum! triplex.

245. SPHEX. *Aculeus* punctorius. *Alæ* planæ. Lingua *inflexa trifida*.

SCOLIA. *Lingua* inflexa, trifida. *Labium*

bium apice membranaceum.

THYNNVS. *Lingua* breviſſima, involuta. *Labium* trifidum.

LEVCOPSIS. *Labium* maxilla longius emarginatum. *Antennæ* clavatæ.

TIPHIA. *Labium* breve, corneum, tridentatum.

CHALCIS. *Antennæ* breves, cylindricæ, foſiformes.

246. CHRYSIS. *Aculeus* punctorius. *Abdomen* ſubtus fornicatum.

247. VESPA. *Aculeus* punctorius. *Alæ* ſuperiores plicatæ.

248. APIS. *Aculeus* punctorius. *Lingua* inflexa.

249. FORMICA. *Aculeus* obſoletus. *Alæ* neutris nullæ.

250. MVTILLA. *Aculeus* punctorius. *Alæ* neutris nullæ.

VI. DIPTERA.

* *proboſcide & hauſtello.*

DIOPSIS. *Caput* bicorne: oculis terminalibus.

252. TIPVLA. *Hauſtellum* ſine vagina. *Palpi* 2. porrecti, filiformes.

253. MVSCA. *Hauſtellum* ſine vagina, ſetis inſtructum.

254. TABANVS. *Hauſtellum* vagina univalvi ſetisque inſtructum.

256. EMPIS. *Proboſcis* inflexa.

257. CONOPS. *Proboſcis* porrecta, geniculata.

** *hauſtello ſine proboſcide.*

251. OESTRVS. *Hauſtellum* retractum intra labia connata, poro pertuſa.

258. ASILVS. *Hauſtellum* rectum, bivalve, baſi gibbum.

STOMOXYS. *Hauſtellum* vagina univalvi convoluta, baſi geniculata.

255. CVLEX. *Vagina* exſerta, univalvis, flexilis: ſetis 5.

259. BOMBYLIVS. *Hauſtellum* longiſſimum, rectum, ſetaceum, bibalve.
260. HIPPOBOSCA. *Hauſtellum* breve, cylindricum, rectum, bivalve.

VII. APTERA.

* *Pedibus ſex, capite a thorace diſcreto.*

261. LEPISMA. *Cauda* ſetis exſertis.
262. PODVRA. *Cauda* bifurca, inflexa, ſaltatrix.
263. TERMES. *Os* maxillis duabus. *Labium* corneum, quadrifidum.
264. PEDICVLVS. *Os* aculeo exſerendo.
265. PVLEX. *Os* roſtro inflexo cum aculeo. *Pedes* ſaltatorii.

** *Pedibus* 8-14, *capite thoraceque unitis.*

266. ACARVS. *Oculi* 2. *Pedes* 8. *Palpi* compreſſi.
HYDRACHNA. *Oculi* 2-8. *Pedes* 8 in anteriore corporis parte. *Papillæ* textoriæ.
268. ARANEA. *Oculi* 8. *Pedes* 8. *Papillæ* textoriæ. *Palpi* clavati.
267. PHALANGIVM. *Oculi* 4. *Pedes* 8. *Palpi* chelati.
269. SCORPIO. *Oculi* 8. *Pedes* 8. *Palpi* chelati.
270. CANCER. *Oculi* 2. *Pedes* 10: primo chelato.
271. MONOCVLVS. *Oculi* 2. *Pedes* 12: decem chelatis.
272. ONISCVS. *Oculi* 2. *Pedes* 14.

*** *Pedibus pluribus, capite a thorace diſcreto.*

273. SCOLOPENDRA. *Corpus* lineare.
274. JVLVS. *Corpus* ſubcylindricum.

In nova fert animus mutatas dicere formas corpora.

OR-

ORDO. I. COLEOPTERA.

Elytra alas tegentia.

189. SCARABÆUS. *Antennæ* clavatæ: clava lamellata.
Palpi 4.
Mandibula corneæ *subedentula.*
Tibiæ anteriores sæpius dentatæ.

* *palpis filiformibus.*
† *mandibula arcuata.*
a) *plane edentula*, Scarabæi Fabricii.
ℵ) *thorace cornuto.*
a) *scutellati.*

Hercules. 1. Sc. thoracis cornu incurvo maximo: subtus barbato unidentato, capitis recurvato: supra multidentato. *Mus. Lud. Ulr.* 3. *Gronov. zooph.* 412. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 1. *f.* 1. 2. *Voet. coleopt. t.* 12. *f.* 98. *Drury inf.* 1. *t.* 30. *f.* 1. 2. *Aubent. misc. t.* 41. *f.* 2. *Fabric. spec. inf.* 1. *p.* 4. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 3. *n.* 1.
Marcgr. braf. 247. *f.* 3. Taurus volans s. Eruma.
Jonst. inf. t. 16. *f.* 1.
Olear. mus. t. 16. *f.* 1.
Petiv. gazoph. t. 70. *f.* 1. Rhinoceros americanus cinereus, rostro nigro nitente.
Edw. glean. t. 334.
Grew. mus. 162.
Roes. inf. 11. *Koef.* 1. *t.* A. *f.* 1. *inf.* IV. *p.* 45. *t.* 5. *f.* 3.

Degeer inſ. 4. *p.* 304. *n.* 2. *t.* 18. *f.* 9. Scarabæus ſcutellatus niger, &c.
Habitat in America, *varians elytris piceis & glaucis nigropunctatis.*
Femina mutica.

Alcides. 91. Sc. thoracis cornu incurvo ſubtus barbato unidentato, capitis recurvato mutico. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 3. *n.* 2.
Habitat in India, *Hercule duplo minor, an ejus varietas?*

Gideon. 2. Sc. thoracis cornu incurvo maximo ſubtus lævi apice bifido, capitis recurvato ſupra unidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 3. *n.* 3. *Gron. zooph.* 413. *Voet. coleoptr. t.* 12. *f.* 100. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 1. *f.* 3.
Edw. av. t. 40.
Roeſ. inſ. 2. *Kæf.* 1. *t.* A. *f.* 5.
Swammerdam bibl. nat. t. 30. *f.* 2.
Aubent. miſc. t. 40. *f.* 3.
Habitat in America *auſtrali & India, an vere a* præcedentibus *diverſus?*

Centaurus. 92. Sc. thoracis cornu incurvo baſi bidentato apice bifido, capitis recurvato unidentato. *Fabric. ſp. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 3. *n.* 4. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 2. *f.* 1.
Drury Inſ. 1. *t.* 36. *f.* 1. Scarabæus Gideon.
Habitat in India & Africa.

Oromedon. 93. Sc. thoracis cornu brevi emarginato, capitis recurvato bifido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 5. *Drury inſ.* 1. *t.* 36. *f.* 5. *Aubent. miſc.* 1. *t.* 40. *f.* 4. *Voet coleopt. t.* 13. *f.* 102. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat in America *auſtrali & India.*

Æ geon.

Ægeon. 94. Sc. rufus, thoracis cornu brevi incurvo subtus barbato, capitis recurvo subulato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 6. *Drury inſ.* 2. *t.* 30. *f.* 5. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 1. *f.* 4.
Habitat in America *auſtrali &* India.

diſpar. 95. Sc. cornu (in mare) thoracis ſubulato protenſo, capitis ſubulato ſubrecurvo, ſcutello cordato. *Fabric. ſp. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 7. *Jablonsk. Kaf.* 1. *t.* 2. *f.* 3. 4.
Pall. it. I. *p.* 461. Scarabæus polyceros.
Pall. it. III. *p.* 707. *ic. inſ. Ruſſ. indig.* 1. *t.* A. *f.* 8. A. B.
Habitat in regionibus Ruſſici *imperii magis auſtralibus, ater, ſtercorarii magnitudine.*
Feminæ nec thorax, nec caput cornutum, ſed utrumque antrorſum bidentatum.

Chorinæus. 96. Sc. thoracis cornu incurvo baſi craſſiſſimo apice bifido, capitis longiori recurvo bifido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 8. *mant.* 1. *p.* 4. *n.* 8. *Voet coleopt. t.* 13. *f.* 104. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 2. *f.* 5.
Habitat in Bralma, *ſani affinis.*

dichotomus. 89. Sc. thoracis cornu bidentato, capitis dichotomo, elytris rufis. *Mant* 1. 529. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 9. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 2. *f.* 6.
Aubent. miſc. t. 40. *f.* 5.
Voet coleopt. t. 14. *f.* 107.
Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 1.
Habitat in America *auſtrali &* India.

clavi-ger. 90. Sc. rufus, thoracis cornu elevato, capitis ſubulato recurvo. *Mant.* 1. 529. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 10.
Aubent. miſc. 1. *t.* 40. *f.* 1.
Drury inſ. 3. *t.* 48. *f.* 3.

Voet coleoptr. t. 14. *f.* 108.
Habitat in America *auſtrali &* India.

haſtatus. 97. Sc. thoracis cornu brevi fornicato haſtato ſubtus hirto, capitis recurvo. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 11.
Habitat in America *meridionali.*

Enema. 98. Sc. thoracis cornu incurvo ſimplici baſi craſſiſſimo, capitis recurvo bifido. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 12.
Habitat in India, *pani affinis.*

Pan. 99. Sc. thoracis cornu incurvo baſi craſſiſſimo apice bifido, capitis recurvo unidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 12. *mant.* 1. *p.* 4. *n.* 13.
Habitat in America *auſtrali &* India.

Jaſon. 100. Sc. thoracis cornu craſſiſſimo apice emarginato, capitis unidentato trifido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 15. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 3. *f.* 3.
Swammerd. bibl. nat. t. 30. *f.* 5.
Voet coleoptr. t. 13. *f.* 103.
Aubent. miſc. t. 15. *f.* 4.
Habitat in Sina, *Chorinæo affinis.*

validus. 101. Sc. thorace anterius retuſo: cornu conico breviſſimo, capite bituberculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 16.
Habitat in Braſilia, *rhinocerotis magnitudine.*

truncatus. 102. Sc. thorace retuſo, cornu brevi truncato, capite mutico. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 17.
Habitat in nova Seelandia, *naſicornis magnitudine.*

Eu-

Eurytus. 103. Sc. thorace anterius retuſo : cornu brevi incumbente emarginato, capite mutico. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 18.
Habitat in America, *niger.*

Actæon. 3. Sc. glaber, thorace bicorni, capitis cornu unidentato apice bifido, elytris lævibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 4. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 18. *mant. inſ. p.* 5. *n.* 19. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 3. *f.* 4.
Marcgr. braſil. 246. Enema.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* A. *f.* 2.
Swammerd. bibl. nat. t. A. *f.* 2.
Petiv. gazoph. t. 15. *f.* 12.
Seb. muſ. 4. *t.* 90. *f.* 3. 4.
91. *f.* 3.
Aubent. miſc. t. 5. *f. inf.*
Voet coleoptr. t. 16. *f.* 111. 112.
Merian. ſur. t. 72.
Huffn. pict. 1. *t.* 1.
Habitat in America, *omnium hactenus cognitorum inſectorum, cancris monoculisque exceptis, maximum.*
Thoracis *cornua antrorſum verſa, conica.*

Simſon. 4. Sc. thorace bicorni, capitis cornu apice bifido clypeo denticulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 5. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 20.
Habitat in America *auſtrali* & India, *actæoni affinis, at quadruplo minor, ſupra lævis, piceus.*
Caput *anterius bidentatum*; thoracis *cornua lanceolata, porrecta, non capite, ſed cornu capitis longiora.*

Elephas. 104. Sc. villoſus, thorace gibbo bicorni, capitis cornu unidentato apiceque bifido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 20. *mant. inſ. p.* 5. *n.* 21.
Olear. muſ. t. 16. *f.* 2.
Habitat in Guinea, *actæni affinis, at villoſus.*

Boas.

Boas. 105. Sc. thorace retuſo excavato bidentato, capitis cornu recurvo ſimplici. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 22.
Habitat ad Sierra Leona.

Coryphæus. 106. Sc. thorace bicorni, corpore ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 23.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *vernalis magnitudine & ſtatura.*

bicornis. 107. Sc. thorace bicorni, capitis cornu recurvo unidentato, elytris rufis. *Lesk. Anf. der Naturg.* 1. *t.* 9. *f.* 1. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 4. *f.* 1. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 24.
Aubent. miſc. t. 15. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali*, *naſicornis magnitudine.*

Tityus. 5. Sc. thoracis cornu intermedio maximo ſimpliciſſimo, capitis cornu recurvato ſimpliciſſimo. *Amoen. ac.* 6. *p.* 39. *n.* 1.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 8. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 26. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 4. *f.* 2. Scarabæus ſcutellatus glaucus, thorace tricorni: lateralibus breviſſimis ſubulatis, medio ſubtus barbato, capitis cornu recurvato ſimpliciſſimo.
Gron. zooph. t. 14. *f.* 8. Scarabæus thorace tricorni lævi: intermedio maximo incurvo ſubtus barbato, capitis cornu maximo recurvo.
Aubent. miſ. 1. *t.* 14. *f.* 8.
Voet Kæf. t. 12. *f.* 99.
Degeer inſ. 4. *t.* 18. *f.* 10.
Habitat in America, *herculi ſimilis*, *at parvus.*

Ely-

Scarabæorum *larvæ* roxapodes *annulatæ*, *piloſæ*, *abdominis apice veſiculoſo*, *capite cornu inſtructæ*, *vivunt tres*, *ille*, *ſub terra*, *plurimæ ſimo deleſtantur & paſcuntur*, *ceteraram ligno putrefcente*, *melolonthiarum radicibus plantarum*; *pupæ intra glebam quieſcentes.*

Elytra *nunc nigra glauco-maculata, nunc glauca, nigro-maculata.*

Atlas. 6. Sc. thorace tricorni: anteriore breviſſimo, capitis cornu adſcendente. *Muſ. Lud. Ulr.* 6.
Fabr. ſpec. inſ. 1. *p.* 9. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 27. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 4. *f.* 5.
Maregr. braſ. 247. *f.* 1.
Edw. av. t. 105. *f.* 1.
Olear. muſ. t. 16. *f.* 3.
Merian. furin. in tit. F. G.
Swammerd. bibl. t. 30. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 15. *f.* 109. 110.
Sulz-inſ. t. 1. *f.* 1.
Habitat in America *magis auſtrali.*

Geryon. 108. Sc. thorace excavato tricorni, lateralibus compreſſis unidentatis, capitis recurvo ſimplici.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 9. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 28. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 4. *f.* 5.
Drury inſ. 2. *t.* 30. *f.* 6.
Habitat in America *auſtrali* & India.

Aloeus. 7. Sc. thorace tricorni: intermedio longiori ſimplici, capite ſubmutico, elytris uniſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 7. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 5. *n.* 29. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 4. *f.* 3.
Degeer inſ. 4. *p.* 302. *n.* 1. Scarabæus Scutellatus niger, thorace tricorni: intermedio longiori truncato.
Rœſ. inſ. 2. *Scarab.* 1. *t.* A. *f.* 6.
Petiv. gazoph. t. 24. *f.* 10.
Aubent. miſc. t. 5. *f.* 1.
Voet Kaef. t. 18. *f.* 122. (mas) & *t.* 19. *f.* 122. (femina.)
Habitat in America, *naſicorni ſimillimus, at triplo major, tibiis anterioribus quinquedentatis.*

An-

Antæus. 109. Sc. thorace tricorni : intermedio longiori ſimplici, capite mutico, elytris lævissimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 30. *Jablonsk. Kaef.* 1. *t.* 4. *f.* 4.
Drury inſ. 1. *t.* 34. *f.* 3.
Habitat in inſulis Americæ *oppoſitis.*
Femina *mutica.*

Syphax. 110. Sc. thorace tricorni : intermedio longiori ſimplici, capite mutico, elytris punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 31.
Habitat in America, *antæo perquam affinis.*

Maimon. 111. Sc. thorace tricorni : cornubus æqualibus breviſſimis, elytris lævibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 32.
Habitat in America.

Typhæus. 9. Sc. thorace tricorni : intermedio minore ; lateralibus porrectis longitudine capitis mutici. *Muſ. Lud. Ulr.* 8.* *Gronov. zooph.* 123.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 10. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 33. *Bergſtr. Nomencl.* 1. *p.* 26. *n.* 6. *t.* 4. *f.* 6.
Jablonsk. Kæf. 1. *t.* 6. *f.* 1. 2.
Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 72. *t.* 1. *f.* 3.
Raj. inſ. 103. Scarabæus ovinus 2.
Friſch inſ. 4. *t.* 8. Scarabæus thorace cornuto.
Mouff. inſ. 152. *f.* 2. Taurocerus.
Petiv. gaz. t. 23. *f.* 3.
Schaff. icon. t. 5. *f.* 1. ♀. *t.* 26. *f.* 4. ♂.
Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 5.
Voet coleoptr. t. 19. *f.* 124. 125.
Habitat in Europa, *ſub ſtercore bovino ſub terra cuniculos profundos fodiens, nidulans, ſtercorarii magnitudine, ater.*
Caput *depreſſum, ad latera villoſum, anguſtum*; antennarum *capitulum ſubgriſeum*; thorax *glaber*

ber, *cornubus nunc capiti æqualibus*, *nunc duplo longioribus*, *in femina exoletis*; elytra *ſtriata*; tibiæ *admodum pilo ſæ*.

Titanus. 112. Sc. thorace tricorni: intermedio longiori apice bifido; lateralibus ſubarcuatis acutis, capite mutico. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 31. *mant. inſ.* 16. *n.* 34.
Sloane jam. 2 *p.* 205. *t.* 237. *f.* 4. 5. Scarabæus major, niger tricornis.
Drury inſ. 1. *t.* 36. *f.* 3. 4. Scarabæus Simſon.
Habitat in inſulis Americæ *meridionali oppoſitis*.

Œnobarbus. 113. Sc. thorace tricorni; medio longiori emarginato; lateralibus obtuſis, capite bituberculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 35.
Habitat in America, *titani ſtatura*, *ſed minor*.

quadriſpinoſus. 114. Sc. thorace retuſo: prominentia quadridentata, capitis cornu recurvo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 38.
Habitat in Cayenna, *magnus*.

quadridens. 115. Sc. thorace quadridentato, capitis clypeo bidentato, corpore ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 39.
Habitat in India, *parvus*, *gibbus*.

obilicornis. 116. Sc. thorace quadridentato, capitis cornu recurvo mobili. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 40. *Laichart. inſ. t.* 1. *f.* 11. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 8. *f.* 6. 7.
Habitat in Anglia & Germania, *niger*.
Femina *plane mutica*; elytra *ſtriata*.

cylindricus. 11. Sc. thorace anterius truncato quinquedentato, capite anterius cornu erecto, corpore cylindrico. *Fn. ſuec.* 389.

Lai-

Laichart. inf. tyr. p. 4. n. 4. Lucanus cylindricus.
Scopol. introd. hift. nat. 5. 75. Lucanus tenebrioides.
Degeer inf. 4. t. 10. f. 2.
Voet coleoptr. t. 20. f. 131.
Habitat in Europæ *magis borealis pruno cerafo.*

Candidæ. 109. Sc. thorace excavato antrorfum cornuto tibiis anterioribus tridentatis. *Petagn. fpec. inf. Calabr. p. 3. n. 9. f.* VI. *a.* 6.
Habitat in Calabriæ *ulterioris* promontorio Lacinio. *β*) *exfcutellati.*

violaceus. 117. Sc. totus violaceus, maxillis prominentibus, fronte declivi, thorace fexfpinofa. *Lepech. it.* II. *p.* 208. *t.* 10. *f.* 13.
Habitat in Sibiria, *fub lapidibus, parvus.*
Elytra *punctis excavatis infignita.*

nemeftrinus. 118. Sc. thoracis cornubus duobus porrectis acutis, capitis erecto fubulato. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 22. *n.* 96. *mant. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 106.
Degeer inf. 7. p. 637. t. 47. f. 16. Scarabæus tricornutus.
Habitat ad Caput bonæ fpei, *jaccho affinis, fubtus hirtus.*

Œdipus. 119. Sc. thoracis cornu plano fubtus dentato, capitis truncato tridentato. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 22. *n.* 98. *mant. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 108.
Habitat ad Caput bonæ fpei.

fplendidulus. 120. Sc. thoracis ænei cornubus duobus compreffis nigris, capitis erecto apice compreffo. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 23. *n.* 100. *mant. inf.* 1. *p.* 12. *n.* 110.
Habitat in America *auftrali, carnificis magnitudine.*

fe-

festivus. 52. Sc. thorace gibbo bicorni, capitis cornu erecto, elytris rubro-æneis. *Linn. ſp. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 101. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 111.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 552. *n.* 52. *Gron. zooph.* 452. Scarabæus exſcutellatus muticus, thorace nigro-maculato, elytris rubro-æneis, ſterno porrecto.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* B. *f.* 8. (mas).
Voet coleoptr. t. 23. *f.* 5. 7.
Degeer inſ. 4. *t.* 8. *f.* 15.
Drury inſ. 3. *t.* 48. *f.* 5. (fem.)
Habitat in America, *melolonthæ magnitudine*, *at brevior*, *niger*.

Pactolus. 121. Sc. thorace bidente, capitis cornu elongato recurvo medio bidentato. *Fabr. mant.* 1. *p.* 12. *n.* 112.
Habitat in Braſilia, *mediæ magnitudinis*, *viridi-æneus*.

Pithecius. 122. Sc. thorace bicorni: cornubus breviſſimis, capitis cornu erecto ſubulato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 102. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 113.
Habitat in America *auſtrali* & India.

fenicu- lus. 123. Sc. thorace anterius, clypeo poſterius bicorni. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 103. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 114.
β) Scarabæus brevipes. *Herbſt apud Fuessl. Arch. Inſ.* 4. *p.* 10. *n.* 35. *t.* 19. *f.* 16.
Habitat in Coromandel, *bonaſi ſtatura*.

Catla. 124. Sc. thorace anterius bidentato, capitis clypeo lineis duabus elevatis tranſverſis carinatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 115.
Habitat in Coromandel, *nuchicornis magnitudine & ſtatura*, *an femina alius ſpeciei?*

Molofus. 8. Sc. thorace retuſo bidentato utrinque impreſſo, cly-

clypeo unicorni lunato integro, elytris lævibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 11. * *Amœn. ac.* 6. *p.* 391. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 118. *mant. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 134.
Drury inſ. 1. *t.* 32. *f.* 2.
Schræt. Abh. 1. *t.* 3. *f.* 3.
Degeer inſ. 4. *t.* 18. *f.* 11.
Habitat in Sina, *ibi officinalis, cornu dentibusque nunc longioribus nunc brevioribus, feminæ nullis.*
Femora *ovata.*

Roſalius. 125. Sc. thorace anterius bicorni, poſterius elevato tricorni, capitis cornu compreſſo ferrato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 104. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 116.
Habitat in America *meridionali.*

Ammon. 126. Sc. thorace tridentato, capitis cornu recurvo, elytris ſtriatis. *Linn. ſp. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 105. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 117.
Fabr. ſyſt. entom. p. 21. *n.* 83. Scarabæus Silenus.
Habitat in America.

Midas. 127. Sc. thorace tricorni, clypeo ſinuato bicorni. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 106. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 118.
Habitat in America.

Hamadryas. 128. Sc. thorace tricorni: intermedio plano acuto tridentato, clypeo reflexo bicorni. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 107. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 119.
Voet coleoptr. t. 27. *f.* 38?
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *niger.*

lunaris. 10. Sc. thorace bicorni: intermedio obtuſo bifido, capitis cornu erecto, clypeo emarginato. *Fn. ſuec.* 379. * *Scop. ent. carn.* 22. *Gron. zooph.* 453. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 108. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 120. *Fn.*

Fn. ſuec. 1. *p.* 341. Scarabæus thorace ſubmutico, capite lunato, clypeo emarginato.
Raj. inſ. 103. Scarabæus ovinus tertius.
Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 88. *n.* 1. Copris capitis clypeo lunulato, &c.
Friſch inſ. 4. *p.* 25. *t.* 7.
Raſ. inſ. 2. *ſcar.* 1. *t.* B. *f.* 2.
Pet. gaz. t. 138. *f.* 4.
Schaff. ic. t. 63. *f.* 2. 3. ♂. ♀.
Bergſtr. nomencl. t. 1. *f.* 9. & *t.* 4. *f.* 7.
Voda muſ. t. 1. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 25. *f.* 24. 25. & *t.* 26. *f.* 26.
Habitat in Europæ *ſtercoratis, aliquando minor, cornubus minoribus, feminæ in thorace conſtanter nullis.*

Rhadamiſtus. 129. Sc. thorace late foveolato; anterius cornu recurvo, capite inermi, elytris rufis: ſutura punctisque duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 109. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 121.
Habitat Tranquebariæ.

Lar. 130. Sc. thorace tridentato, capitis cornu erecto, clypeo fiſſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 124.
Habitat in India *parvus niger.*

Faunus. 131. Sc. thorace quadricorni; intermediis breviſſimis, capitis cornu recurvo ſerrato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 112. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 125.
Voet coleoptr. t. 24. *f.* 15.
Drury inſ. 3. *t.* 48. *f.* 6.
Habitat in Cayenna.
Feminæ *cornua minora: lateralia acuta.*

capucinus. 132. Sc. thorace quadridendato, capitis cornu recumbente utrinque unidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 113. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 126.
Habitat in India, *carolini magnitudine & ſtatura.*

Le-

Lemur. 133. Sc. thorace quadridentato cupreo, clypeo posterius transverso carinato, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 495. *mant. inf.* 1. *p.* 13. *n.* 127.
Schaller act. soc. Hal. nat. cur. 1. *p.* 237. Scarabæus 10-punctatus.
Habitat in Germaniæ *inferioris stercore animali, niger, statura nuchicornis.*

Camelus. 134. Sc. thorace quadridentato, clypeo posterius sub-bicorni, corpore atro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 13. *n.* 128.
Habitat in Germania.
Femina *non mutica.*

Daldorfii. 135. Sc. thorace sexdentato, clypeo rhombeo: centro prominulo, elytris lævibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 14. *n.* 129.
Habitat in India, *vernalis magnitudine.*

Bison. 27. Sc. thorace anterius mucronato, capite cornubus duobus lunaribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 115. *mant. inf.* 1. *p.* 14. *n.* 131.
Habitat in Hispania, & *australi* Gallia, *ater, stercorario minor.*
Femina *thoracis margine anteriore carinato elevato, mucroneque capitis parvo distincta.*

sagittarius. 136. Sc. thorace anterius mucronato, capitis cornu solitario erecto. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 116. *mant. inf.* 1. *p.* 14. *n.* 132.
Habitat ad caput bonæ spei.

bucephalus. 137. Sc. thorace retuso quadridentato, capitis clypeo angulato unicorni. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 26. *n.* 117. *mant. inf.* 1. *p.* 14. *n.* 133.
Habitat in America *australi* & India.

lan-

lanci-fer. 13. Sc. violaceus, thorace dentato, capitis cornu angulato, elytris fulcatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 119. *mant. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 135.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 544. *n.* 13. Scarabæus exſcutellatus violaceus, capite cornu angulato, thorace inæquali, elytris ſulcatis.
Voet coleoptr. t. 23. *f.* 1. 2. Scarabæus violaceus.
Marcgr. braſ. 247. Taurus.
Schroet. Abh. 1. *t.* 3. *f.* 4.
Habitat in America *auſtrali*, & India, *mima minor.*

Vitu-lus. 138. Sc. thorace quadridentato, occipite cornubus duobus erectis brevibus, corpore atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 127. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 145.
Habitat in Auſtria.
Femina *mutica.*

Gazel-la. 407. Sc. thorace ſubinermi æneo, occipite cornubus duobus arcuatis, elytris teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 377.
Habitat ..... *ſtatura & magnitudine Sc. Tauri.*

b) *thorace inermi, capite cornuto.*
a) *ſcutellati.*

bilobus. 12. Sc. thorace prominente bilobo, capitis cornu ſimplici, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 4. *n.* 14. *Jablonsk. Kæf.* 1. *t.* 3. *f.* 2.
Edw. av. t. 105. *f.* 2.
Gron. zooph. p. 414. *t.* 14. *f.* 1. 2.
Aubent. miſ. t. 15. *f.* 3.
Schæff. ic. t. 63. *f.* 2. 3.
Voet coleoptr. t. 14. *f.* 106.
Habitat in Europa *auſtrali*, *naſicorni ſimilis*, *piceus.*

Rhi-

Rhinoceros. 14. Sc. thorace retuſo ſubbituberculato, capitis cornu ſimplici, clypeo bifido, elytris punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 42.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 544. *n.* 14. *Muſ. Lud. Ulr.* 10. * Scarabæus ſcutellatus, thorace inermi, capite cornu ſimplici, clypeo bifido, elytris punctatis.

Petiv. gaz. t. 44. *f.* 9. & *t.* 100. *f.* 3. Rhinoceros Laconenſis, &c.

Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* A. *f.* 7.

Barrel. ic. t. 163.

Voet coleoptr. t. 18. *f.* 117. 118.

Habitat in Aſia, *piceus, ſubtus hirſutus, naſicorni ſimilis, ſed duplo major.*

Feminæ *thorax excavatus.*

naſicornis. 15. Sc. thorace prominentia triplici, capitis cornu recurvo, elytris lævibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 36. *Jablonſk. Kæf.* 1. *t.* 6. *f.* 4. 5.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 544. *n.* 15. *Fn. ſuec.* 378. *Scop. ent. carn.* 14. Scarabæus ſcutellatus, thorace prominentia triplici, capitis cornu incurvato, antennis heptaphyllis.

Mouff. inſ. 53.

Imperat. nat. 924. *f.* 1. 2. & 925. *f.* 3. 4.

Hæffn. pict. t. 13. *f. antepenult.*

Olear. muſ. 27. *t.* 16. *f.* 4.

Jacob. muſ. 1. *S.* 5.

Jonſt. inſ. t. 15. *f.* 2.

Swammerd. dibl. nat. t. 27. *f.* 1. 2.

Friſch inſ. 3. *t.* 3. *f.* 4.

Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* 7. *f.* 8. 10.

Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 68. *n.* 1.

Drury inſ. 1. *t.* 34. *f.* 7. 8.

Voet coleoptr. t. 18. *f.* 120. 121.

Habitat in Europæ *fimetis & vaporariis.*

Lar-

Larva *grisea*, *capite*, *pedibus spiraculisque rufis*, *a* Swammerdamio *pro cessu veterum habita*. Feminæ *thorax rotundatus vix retusus*.

Sylvanus. 139. Sc. thorace retuso: prominentia triplici, intermedia obsoleta, capitis cornu recurvo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p* 11. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.*6. *n.*37.
Habitat in Brasilia.

Lazarus. 140. Sc. thorace bituberculato, capitis cornu brevi emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 35. *mant. inf.* 1. *p.* 5. *n.* 25.
Habitat in Noveboraco.

Barbarossa. 141. Sc. thorace anterius scabro, capitis cornu recurvo brevi. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 12. *n.* 41. *mant. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 43.
Habitat in nova Hollandia.

Satyrus. 142. Sc. thorace anterius truncato, capitis cornu recurvo, capite longiore. *Fabr. sp. inf.*1. *p.*12. *n.* 42. *manta. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 44.
Habitat in America *septentrionali*.
Feminæ *clypeus tuberculatus*, *thorax planus*.

jamaicensis. 143. Sc. thorace anterius retuso, capitis cornu recurvo, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 13. *n.* 43. *mant. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 45.
Drury inf. 1. *t.* 34. *f.* 1. 2.
Habitat in America *meridionali*.
Femina *mutica*.

Silenus. 144. Sc. thorace anterius excavato, capitis cornu recurvo, elytris lævissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 13. *n.* 44. *mant. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 46.
Forsler cent. inf. 1. 1. 1. Scarabæus excavatus.
Voet coleopt. t. 18. *f.* 119.
Barrel. plant. Hisp. t. 163.

Scopol. delic. insubr. 1. *p.* 50. *t.* 21. *f. e.*
Habitat in Galloprovincia.

Syrichtus. 145. Sc. thorace rotundato, capitis cornu recurvo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 13. *n.* 45. *mant. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 47.
Habitat in America.

Apelles. 146. Sc. capitis cornu breviſſimo, elytris cinereis: punctis elevatis atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 13. *n.* 46. *mant. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 48.
Habitat ad caput bonæ ſpei, *parvus*, *pedibus flavis nigro-maculatis.*

Aries. 147. Sc. thorace rotundato, capitis cornu breviſſimo ſubulato. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 495. *mant. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 49.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

coronatus. 148. Sc. capitis clypeo elevato poſterius emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 13. *n.* 47. *mant. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 50.
Habitat in Java, *piceus.*

Hylax. 149. Sc. capitis cornu emarginato, tibiis poſterioribus breviſſimis apice ſpinoſis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 13. *n.* 48. *mant. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 51.
Habitat in Africa.

didymus. 19. Sc. thorace foſſula exarato, capite tricuſpidi, elytris ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 14. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 13. *n.* 49. *mant. inf.* 1. *p.* 7. *n.* 52.
Gron. zooph. 420.
Petiv. gaz. t. 27. *f.* 7.
Drury inf. 1. *t.* 32. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 19. *f.* 126.
Habitat in America.
Feminæ *thorax antrorſum mucrone parvo elevato armatus.*

Po-

Polyphemus. 150. Sc. capite tricorni : anteriore porrecto fibi. do. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 53.
Habitat in Africa, *goliatho affinis, ſed minor, elytris viriaibus macularum albarum ſerie triplici ornatis.*

Goliathus. 151. Sc. clypeo bifurco. *Mant. p.* 530. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 54.
Sulz. inſ. t. 1. *f.* 2.
Voet. coleoptr. t. 22. *f.* 51.
Drury inſ. 1. *t.* 31. & 3. *t.* 40. *f.* 1.
Habitat in Africa, *præſertim* Guinea.

Hircus. 152. Sc. thorace ſcabro, capite linea tranſverſa carinata : clypeo bidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 55.
Habitat Tranquebariæ.

farctus. 153. Sc. brunneus, capite ſubbicorni, elytris punctato-ſtriatis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 56.
Habitat in Pennſylvania.

retuſus. 154. Sc. thorace retuſo, capitis cornu brevi plano, femoribus poſterioribus incraſſatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 57.
Habitat ad caput bonæ ſpei, *naſicorni minor, niger, ſubtus ferrugineus hirtus, pedibus ruſis.*

piceus. 155. Sc. piceus, thorace glabro, capite bicorni, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 55. *mant. inſ.* 1. *p.* 7. *n.* 58. *Herbſt apud Fuessl. Arch. Inſ.* 4. *p.* 4. *n.* 6. *t.* 19. *f.* 1.
Habitat in America *auſtrali* & India, *foſſoris magnitudine.*

maurus. 30. Sc. capite mucronibus tribus, corpore violaceo,

ceo, abdomine teſtaceo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 62. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 68.
Habitat in Mauritania, *oblongus, thorace convexo.*

β) exſcutellati.

Jacchus. 156. Sc. thorace prominente bilobo, capitis cornu recurvo ſimplici. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 97. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 107.
Habitat ad caput bonæ ſpei.
Feminæ *cornu capitis breviſſimum truncatum.*

Sabæus. 157. Sc. thorace prominentia duplici, capitis cornu erecto ſimplici. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 99. *mant. inſ.* 1. *p.* 12. *n.* 109.
Habitat in Coromandel, *Jacchi ſtatura & magnitudine.*
Feminæ *cornu capitis, & thoracis tubercula minora.*

Belzebul. 158. Sc. thorace prominentia triplici, capite tricorni: intermedio majore. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 110. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 122.
Habitat in America.

bifaſciatus. 159. Sc. thorace prominentia triplici, capitis cornu erecto, elytris nigris: faſciis duabus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 111. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 123.
Habitat in Coromandel, *niger, nuchicornis magnitudine.*

Bonaſus. 160. Sc. thorace prominentia duplici, capite tricorni: lateralibus majoribus arcuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 114. *mant. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 130.
Pallas ic. inſ. Ruſſ. p. 5. *t.* A. *f.* 5.
Schræter Abh. 1. *t.* 3. *f.* 5. Scarabæus Vacca.
Habitat in India.

val-

valgus. 20. Sc. femoribus fecundi paris remotis. *Muſ. Lud. Ulr.* 15.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 27. *n.* 120. *mant. inſ. p.* 14. *n.* 136. Scarabæus (Paniſcus) thorace retuſo elevato, capitis cornu recurvo, clypeo fiſſo.
Petiv. gaz. t. 27. *f.* 8.
Roeſ. inſ. 2. *Scarab. t.* B. *f.* 2.
Habitat in America.
Elytra *brevia*; digiti *magis hirſuti*, *quam congeneribus.*

carolinus. 16. Sc. thorace retuſo, capite ovali integro unicorni, elytris ſtriatis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 27. *n.* 121. *mant. inſ.* 1. *p.*14. *n.* 137. Scarabæus capitis cornu erecto breviſſimo, clypeo integro, elytris ſulcatis.
Drury inſ. 1. *t.* 35. *f.* 2.
Voet coleoptr. t. 24. *f.* 14.
Habitat in America *boreali*, *ater*, *obtuſus*, *gibbus*, *pollicem craſſus*, *ſtatura moloſſi.*

Sphinx. 161. Sc. thorace punctis quatuor impreſſis, capite ſubcornuto, tarſis anterioribus nullis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 27. *n.*122. *mant. inſ. p.*24. *n.*138.
Pall. it. I. *p.* 462. *n.* 25. Scarabæus humeroſus.
Pall. ic. inſ. Ruſſ. 1. *p.* 4. *t.* A. *f.* 4. Scarabæus Menalcas.
Herbſt Beſch. der berl. Naturf. Fr. 4. *t.* 7. *f.* 10. *& apud Fuesſl. Arch. Inſ.* 4. *p.* 11. *n.* 37. *t.*19. *f.* 17.
Drury inſ. 1. *t.* 35. *f.* 8. Scarabæus ſpinipes.
β). Scarabæus fronte ruga, elytris ſtriis lævioſſimis. *Muſ. Lesk. p.* 1. *n.* 12.
Habitat in America *meridionali*, *& deſerto aciditſimo* mari caſpio *boream verſus finitimo*, *ſericeus ex viridi cæruleus.*

Nicanor. 162. Sc. thorace punctis quatuor impreſſis, capitis cor-

cornu recurvo bidentato, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 27. *n.* 123. *mant. inſ.* 1. *p.* 14. *n.* 139.
Drury inſ. 1. *t.* 35. *f.* 1. Scarabæus ſulcatus.
Habitat in America.

Fricator. 163. Sc. thorace anterius elevato acuto, capitis cornu truncato ſubemarginato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 140.
Habitat in India, *totus ater, nitidus, nicanoris magnitudine.*

Mimas. 17. Sc. thorace retuſo angulato, capite obſolete bicorni, elytris inauratis ſtriatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 9. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 124. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 141.
Sulz. inſ. t. 1. *f.* 4. *Voet coleoptr. t.* 23. *f.* 4. Copris viridis ſplendens.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* B. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, clypeo integro.*

hiſpanus. 21. Sc. clypeo cornuto emarginato, elytris ſtriatis, femoribus ſecundis remotiſſimis. *Muſ. Lud. Ulr.* 12. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 130. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 148.
Pet. gazoph. t. 8. *f.* 4.
Voet coleoptr. t. 24. *f.* 13.
Habitat in Barbaria *& auſtraliore* Europa, *lunari ſimilis, ſed major, clypei inciſura a molaſſo diſtinctus.*

tridens. 164. Sc. thorace cupreo, capite baſi tridentato, elytris nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 129. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 147.
Habitat in Africa *æquinoctiali, niger, carnificis magnitudine.*

carnifex. 22. Sc. thorace plano angulato ſcabro, capitis cornu

nu inflexo, corpore æneo. *Gron. zooph.* 450.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 129. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.*15. *n.* 146. Scarabæus exſcutellatus, thorace inermi angulato, capitis cornu reflexo, corpore æneo.
Catesb. Car. 3. *t.* 11. *f.* ult.
Drury inſ. 1. *t.* 35. *f.* 3-5.
Voet coleoptr. t. 26. *f.* 31. 32.
Habitat in America, *ſtercorario brevior, latus, depreſſus; formatam e ſtercore pilulam conjunctis gregatim viribus per totam æſtatem volvens volutansque, etiam non ſuam uſque in foveam determinatam, uti pilularis.*
Cornu *retrorſum poſitum nigrum, lævе, feminæ obſoletum.*

ſpinifex. 165. Sc. thorace rotundato, occipite ſpina recurva. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 131. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 145.
Habitat in Coromandel, *niger viridi-nitens, nuchicornis ſtatura & magnitudine.*

nuchicornis. 24. Sc. thorace rotundato, occipite ſpina erecta armato. *Fn. ſuec.* 381.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 132. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 150.
It. gœlt. 41. Scarabæus capite thoraceque atro opaco, elytris cinereis nigro-nebuloſis.
Raj. inſ. p. 103. *n.* 2. Scarabæus ovinus tertius.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 89. *n.* 3. (*mas*) & (*fem.*) 4.
Voet coleopt. t. 25. *f.* 18.
Gronov. zooph. 454.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* A. *f.* 4.
β) Scarabæus cœnobita. *Herbſt apud Fuesſl. Arch. Inſ.* 4. *p.* 11. *n.* 40. *Voet coleopt. t.* 25. *f.* 18.
Habitat in Europæ *ſtercore.*
Femina *mutica.*

Capra. 166. Sc. occipite ſpina erecta gemina, corpore nigro obſcuro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 144.

Ha-

Habitat Halæ Saxonum, *vaccæ ſtatura & magnitudine.*

Vacca. 25. Sc. thorace acuminato, occipite ſpina erecta gemina.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 28. *n.* 126. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 143.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 90. *n.* 5.
Schæff. inſ. t. 73. *f.* 4. 5. ♂. ♀.
Schroet. Abh. 1. *t.* 3. *f.* 5.
Habitat in Europa *temperata, nuchicorni thorace æneo, elytrisque fuſcis, capræ ſpina occipitis gemina ſimilis.*

Taurus. 26. Sc. occipite cornubus binis reclinatis arcuatis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 28. *n.* 126. *mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 142. *Schreber inſ. t.* 1. *f.* 6. 7.
Scop. ent. carn. 25. Scarabæus illyricus.
Raj. inſ. p. 103. *n.* 2. Scarabæus ovinus alter.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 92. Copris niger, capite pone bicorni, &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 5.
Schæff. inſ. t. 73. *f* 2. 3. ♂. ♀.
Voet coleopt. t. 24. *f.* 16.
Habitat in Germania & Europa *magis auſtrali, nuchicorni ſimilis, at cornubus diſtantibus arcuatis diverſus.*

nutans. 167. Sc. thorace anterius impreſſo, occipite ſpina erecta, apice nutante, corpore nigro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 15. *n.* 151.
Habitat Halæ Saxonum, *nuchicornis ſtatura & magnitudine.*

ſcabroſus. 168. Sc. thorace rugoſo, capitis cornu erecto breviſſimo, elytris teſtaceis nigro-ſcabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 133. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 152.

Voet

Voet coleopt. t. 25. *f.* 23.
Habitat in America *meridionali*, *nuchicorni paulo major.*

furcatus. 160. Sc. thorace rotundato, capite cornubus tribus erectis approximatis: intermedio breviori. *Fab. ſp. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 134. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 153.
Laichart. inſ. tyr. p. 26. *n.* 20. *t.* 1. *f.* 20. Scarabæus Vitulus.
Habitat in Gallia *meridionali.*
Feminæ *cornuum loco linea tranſverſa elevata.*

verticicornis. 170. Sc. thorace griſeo nigro-punctato, capitis cornu erecto breviſſimo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 135. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 154.
Habitat in Anglia, *nuchicorni valde affinis*, *an varietas?*

truncaticornis. 171. Sc. æneo-niger, thorace rotundato, occipite ſpina apice truncata. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 238. *Habitat in* - - - *ſtatura nuchicornis*, *at minor.*
Femina *mutica.*

ſpiniger. 415. Sc. occipite ſpina erecta brevi, elytris lividis: maculis confluentibus nigris. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 47.
Habitat in Europa.

novemmaculatus. 416. Sc. teſtaceo fuſcus, clypeo rugis duabus, elytris fuſcis: maculis novem rufo teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 48.
Habitat extra Europam, *antennis*, *thoracis margine exteriori pedibusque lividis.*

recticornis. 427. Sc. ater, thorace ſubinermi, capite cornubus duobus erectis, clypeo rotundato. *Lesk. it. p.* 45. *t.* A. *f.* 8. 9. *Ha-*

Habitat in Lusatiæ *valle, a fluvio* Puloniz *irrigata, 5 lineas longus.*

c) *thorace & capite inermi :* Mutici :
α) *scutellati.*

Ayguulus. 172. Sc. thorace quadripunctato, capite tuberculato, elytris testaceis, tarsis anterioribus nullis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 15. *n.* 57. *mant. inf.* 1. *p.* 8. *n.* 60.
Habitat in India, *Inuo affinis, at duplo major, & tibiis anterius quoque dentatis distinctus.*

fimetarius. 32. Sc. ater, capite tuberculato, elytris rubris. *Fn. suec.* 385. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 16. *n.* 64. *mant. inf.* 1. *p.* 9. *n.* 70. *Scop. ent. carn. p.* 20. 21. *Geoffr. inf. paris.* 1. *p.* 81. *n.* 18.
Fn. suec. 1. *p.* 355. Scarabæus capite thoraceque nigro, antennis elytrisque rubris.
Raj. inf. p. 106. *n.* 9. Scarabæus pilularius nonus.
Frisch inf. 4. *t.* 19. *f.* 3.
Roes. inf. 2. *scar.* 1. *t.* A. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 144. *f.* 6.
Degeer inf. 4. *t.* 10. *f.* 8.
β) Scarabæus capite thoraceque nigro glabro, elytris griseis, pedibus pallidis. *It. æl.* 41.
Uddm. diss. nr. 2.
γ) Scarabæus (rufus) rufus totus, tolis oculis nigris, capite tuberculis tribus, elytris striatis. *Moll apud Fussl. naturh. Mag.* I. 372.
Habitat frequens in Europæ *fercore.*
Capitis *tubercula utplurimum tria.*

hæmorrhoidalis. 33. Sc. capite tuberculato, elytris apice rubris. *Fn. suec.* 386. *Fn. suec.* 1. *p.* 158. Scarabæus ater, elytris postice ferrugineis, pedibus rufis.
Habitat in Europæ *fungis & putridis ; an mera gregarii varietas?*

con-

conſpurcatus. 34. Sc. thoracis marginibus lateralibus albidis, capite tuberculato, elytris lividis nigro-maculatis. *Fn. ſuec.* 387. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 67. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 73.
Raj. inſ. p. 108. Scarabæus pilularius decimus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 82. *n.* 19.
Schæff. ic. t. 26. *f.* 8.
Pontopp. Atl. dan. t. 1. *f.* 82.
Voet coleoptr. t. 21. *f.* 144.
ß) Scarabæus teſſullatus. *v. Moll naturh. Br.* I. *p.* 162. *n.* 9.
Habitat in Europæ *ſtercore, vere præſertim frequens, ſordido affinis, ſed minor*; ß) *dimidio minor.*

ſordidus. 173. Sc. capite tuberculato, thorace nigro: margine pallido; puncto nigro, elytris griſeis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 68. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 75. *Herbſt apud Fuesſl. Arch. Inſ.* 4. *p.* 6. *n.* 13. *t.* 19. *f.* 3.
Habitat in Angliæ *ſtercore.*

luridus. 174. Sc. ater, capite tuberculato, elytris griſeis nigro-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 69. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 76.
Mull. prod. zool. dan. Scarabæus teſſullatus.

marianus. 35. Sc. capite tuberculato, elytris lævibus glaucis fuſco-punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 71. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 78.
Habitat in America, *magnitudine aloei*; *an forſan femina mutica Herculis?*

ſordens. 413. Sc. niger, capite tuberculato: intermedio prominulo, elytris ſordide teſtaceis: ſutura marginibusque ſordide brunneis. *Muſ. Lesk. p.* 2. *n.* 21.
Habitat in Europa.

nebu-

nebulosus. 414. Sc. fuscus, thorace lævi: marginibus externis lividis, capite obsolete tuberculato, elytris striatis, fusco nebulosis, pedibus testaceis. *Mus. Lesk. p. 2. n. 22.*
Habitat in Europa.

Inuus. 175. Sc. thorace quadripunctato, capite quadrituberculato, tarsis anterioribus nullis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 15. n. 56. mant. inf. 1. p. 8. n. 59.*
Fabr. syst. entom. p. 14. n. 45. Scarabæus Sphinx.
Habitat in Sierra Leon Africæ, *supra ex viridi æneus obscurus.*

subterraneus. 28. Sc. thorace glabro, capite tuberculis tribus, elytris striis crenatis. *Fn. suec. 382, * Fabr. sp. inf. 1. p. 15. n. 58. mant. inf. 1. p. 8. n. 61.*
Gadol fatag. 76. Scarabæus niger, capitis clypeo lunato tribus tuberculis notato.
Sulz. inf. t. 1. f. 2.
Habitat in Europæ *stercore, fossori affinis, at multo minor.*

Fossor. 31. Sc. thorace retuso, capite tuberculis tribus: medio subcornuto. *Fn. suec. 384. * Fabr. sp. inf. 1. p. 15. n. 59. mant. inf. 1. p. 8. n. 62.*
Geoffr. inf. 1. p. 82. n. 20.
Gunner. act. Nidr. 4. p. 266. n. 2. t. 16. f. 1.
Fn. suec. 352. Scarabæus ovatus ater glaber.
Schaef. ic. t. 144. f. 78.
Degeer inf. 4. t. 10. f. 7.
Voet coleopt. t. 21. f. 141.
Habitat in Europæ *fabulosi stercoratis.*

fœtens. 176. Sc. capite tuberculis tribus: medio acuto, elytrorum limbo ferrugineo. *Fabr. mant. inf. 1. p. 8. n. 63.*
Habitat Halæ Saxonum *ater, ano rufo, thoracis macula marginali ferruginea.*

ana-

analis. 177. Sc. niger, capite tuberculis tribus æqualibus, elytris apice ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 64.
Habitat in India, *feſſoris ſtatura & magnitudine.*

ſcybalarius. 178. Sc. capite tuberculis tribus: intermedio acuto, elytris ſtriatis teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 60. *mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 65.
Herbſt. apud Fuesslii Arch. Inſ. 4. *p.* 7. *n.* 17. *t.* 19. *f.* 6. Scarabæus fœtidus.
Habitat in Germania, *feſſore minor.*

terreſtris. 179. Sc. capite tuberculis tribus æqualibus, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 61. *mant. inſ.* 1. *p.* 8. *n.* 66.
Habitat in Anglia, *feſſore triplo minor.*

conflagratus. 180. Sc. capite tuberculis tribus, clypeo ſcutelloque nitide nigris. *Herbſt apud. Fuesslii Arch. Inſ.* 4. *p.* 5. *n.* 11.
Habitat in Germaniæ *ſtercore vaccino, erratico affinis.*
Elytra *punctis excavatis ſulcata.*

inquinatus. 181. Sc. capite tuberculis tribus, elytris luteis nigro ſtriatis. *Herbſt apud Fuesslii Arch. Inſ.* 4. *p.* 6. *t.* 19. *f.* 5. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 74.
Habitat in Germania, *firmetario tertia parte, ad conſpurcatum accedens.*
Scutellum *nitide nigrum.*

unifaſciatus. 182. Sc. thorace piceo: prominentia triplici; intermedia trituberculata, elytris teſtaceis: faſcia ſinuata fuſca. *Schaller Abh. der hall. Naturf.* 1. *p.* 240.
Habitat in Malabar.

fan-

sanguinolentus. 183. Sc. niger, capite tuberculis tribus obsoletis, elytris punctatim striatis apice rubris. *Herbst apud Fuessli Arch. 4. p. 6. n. 15. t. 19. f. 4.*
Habitat in Germania, *fimetarium simulans, at tertia parte minor.*

bimaculatus. 184. Sc. capite subtrituberculato, elytris striatis: macula baseos rubra. *Fabr. mant. inf. 1. 8. n. 67.*
Habitat in Germania, *ater, terrestris statura & magnitudine.*

testaceus. 185. Sc. testaceus, capite bituberculato, elytris punctato-striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 16. n. 63. mant. inf. 1. p. 9. n. 69.*
Habitat in Angliæ *stercoratis.*

eygmæus. 186. Sc. clypeo marginato, thorace viridi: prominentia bifida, elytris testaceis nigro-maculatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. 1. p. 239.*
Habitat in Malabar, *ovati magnitudine, nuchicornis statura.*

erraticus. 29. Sc. thorace lævi, capite tuberculo unico, elytris fuscis. *Fn. succ. 385. Fabr. sp. inf. 1. p. 17. n. 66. mant. inf. 1. p. 9. n. 72. Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. p. 5. n. 10. t. 19. f. 2. Schaeff. ic. t. 26. f. 9.*
Voet coleoptr. f. 146?
Habitat in Europæ *stercore, viis.*

bicolor. 187. Sc. thorace subinermi, capite tuberculo unico, elytris nigris, abdomine rufo. *Fabr. sp. inf. 1. p. 17. n. 65. mant. inf. 1. p. 9. n. 71.*
Habitat in Germania.

granarius. 23. Sc. niger, clypeo tuberculo solitario, elytris posterius testaceis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 17. n. 70. mant. inf. 1. p. 9. n. 77. Lesk. it. p. 45. t. A. f. 10.*

Syst.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 547. *n.* 23. Scarabæus ſcutellatus niger, thorace inermi: clypeo tuberculato, elytris ſubſtriatis margine poſtico teſtaceis.
Habitat in Europæ *locis ſuffocatis, ſeminis tritici magnitudine.*
Elytra *interdum ultra dimidium teſtacea.*

futuralis. 188. Sc. niger nitidus, capitis tuberculo ſolitario minuto, elytris ſordide flavis ſtriatis minuto punctatis, ſcutello margine exteriore ad baſin futuraque nigris. *v. Mell naturh. Br.* I. *p.*162.*n.*10.
Habitat in vallis Salzburgenſis Zillerthal *ſtercore equino, ſordido affinis.*

Veter. 408. Sc. rufus, capite thoraceque linea carinata elevata. *Fabr. mant inſ.* 2. *app. p.* 377.
Habitat in India, *cephi magnitudine.*

Gigas. 36. Sc. thorace retuſo, capite ſupra margineque angulato. *Muſ. Lud. Ulr.* 16. *
Habitat in Ægypto, *ater, primæ magnitudinis.*

ſcaber. 37. Sc. thorace elytrisque anterius ſcabris. *Muſ. Lud. Ulr.* 17. *
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 18. *n.* 72. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 79. Scarabæus ſcutellatus, clypei centro prominulo, elytris antice ſcabris.
Habitat in America, *naſicorni duplo major, Herculis feminæ affinis.*

longimanus. 39. Sc. pedibus anterioribus arcuatis longiſſimis. *Muſ. Lud. Ulr.* 18. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 73. *mant. inſ.* 1. *p.* 9. *n.* 80.
Aubent. miſc. t. 41. *f.* 1.
Voet. coleopt. t. 11. *f.* 97.
Habitat in India.
Femora *anteriora dente valido armata.*

ſter-

fterco-rarius. 42. Sc. ater glaber, elytris fulcatis, capite rhombeo: vertice prominulo. *Fn. fuec.* 388. * *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 75. *n.* 9. *Scop. ent. carn.* 26. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 18. *n.* 74. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 81. *Mouff. inf.* 151. *Raj. inf. p.* 74. *n.* 1. *Bauh. halluc.* 212. *f.* ult. *Liſt. mut.* 17. *f.* 4. *ſcar. angl. p.* 380. *n.* 4. *Friſch inf.* 4. *p.* 13. *t.* 6. *Schaeff. ic. t.* 23. *f.* 9. *Degeer inf.* 4. *t.* 9. *f.* 10. 11. *Voet coleopt. t.* 20. *f.* 134. *Habitat in* Europa *ſub ſtercore, acaris & ichneumone infeſtatus, veſpere ingenti cum ſuſurro circumvolitando ſerenum diem prænuncians, ab Ægyptiis ſoli conſecratus, colore interdum in cæruleum aut vireſcentem vergente, aut ſubtus æneo, elytrisque obſcure rufis varians.*

vernalis. 43. Sc. elytris glabris lævissimis, clypeo rhombeo: vertice prominulo. *Fn. ſuec.* 389. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 77. *n.* 10. *Scop ent. carn. p.* 27. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 19. *n.* 75. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 82. *Sulz. hiſt. inf. t.* 1. *f.* 6. *Voet coleopt. t.* 20. *f.* 135. *Degeer inf.* 4. *t.* 10. *f.* 4. *Habitat ſub* Europæ *ſtercore, ſtercorario ſimillimus, at minor, glaber, nitidus, antennis rubris, colore cæruleſcente, vireſcente & obſcuro varius.*

juvencus. 189. Sc. thorace anterius impreſſo mucronato. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 19. *n.* 76. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 83. *Habitat in* America.

ſplendidus. 190. Sc. viridi-nitens, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inf.*

inf. 1. *p.* 19. *n.* 77. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 84.
Habitat in insulis Americæ *australi oppositis.*

Cephus. 191. Sc. rufus, elytrorum sutura apicibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 19. *n.* 78. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 85.
Hospitatur in museo Ill. Banks.

labora-tor. 192. Sc. ater, thorace punctato, elytris striatis, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 20. *n.* 79. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 86.
Habitat in Brasiliæ *stercore.*

globa-tor. 193. Sc. thorace elytrisque obscure nigris punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 20. *n.* 80. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 87.
Habitat ad Caput bonæ spei, *fossoris magnitudine, subtus hirtus piceus.*

septem-macu-latus. 194. Sc. elytris striatis pallidis nigro-maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 20. *n.* 81. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 88.
Habitat in Africa *æquinoctiali, piceus, conspurcati statura, at paulo major.*

bipun-ctatus. 195. Sc. thorace nigro rubro-marginato, elytris rubris puncto nigro. *Lepech. it.* II. *p.* 324. *t.* 10. *f.* 7. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 89.
Laxmann nov. comm. Petr. 14. *p.* 593. *t.* 24. *f.* 1. Scarabæus bimaculatus.
Pallas ic. inf. Russ. 1. *p.* 12. *t.* A. *f.* 12. Scarabæus coccionelloides.
Habitat sub fimo equino Russiæ *australis & ad* Volgam.
Thoracis *margo rufus, puncto nigro.*

arator. 196. Sc. niger, thorace lævi, elytris punctato-stria-

ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 102. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 90.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

barbatus. 197. Sc. muticus lævis niger, ano barbato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 83. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 91.
Habitat in India.

quiſquilius. 83. Sc. ater glaber, elytris livido-teſtaceis. *Fn. ſuec.* 297. * *Faer. ſp. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 91. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 100.
Scop. ent. carn. 29.
Herbſt apud Fuessl. Arch. Inſ. 4. *p.* 7. *n.* 23. *t.* 19. *f.* 8.
ε) Scarabæus merdarius. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 90. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 7. *n* 22.
γ) Scarabæus cotericus. *v. Moll naturh. Br.* 1. *p.* 168. *n.* 13.
Scarabæus Copris. *Schranck enum. inſ. Auſtr. p.* 5. *n.* 6.
Habitat in Europæ *ſtercore & quiſquiliis, ſeminis milii magnitudine, ε) dimidio major.*

arcuatus. 198. Sc. niger nitidus, capitis clypeo anterius rufo, elytris ſtriato-punctatis, ſutura, puncto marginali baſeos vittaque abbreviata ſuturam verſus inflexa rubeſcentibus, pectore obſcuro, abdomine flaveſcente, palpis, antennis pedibusque ferrugineis. *v. Moll naturh Br.* 1. *p.* 160. *n.* 7.
Habitat in alpibus Salzburgicis.

Scrofa. 199. Sc. oblongus niger, elytris fuſcis ſubſtriatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 11. *n.* 99.
Habitat Halæ Saxonum, *ſtatura teſtudinarii, at minor.*

te-

testudinarius. 200. Sc. niger, elytris sulcatis piceis ferrugineo-punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 21. *n.* 89. *mant. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 98. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 7. *n.* 21. *t.* 19. *f.* 7. a. b.
Habitat in Anglia & Germania, *vere in agris stercoratis frequens.*

marginellus. 201. Sc. niger, thoracis elytrorumque margine testaceo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 21. *n.* 88. *mant. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 97.
β) Melolontha nigro-marginata. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 7. *p.* 155. *n.* 20. *t.* 43. *f.* 7.
Habitat in Coromandel, *parvus, pedibus piceis.*

quadrimaculatus. 84. Sc. niger oblongus, elytris maculis duabus nigris. *Fn. suec.* 398. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 21. *n.* 86. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 94.
Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. *p.* 10. *n.* 31. *t.* 19. *f.* 15. Scarabæus quadriguttatus.
Habitat in Europæ *stercore.*

Sus. 202. Sc. oblongus obscure rufus, elytris testaceis nigro-maculatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 11. *n.* 95. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 9. *n.* 29. *t.* 19. *f.* 10.
Habitat in Germaniæ *stercore humano, fimetario dimidio minor, statura quadrimaculati.*

plagiatus. 85. Sc. niger, elytris plaga rufescente. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 21. *n.* 87. *mant. inf.* 1. *p.* 11. *n.* 96.
Habitat in Europa, *an varietas subterranei?*

Blackburni. 203. Sc. thorace nigro æneo, elytris striatis atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 20. *n.* 85. *mant. inf.* 1. *p.* 10. *n.* 93.
Habitat in America *boreali, rufipede paulo major.*

rufipes. 86. Sc. antennis pallidis, elytris lævibus. *Fn. suec.* 403. *

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 20. *n.* 84. *mant. inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 92. Scarabæus thorace glabro nitido, elytris ſtriatis.
Degeer inſ. 2. *t.* 10. *f.* 6.
β) Scarabæus arator. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 9. *n.* 30.
Scarabæus gagates. *v. Moll naturh. Br.* I. *p.* 172. *n.* 17.
Habitat in Europæ, *potiſſimum borealis ſtercoratis*, β) *fimetarium magnitudine vix ſuperans.*

Geratoniæ. 87. Sc. thorace ſcabro lateribus tridentato, elytris griſeis. *Muſ. Lud. Ulr.* 31. *
Haſſelq. it. 409. *n.* 99. Scarabæus ceratoniæ.
Habitat in Cairi *ceratonia.*

porcatus. 204. Sc. fuſcus, elytris punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 92. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 101. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 8. *n.* 24. *t.* 19. *f.* 9. a. b. c.
β) Scarabæus foveolatus. *v. Moll naturh. Br.* I. *p.* 173. *n.* 19.
Habitat in Germaniæ *ſtercore.*

ſtercorator. 205. Sc. ater lævis, elytris ſtriato-crenatis, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 93. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 102.
Habitat in Braſilia.

aſper. 206. Sc. capite thoraceque tranſverſim ſulcatis, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 94. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 103. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 8. *n.* 25. *t.* 19. *f.* 10. a. b.
Habitat in Europæ *plantis putridis.*

unipunctatus. 207. Sc. ater, coleoptris flaveſcentibus: puncto communi nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 95. *mant. inſ.* 1. *p.* 11. *n.* 104.

Syſt.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 579. *n.* 6. *Fn. ſuec.* 470. * Coccinella coleoptris flaveſcentibus : puncto communi nigro.

interpunctatus. 208. Sc. niger, elytris ſordide flavis ſulcis nigris : area intermedia maculis oblongis alternis nigris varia. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 8. *n.* 26. *t.* 19. *f.* 11.
Habitat in ſtercore vaccino Berolini.

varius. 209. Sc. niger, elytris dimidiato flavis. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 9. A. 27. *t.* 19. *f.* 12. *v. Moll naturh. Br.* I. *p.* 172. *n.* 18. Scarabæus variegatus ?
Habitat in ſtercore vaccinio pratorum Berolinenſium, *ad interpunctatum proxime accedens, an varietas ?*

contaminatus. 210. Sc. niger, clypei ſcutellique margine luteo, elytris punctato-ſtriatis hirtis pedibusque ſordide flavis. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 9. *n.* 28. *t.* 19. *f.* 13.
Habitat in Pomerania, *interpunctato ſimilis, ſed minor.*

minutus. 211. Sc. niger, elytris ſtriatis pedibusque ſpadiceis. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 1. *p.* 10. *n.* 32.
Habitat Beroloni, *quiſquilio æqualis, & magis oblongus.*

oblongus. 212. Sc. clypeo foveolato, elytris ſulcatis, corpore oblongo.
v. Moll naturh. Br. I. *p.* 171. *n.* 16. *& apud Fuessli n. Mag. Entom.* 1. *p.* 371.
Habitat in Germaniæ *ſtercore, foſſori affinis.*

arenarius. 213. Sc. ater, elytris ſtriatis, tibiis piceis. *Fabr. mant.* I. *p.* 11. *n.* 105.
Habitat in Sueciæ *arena mobili, parvus.* læ-

lævis. 417. Sc. ater, thorace lævi, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p. 2. n. 34.*
Habitat in Europa.

dichrous. 418. Sc. ater glaber, thoracis margine externo elytris pedibusque ſordide teſtaceis. *Muſ. Lesk. p. 2. n. 35.*
Habitat in Europa.

β) exſcutellati.

decem-punctatus. 214. Sc. thorace anterius tuberculis tribus, elytris teſtaceis faſcia tranſverſa oblongo-punctatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. 1. p. 237.*
v. Moll naturh. Br. I. p. 175. n. 21. Scarabæus quadrituberculatus.
Habitat in Germaniæ *ſtercore humano & vaccino.*

reflexus. 215. Sc. niger, capite trituberculato, clypeo reflexo emarginato. *Fabr. mant. inſ. 1. p. 16. n. 157.*
Habitat in Sina, *oblongus, foſſoris magnitudine.*

quadri-pustulatus. 216. Sc. ater, capite bituberculato, elytris maculis duabus rubris. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 31. n. 137. mant. inſ. 1. p. 16. n. 156.*
Habitat in nova Hollandia.

ſulcator. 217. Sc. ater, capitis tuberculo unico, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 31. n. 136. mant. inſ. 1. p. 16. n. 155.*
Habitat in Cayenna.

criſtatus. 218. Sc. niger, thorace criſtato, clypeo tuberculato quadridentato. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 31. n. 138. mant. inſ 1. p. 16. n. 158.*
Habitat in Ægypto.

ſa-

facer. 18. Sc. clypeo ſexdentato, thorace crenulato, tibiis poſterioribus ciliatis, vertice ſubbidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 13. * *Amœn. Acad.* 6. *t.* 3. *f.* 170. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 139. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 159.

Degeer inſ. 7. *p.* 638. *n.* 36. *t.* 47. *f.* 18. Scarabæus cornutus.

Osb. it. 51. Scarabæus lævis thorace inermi, capite antice ſexdentato.

Loeſl. it. 20. Scarabæus pilularius niger, clypeo antice ſerrato, elytris nebuloſe maculatis ſubmollibus planiuſculis.

Petiv. gazoph. t. 42. *f.* 2.

Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 3.

Voet coleopt. t. 27. *f.* 39. 40.

Habitat in partibus Orbis *antiqui auſtralioribus*, *in* Ruſſiæ *auſtralis aridis frequens*, *cylindrum e ſtercore bovino volvens*, *in columnis antiquis* Romæ *exſculptus ab* Ægyptiis.

laticollis. 38. Sc. niger, clypeo ſexdentato, elytris ſulcatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 140. *mant. inſ.* 1. *p.* 16. *n.* 160.

Geoffr. inſ. 1. *p.* 89. *n.* 2. Copris niger, capite clypeato: margine ſerrato, thorace lato lævi, elytris ſtriatis.

Raj. inſ. p. 105. *n.* 4.

Voet coleoptr. t. 27. *f.* 41.

Habitat in Sina, *& auſtrali* Europa, *ſacro valde affinis.*

variolosus. 219. Sc. clypeo ſexdendato, thorace elytrisque nigris: punctis impreſſis varioloſis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 16. *n.* 161.

Habitat in Iſtria, *laticollis ſtatura, ſed paulo minor.*

miliaris. 220. Sc. clypeo ſexdendato, thorace elytrisque nigris: maculis elongatis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*

p. 32. *n.* 141. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 162.
Habitat in India.

Bacchus. 221. Sc. clypeo quadridentato, thorace gibbo elytrisque glabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 142. *mant.* 1. *p.* 17. *n.* 163.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magnus*, *gibbus*.

gibbofus. 222. Sc. clypeo quadridentato, elytris baſi gibbo notatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 143. *mant.* *p.* 17. *n.* 164.
Habitat in America.

Hollandiæ. 223. Sc. clypeo quadridentato, elytris fuſcatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 144. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 165.
Habitat in nova Hollandia.

Koeniigii. 224. Sc. clypeo bidentato, thorace ſcabro, elytris variolosis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 145. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 166.
Pall. icon. inſ. Roſſ. 1. *p.* 7. *t.* A. *f.* 7. Scarabæus ſcriptus.
Habitat Tranquebariæ.

cupreus. 225. Sc. ex nigro cupreus, clypeo emarginato, thorace gibbo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 146. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 167.
Habitat in Africa.

flagellatus. 226. Sc. niger opacus, clypeo emarginato, elytris ſcabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 147. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 168.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *& in auſtrali* Europa.

pilularius. 40. Sc. niger opacus lævis ſubtus æneus, thorace poſterius rotundato. *Muſ. Lud. Ulr.* 19. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 151. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 170. *Geoffr.*

Geoffr. inf. 1. *p.* 91. *n.* 7. Copris niger nitidus, &c.
Arist. Anim. l. 5. *c.* 18.
Plin. hist. mund. II. 34. Pilularius.
Raj. inf. p. 105. *n.* 1.
Catesb. Car. 3. *t.* 11. fig. finistr.
Schaeff. ic. t. 73. *f.* 6.
Voet coleopt. t. 28. *f.* 49.
β) Scarabæus Mopsus. *Pall. ic. inf. Rossi.* 1. *t.* A. *f.* 3.
Scarabæus Geoffroæ. *Sulz. ic. inf. t.* 1. *f.* 7.
Habitat in Europa *magis australi, stercorarii magnitudine & statura; bini quotidie sisyphi instar volvunt globum e stercore imprimis humano confectum se sæpe septies majorem Loeft. it.* 20.

Schaefferi. 41. Sc. thorace rotundato, clypeo emarginato, elytris triangulis, femoribus posterioribus elongatis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 32. *n.* 148. *mant. inf.* 1. *p.* 17. *n.* 169.
Scop. ent. carn. p. 84. Scarabæus longipes.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 92. *n.* 9. Copris niger, pedibus longis, &c.
Schaeff. ic. t. 3. *f.* 8.
Voet coleoptr. t. 25. *f.* 17.
Habitat in Calabriæ, Germaniæ & Sibiriæ *collibus apricis, globulos e stercore bovino factos volvens & sepeliens, niger, horticolæ magnitudine.*

brasilianus. 227. Sc. ater, clypeo emarginato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 33. *n.* 150. *mant. inf.* 1. *p.* 17. *n.* 171.
Habitat in Brasiliæ *stercore bovino.*

calcaratus. 44. Sc. capite clypeato emarginato, femoribus posterioribus dentatis.
Habitat in Ægypto.

Schre-

Schreberi. 45. Sc. ater glaber, elytrorum maculis duabus fe-moribusque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 151. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 172.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 91. *n.* 7. Copris niger nitidus, &c.
Schaeff. ic. t. 73. *f.* 6.
Voet coleoptr. t. 28. *f.* 49.
Habitat in Europa *temperata*, *nuchicornis fere ſtatura.*

bipuſtulatus. 228. Sc. ater, elytris baſi macula rufa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 152. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 173.
Habitat in nova Hollandia.

pallipes. 229. Sc. capite thoraceque pallido viridique variegatis, pedibus antennisque pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 153. *mant. inſ.* 1. *p.* 17. *n.* 174.
Habitat in Coromandel, *parvus.*

triangularis. 230. Sc. niger, thoracis margine femoribusque pallidis, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 154. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 175.
Drury inſ. 1. *t.* 36. *n.* 175.
Habitat in America *auſtrali*, *nuchicornis ſtatura.*

cinctus. 131. Sc. niger, elytrorum margine pallido, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 155. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 176.
Habitat in Sina.

flavipes. 232. Sc. nigricans, thoracis marginibus, elytris pedibusque flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 495. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 177.
Laicharт. inſ. tir. 1. *p.* 24. *n.* 17. *Herbſt apud Fuesslі Arch. Inſ.* 4. *p.* 12. *n.* 46. *t.* 19. *f.* 19. Scarabæus thoraco-circularis.
Schaeff. ic. t. 74. *f.* 6.
Habitat in Germania, *cincti ſtatura.*

ae-

aeneus. 233. Sc. viridi-æneus, thorace bituberculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 156. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 178.
Habitat in Coromandel, *parvus*, *ſubtus niger.*

ſmaragdulus. 234. Sc. æneus nitidus, clypeo bidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 157. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 179.
Habitat in America *auſtrali*, *parvus*, *glaberrimus.*

ovatus. 46. Sc. niger, clypeo emarginato, thorace ſubæneo, elytris abbreviatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 158. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 180.
Habitat in Calabriæ, Germaniæ, Angliæ *ſtercore bovino*, *nucis corni ſimilis*, *at quadruplo minor.*

amazonus. 47. Sc. teſtaceus thorace lituris duabus nigris, elytrisque margine exteriore callo fuſco.
Habitat in Surinami, *lævis*, *ſtercorario dimidio minor.*

crucifer. 319. Sc. thorace ſubvilloſo virideſcente, elytris luteis corpore brevioribus: cruce nigra, trabe duplici. *Lepech. it.* I. *p.* 240. *t.* 16. *f.* 14.
Habitat in Sibiriæ *quercetis*, *pulpa foliorum victitans*, *ſubtus niger villoſus*, *an hujus generis?*

cæruleus. 320. Sc. totus cyaneus oblongus. *Lepech. it.* I. *p.* 313. *t.* 19. *f.* 2.
Habitat in Sibiriæ *deſerto* uralenſi, 5 *lineas longus*, *ſubtus in atrum colorem vergens.*

uralenſis. 321. Sc. viridis, elytris flavis corpore brevioribus, apice acuminatis. *Lepech. it.* I. *p.* 313.
Habitat in deſerti Sibiriæ uralenſis *arenoſis*, *ſubtus villo albo tectus.*
Elytra *lineis villo albicante ſignatis a medio ad apicem diſtincta.*

ſti-

ſtricto-pterus. 419. Sc. niger elytris ſtrictis puntatis. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 32.
Habitat in Europa.

guttatus. 420. Sc. niger, thorace rotundato: guttis eminentibus glabris, capitis clypeo impreſſo apice biſido, elytris profunde ſtriatis crenatis: maculis oblongis e pilis luteis. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 53.

b) *mandibula arcuata ſubdentata, abdomine apice nudo, oblique truncato.* Melolonthæ.

Fullo. 57. Sc. teſtaceus albo-maculatus, ſcutello macula duplici antennis heptaphyllis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 553. *n.* 57. *Fn. ſuec. p.* 394.* *Scop. ent. carn. p.* 123. Scarabæus ſcutellatus muticus, antennis heptaphyllis, corpore nigro, pilis albis, ſcutello macula duplici alba.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 69. *n.* 2. Scarabæus antennarum lamellis maximis.
Raj. inſ. p. 93. *n.* 9. Scarabæus Fullo.
Friſch inſ. II. *t.* 1. *f.* 1.
Mouff. inſ. 160. *f.* 4.
Hoeffn. inſ. 2. *t.* 7.
Eph. Nat. Cur. Dec. 2. *ann.* 6. *obſ.* 239.
Aubent. miſc. t. 16. *f. med.*
Schaef. ic. t. 23. *f.* 2.
Petiv. gaz. t. 138. *f.* 1.
Sulz. hiſt. inſ. 1. 1.
Voet coleoptr. t. 6. *f.* 48. 49.
β) Scarabæus albus. *Pall. it.* II. *p.* 718. *n.* 4.
Pall. ic. inſ. Roſſ. 1. *p.* 19. *t.* B. *f.* 21. Scarabæus hololeucos.
Habitat in Europæ & Barbariæ *arenoſis, querceto, clymo & arundine arenariis vicinitans, ſubtus hirſutus, unguiculis baſi ramo uncinato.*

ru-

rurico-la. 235. Sc. ater fericeus, elytris ruſis: margine nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 58.
Geoff. inſ. par. 1. *p.* 80. *n.* 15. Scarabæus niger elytris croceis, &c.
Habitat in Angliæ *graminoſis.*

fruti-cola. 236. Sc. capite thoraceque cæruleo-piloſis, elytris lividis, clypeo apice reflexo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 56.
Scop. ent. carn. 6. Scarabæus cyathiger.
Poda inſ. 21. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 44. Scarabæus agricola.
Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 4. *p.* 15. *n.* 6. *t.* 19. *f.* 24.
Schaeff. ic. t. 65. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 8. *f.* 67.
ε) Scarabæus campeſtris. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 15. *n.* c. *t.* 19. *f.* 25.
Habitat in Germaniæ *ſpicis ſecalinis, in* Calabria *etiam inquilinus, horticolæ ſtatura, ſed minor.*

pratico-la. 237. Sc. thorace nigro flavoque vario ſubpiloſo, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 55.
Habitat in Sibiria, *agricolæ affinis, at clypeo non reflexo.*

arvicola. 238. Sc. capitis clypeo reflexo, corpore nigro immaculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 54.
Habitat in Ruſſia *magis auſtrali, horticolæ affinis.*

agrico-la. 58. Sc. thorace villoſo, elytris lividis: limbo ſciaque nigris, clypeo apice reflexo. *Fabr. mant.* 1. *p.* 23. *n.* 57.
Habitat in Germaniæ *graminibus.*

flo-

florico-la. 239. Sc. cyaneo-nigra glabra, elytris rufis: futura nigra, abdomine punctis fasciculatis albis, clypeo reflexo. *Fabr. mant.* 1. *p.* 22. *n.* 53.
Habitat in Africa, *horticolæ proxime affinis.*

abdomi-nalis. 240. Sc. capite thoraceque cæruleo-pilosis, elytris testaceis, abdomine albo villoso. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 496. *mant. inf.* 1. *p.* 22. *n.* 52.
Habitat in Italia, *horticolæ nimium affinis.*

hortico-la. 59. Sc. capite thoraceque cæruleo-pilosis, elytris testaceis, pedibus nigris. *Fn. suec.* 391. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 41. *mant. inf.* 1. *p.* 22. *n.* 50.
Geoffr. inf. paris. 1. *p.* 75. *n.* 8.
It. scan. 116. 321. Scarabæus frisius.
List. scar. 380. *n.* 3. Scarabæus ex nigro virescens, pennarum thecis rufis.
Degeer inf. 4. *p.* 278. *n.* 24. *t.* 10. *f.* 18. Scarabæus viridicollis.
Raj. inf. p. 380. *n.* 3.
Frisch inf. 4. *t.* 14.
Pet. gaz. t. 22. *f.* 9.
Schæff. ic. t. 23. *f.* 4.
Habitat in Europæ *hortis*; *larva radices brassicæ lactucæ*: *& captitatæ destruit, intacta viridi & fabauda; imago pomonam devastat, intacta pyro communi.*

regius. 241. Sc. cupreo-nitidus, clypeo emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 40. *mant. inf.* 1. *p.* 22. *n.* 49.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *splendentis statura.*

splen-dens. 242. Sc. ater, elytris vitta abbreviata aurea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 39. *mant. inf.* 1. *p.* 22. *n.* 48.
Habitat ad Caput bonæ spei.

ferrugi-neus. 243. Sc. rufus thorace elytrisque vage punctatis. *Fa-*

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 22. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 38.
Habitat in Coromandel, *rauco affinis, at duplo minor.*

raucus. 244. Sc. clypeo reflexo, thorace elytrisque punctatis nigro-æneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 46.
Habitat in Coromandel, *ſubtus niger.*

rupicola. 245. Sc. villoſus virescens, capite nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 44.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

innubus. 246. Sc. glaber niger, thoracis margine, abdomine femoribusque teſtaceis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 22. *n.* 45.
Habitat in - - - *parvus, nitidus, thorace punctato, elytris ſubſtriatis.*

errans. 247. Sc. teſtaceus, thorace maculis duabus nigris, pedibus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. *n.* 43.
Habitat in - - -

Cardui. 248. Sc. glaber viridi-æneus, abdomine rufo-cinereo villoſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 42.
Habitat in Africæ *cardui pycnocephali, Sc. Friſchii ſtatura, at paulo minor.*

Vitis. 249. Sc. viridis, thoracis lateribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 41.
Scop. ent. carn. Scarabæus dubius.
Voet coleoptr. t. 6. *f.* 56. 57.
Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 11.
Habitat in Europæ & Americæ *vite, Sc. Friſchii valde affinis, variat elytris teſtaceis.*

Fri-

Frischii. 250. Sc. nigro-æneus, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 33. *mant. inf.* 1. *p.* 21. *n.* 40. *Frisch inf.* 4. *p.* 29. *t.* 14.
Voet coleoptr. t. 6. *f.* 55. & *t.* 7. *f.* 58.
Habitat in Germaniæ *vite & rosa, in* Brasilia, *rarius elytris thoraci concoloribus.*

janthinus. 421. Sc. obsolete violaceus, thoracis margine externo, elytris, abdomine pedibusque testaceis, ano fusco violaceo femoribus anterius violaceis. *Mus. Lesk. p.* 3. *n.* 62.
Habitat in Europa, *statura & magnitudine Sc. Fischii.*

coriarius. 422. Sc. fusco-violaceus, thorace fusco-luteo piloso, capitis clypeo apice reflexo, elytris testaceis. *Mus. Lesk. p.* 4. *n.* 72.
Habitat in Europa.

holosericeus. 251. Sc. supra viridis holosericeus subtus cupreus, elytris lineis elevatis quatuor. *Fabr. mant.* 1. *p.* 21. *n.* 39.
Habitat in Russia *magis australi, Sc. Frischii statura & magnitudine.*

australicus. 252. Sc. glaber, elytris fuscis: marginis exterioris plica elevata, scutelli macula quadrata. *Schranck enum. inf. Austr. p.* 11. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 16. *n.* 12. *t.* 16. *f.* 26.
Habitat in Australi, *an varietas agricolæ?*

lætus. 253. Sc. supra glaber aureus, thoracis linea dorsali scutelloque sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 40. *n.* 32. *mant. inf.* 1. *p.* 21. *n.* 58.
Habitat in nova Seelandia.

festus. 254. Sc. supra glaber viridis, thorace linea dorsali,

li, elytris futura nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 37.
Habitat in nova Seelandia.

rufeſcens. 255. Sc. glaber rufeſcens, elytris teſtaceis, clypeo quinquedentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 36.
Voet coleoptr. t. 19. *f.* 76.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

obſcurus. 256. Sc. obſcure piceus immaculatus, pilis breviſſimis erectis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 35.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *rufeſcentis magnitudine.*

erythrocephalus. 257. Sc. glaber pallidus, capite rubro baſi nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 34.
Petagn. ſp. inſ. Calabr. p. 5. *n.* 18. *f.* XXXV.
Habitat in Calabria & Coromandel, *melanocephalo affinis*, *at duplo minor.*

melanocephalus. 258. Sc. glaber rufeſcens, capite nigro, elytris pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 33.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 80.
Habitat in Braſilia.

ſerratus. 259. Sc. obſcure teſtaceus, clypeo emarginato, thoracis margine ſerrato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 2.
β) Melolontha ſibirica. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 35.
Habitat in Coromandel, *melolonthæ magnitudine*, β) *triplo minor in* Sibiria.

Melolontha. 68. Sc. ſcutellatus muticus teſtaceus, thorace villoſa, cauda inflexa, inciſuris abdominis albis.

Fn. ſuec. 392. * *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 70. *n.* 1. *Scop. ent. carn.* 16.

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 35. *n.* 3. *mant. inſ. p.* 19. *n.* 3. Melolontha (vulgaris) teſtacea, thorace villoſo, inciſuris abdominis albis.

Mouff. inſ. 160. *f.* 2.

Liſter ſcar. Angl. 379.

Aldrov. inſ. 454. *t. ſup. f.* 2.

Hoefn. inſ. t. 1. *f.* 11.

Goed. inſ. 1. *t.* 78.

Merian. europ. 1. *p.* 2. *f.* 4.

Friſch inſ. 4. *t.* 14.

Raj. inſ. p. 104. *n.* 1.

Pet. gaz. t. 9. *f.* 2.

Alb. inſ. 60.

Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 1. *t.* 1.

Leeuwenh. epiſt. 1. *p.* 18.

Sulz. inſ. t. 1. *f.* 3.

Schaeff. elem. t. 8. *f.* 3. & *t.* 109. *f.* 5. *icon. t.* 93. *f.* 1. 2.

Voet coleopt. t. 6. *f.* 45. 46.

Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 14.

Habitat in Europæ *parte magis boreali vulgatiſſimus, in* Calabria *quoque frequens, unguibus prope baſin bidentatis, dente inferiori breviore, veſpere circumvolitans, arborum foliis, tilia tamen intacta, victitans, auctumno copioſior morbos prænuncians, oleum infuſum cimicifugum reddens, meleagridum gallinarum, veſpertilionum gratus cibus, varians annuatim thorace rufo & nigro.*

Mas *cauda acuta inflexa diſtinctus*; larva *griſea, capite pedibusque teſtaceis, plantarum, ſegetis præſertim radices exedit, ſexto demum anno exeunte ſcarabæo.*

ſolſtitialis. 61. Sc. ſcutellatus muticus teſtaceus thorace villoſo, elytris luteo-pallidis: lineis tribus albis parallelis. *Fn. ſuec.* 393. * *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 74. *n.* 7. *Scop. ent. carn.* 3.

Fa-

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 57. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 9.
Melolontha teſtacea, thorace villoſo, elytris luteo-pallidis: lineis tribus pallidioribus.
Mouff. inſ. 160. *f.* 3.
Liſter ſcar. angl. 301. *n.* 2.
Raj. inſ. p. 105. *n.* 2.
Petiv. gaz. p. 36. *t.* 22. *f.* 9.
Friſch inſ. 9. *t.* 15. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 93. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 6. *f.* 51. 52.
Degeer inſ. 4. *t.* 10. *f.* 15.
Habitat in Europæ *arboretis*, *unguibus*, *ad baſin unidentatis*, *melolontha ſerior*, *ſolſtitio æſtivo frequentiſſimus*, *an germinibus frumentaceorum*, *quorum radices larva rodit*, *inhærendo*, *morbi epidemici* Kriebelkrankheit *cauſſa?*

Tau nigrum. 411. Sc. nigricans ſubtus lunatus caneſcens, elytris pilis albis breviſſimis, ſcutello villoſo albido T nigro inſcripto. *Schranck Schr. eintr. Fr. z. Wien* II. 2. *p.* 6.
Habitat in Hungaria, *unguibus medio unidentatis.*

lanugithorax. 412. Sc. unguibus bifidis, poſterioribus minoribus poſteriorum unico. *Schranck Schr. eintr. Fr. z. Wien* II. 2. *p.* 7. *n.* 9.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 31.
Habitat in Bavariæ *montibus*, *ab hirtello diſtinctus.*

reflexus. 260. Sc. glaber teſtaceus, clypeo reflexo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 7.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *fervido affinis*, *at paulo minor.*

Alopex. 261. Sc. fulvo-hirtus, clypeo reflexo emarginato, elytris glabris nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 8.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *reflexi ſtatura.*

fervidus. 362. Sc. teſtaceus glaber, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 6.

Habitat in America *ſeptentrionali, quaſi rore cæruleſcente tectus.*

villoſus. 263. Sc. teſtaceus, clypeo marginato reflexo, corpore ſubtus lanato, ſcutello albo. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 496. *mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 4.

Habitat in Italia, *melolonthæ ſtatura & magnitudine.*

atomarius. 264. Sc. albo-farinoſus, thorace canaliculato atro, elytris fuſcis, abdomine albo: punctis lateralibus atris. *Fabric. ſp. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 59.

Habitat ad Caput bonæ ſpei, *farinoſi ſtatura & magnitudine.*

farinoſus. 64. Sc. ſcutellatus muticus niger, polline vireſcente, elytris abbreviatis. *Fn. ſuec.* 399.

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 43. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 60. Melolontha ſupra cæruleo-ſubtus argenteo-ſquamoſa nitens, clypeo integro.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 79. *n.* 13. Scarabæus violaceus.

Degeer inſ. 4. *p.* 302. *n.* 30. *t.* 10. *f.* 23. Scarabæus ſcutellatus niger, ſquamulis griſeo-viridibus, &c.

Drury inſ. 2. *t.* 32. *f.* 4. Scarabæus cæruleus.

Voet coleoptr. t. 9. *f.* 71.

Habitat in Europa *magis auſtrali, unguibus poſterioribus breviſſimis.*

argenteus. 265. Sc. niger, ſubtus argenteo-nitens, clypeo mar-

Melolonthæ *arborum foliis*, cetoniæ *etiam floribus victitant*; trichii *delectantur floribus præſertim umbellatarum*; melolontharum *larva radicibus*, cetoniarum *ligno putreſcente ſubacidulo victitat.*

marginato, elytris teſtaceis. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 61. *Scop. ent. carn.* 9. *Poda inſ.* 20. Scarabæus argenteus.
Voet coleoptr. t. 8. *f.* 68.
Habitat in Auſtria *interiori*, Calabria & *frequens in* Angliæ *floribus.*

probo-ſcideus. 266. Sc. niger hirtus, clypeo porrecto ſubreflexo, elytris teſtaceis: margine nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 62.
Habitat in India, & Africæ *floribus.*

ſpinipes. 267. Sc. niger immaculatus, pedibus poſterioribus elongatis: femoribus baſi uniſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 13. *n.* 63.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura craſſipedis.*

dentipes. 268. Sc. niger, elytris teſtaceis, clypeo quadridentato femoribus tibiisque poſterioribus ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 64.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſpinipedi affinis.*

podagri-cus. 269. Sc. niger, clypeo tridentato, femoribus tibiisque poſterioribus ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 23. *n.* 65.
Habitat in Coromandel, *dentipedis ſtatura.*

arthriti-cus. 270. Sc. niger, elytris griſeis, clypeo tridentato, femoribus tibiisque poſterioribus incraſſatis ſubinermibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 22. 23. *n.* 66.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *podagrico minor.*

gonagri-cus. 271. Sc. griſeus, pedibus rufis, femoribus poſterioribus incraſſatis muticis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 67.

Ha-

Habitat ad Caput bonæ ſpei, *arthritico minor.*

craſſipes. 272. Sc. ater albo-maculatus, pedibus poſterioribus elongatis craſſiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 55. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 68.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

pulverulentus. 273. Sc. corpore polline vireſcenti argenteo, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 69.
Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 8.
Habitat in Alſatia & Ruſſia, *argenteo duplo minor.*

ſylvicola. 274. Sc. clypeo inflexo integro, corpore nigro glabro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 57. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 70.
Habitat in nova Hollandia, *elytris fuſcis varians.*

ſubſpinoſus. 275. Sc. flaveſcens, pedibus rufis, thorace ſubſpinoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 58. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 71.
Habitat in inſulis Americæ *meridionali oppoſitis.*

Bankſii. 276. Sc. capite thoraceque atris, elytris villoſis pedibusque teſtaceis, abdomine brevi retuſo. *Fabr. mant.* 1. *p.* 24. *n.* 72.
Hoſpitatur in muſeo Ill. Banks, *pulverulenti ſtatura.*

aulicus. 65. Sc. ſcutellatus muticus piloſus luteus, capite nigro, pedibus poſterioribus elongatis uniunguiculatis.
Fabr. mant. 1. *p.* 22. *n.* 51. Melolontha (regia) villoſa ſupra lutea, capite nigro, ſubtus cinerea.
Habitat in Africa, *horticolæ magnitudine & ſtatura.*

abbreviatus. 277. Sc. villoſus niger, clypeo tridentato, elytris abbreviatis teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 59. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 73.

Ha-

Habitat ad Caput bonæ ſpei, *pilis aliquot albis hirtus.*

mutabilis. 278. Sc. ater, tomento cinereo villoſus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 60. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 74. *Voet coleoptr. t.* 9. *f.* 75.
Habitat Tranquebariæ.

chryſomelinus. 279. Sc. ater, elytris auro nitentibus, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 61. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 75. *Schranck inſ. auſtr.* 16. *n.* 25.
Habitat in Americæ *borealis*, Germaniæ *ligno putreſcente.*

verſicolor. 280. Sc. obſcure æneus, elytris tomento cinereo nitidulis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 62. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 76.
Habitat in Sierra Leon Africæ.

capicola. 281. Sc. niger hirtus, ſcutello abdomineque albidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 63. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 77.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 75.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *parvus.*

picatus. 282. Sc. glaber ferrugineus, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 64. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 78.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura capicolæ.*

lineatus. 283. Sc. obſcure vireſcens, elytris lineis duabus ruſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 65. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 79.
Habitat in Sierra Leon Africæ, *parvus*, *gibbus.*

gibbus. 284. Sc. gibbus teſtaceus, tomento cineraſcente nitidulus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 66. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 80.

Ha-

Habitat ad caput bonæ ſpei, *lineato magis gibbus.*

monticola. 285. Sc. teſtaceus glaber, capite atro, clypeo integro reflexo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 67. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 81.
Habitat in nova Hollandia.

humeralis. 286. Sc. ater, elytris baſi punctoque medio pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 68. *mant. inſ. p.* 24. *n.* 82.
Habitat in Europæ *graminoſis.*

Urſus. 287. Sc. ater hirſutiſſimus, pedibus quatuor anterioribus teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 69. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 83.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *pedibus aliquando omnibus nigris.*

Lynx. 288. Sc. niger hirtus, elytrorum margine aureo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 70. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 84.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

longipes. 66. Sc. ſcutellatus muticus atro-cyaneus, pedibus nigris, poſterioribus elongatis uniunguiculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 71. *mant. inſ.* 1. *p.* 24. *n.* 85. Melolontha (crinita) hirta, ſupra viridis, ſubtus nigra.
Pall. ic. inſ. Roſſ. t. A. *f.* 17. Scarabæus bombyliformis.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

hirtus. 289. Sc. hirtus, capite thoraceque viridibus, elytris fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 72. *mant. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 86.
Pall. ic. inſ. Roſſ. t. A. *f.* 15. Scarabæus Alopecias.
Habitat in Sibiria.

Vul-

Vulpes. 290. Sc. areus fulvo hirtus, abdomine ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 73. *mant. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 87.
Habitat in Sibiria.

bombylius. 291. Sc. niger cinereo hirtus, elytris teſtaceis: lineis tribus apicis albidis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 88.
Habitat in Africæ *plantis, vulpis magnitudine & ſtatura.*

vittatus. 292. Sc. cyaneus piloſus, elytris teſtaceis: lineis tribus albicantibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 74. *mant. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 89.
Lepechin it. I. *p.* 508. *t.* 16. *f.* 9. Scarabæus acuminatus.
Pall. it. I. *p.* 462. *n.* 26. *icon. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 14. *t.* A. *f.* 14. Scarabæus oxypterus.
Petiv. gazoph. t. 11. *f.* 12.
Voet coleoptr. t. 5. *f.* 35.
Habitat in America *auſtrali &* India.

bimaculatus. 293. Sc. oblongus glaber teſtaceus, thorace utrinque macula abdomineque flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 19. *n.* 10.
Habitat in Sina, *ſolſtitiali maxime affinis.*

atriplicis. 294. Sc. oblongus villoſus pallidus, elitris ſutura apiceque nigris, clypeo reflexo. *Fabr. mant.* 1. *p.* 19. *n.* 11.
Habitat in Barbariæ *atriplice halimifolia, ruficornis ſtatura & magnitudine.*

ruficornis. 295. Sc. villoſus teſtaceus, abdomine albicante. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 8. *mant. pl.* 1. *p.* 20. *n.* 12.
Habitat in Germania, *an varietas ſolſtitialis?*

te-

teres. 296. Sc. oblongus glaber niger, elytris obſolete ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 13.
Scop. ent. carn. 19. Scarabæus oblongus.
Habitat in Germania *ſuperiore, an ab oblongo diverſus?*

lanigerus. 67. Sc. ſcutellatus muticus, ſubtus lanatus, capite thoraceque lanatis, elytris luteis. *Muſ. Lud. Ulr.* 20.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 37. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 14. Melolontha (lanigera) ſubtus lanata, capite thoraceque aureis, elytris luteis.

brunnus. 72. Sc. ſcutellatus muticus teſtaceus, elytris ſtriatis, thorace utrinque puncto notato.
Fabr. ſp. inſ 1. *p.* 39. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 32. Melolontha (brunnea) glabra teſtacea, elytris ſtriatis, thorace utrinque puncto notato.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 83. *n.* 22. *Degeer inſ.* 4. *p.* 277. *n.* 23. *t.* 10. *f.* 17. Scarabæus fulvus.
Voet. coleoptr. t. 7. *f.* 53. 54.
Habitat in Europæ *arboretis.*

ſignatus. 297. Sc. glaber pallidus thorace lineis duabus, elytris maculis tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 31.
Habitat in Jamaica, *ruficollis magnitudine.*

ruficollis. 298. Sc. glaber punctatus ferrugineus, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p* 21. *n.* 30.
Habitat in Coromandel, *brunneo major.*

pallens. 299. Sc. glaber teſtaceus, capite elytrorumque ſutura nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 29.
Herbſt apud Fuesſli Arch. Inſ. 4. *p.* 13. *n.* 4. *t.* 19. *f.* 21. a. b. Melolontha ſpinipes. *Ha-*

Habitat ad Caput bonæ ſpei, *& in* India, *ſolſtitiali ſimilis.*

hirticollis. 300. Sc. hirtus niger, elytris punctatis glabris rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 21. *n.* 28.
Habitat in Africa, *fuſci magnitudine.*

fuſcus. 301. Sc. glaber teſtaceus, capite obſcuriore, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 27.
Habitat in Terra del fuego.

triſtis. 302. Sc. thorace villoſo obſcuro, elytris lævibus teſtaceis, ſcutello albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 26.
Habitat in America *boreali, fuſco affinis.*

ſtriatus. 303. Sc. glaber æneus, elytris ſtriatis: ſutura lineisque quatuor cupreis. *Fabr ſp. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 26.
Habitat in Terra del fuego.

luridus. 304. Sc. thorace nigro: margine pallido, elytris griſeis nigro-punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 24.
Habitat . . .

Glacialis. 305. Sc. glaber piceus, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 23.
Habitat in Terra del fuego.

dorſalis. 306. Sc. glaber teſtaceus, capite, thoracis elytrorumque dorſo nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 22.
Habitat Tranquebariæ.

bicoloratus. 307. Sc. glaber viridis, ſubtus teſtaceus, pedibus api-

apice aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 21.
Voet. coleoptr. t. 8. *f.* 66.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

futuratus. 308. Sc. viridis, elytrorum ſutura flaveſcente. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 20.
Habitat in nova Seelandia.

æratus. 309. Sc. glaber æneus, abdominis lateribus albis elytris acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 19.
Habitat in nova Hollandia.

viridis. 310. Sc. glaber, ſupra viridis, ſubtus aureus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 18.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

glabratus. 311. Sc. teſtaceus nitidus, ſterno anterius porrecto obtuſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 17.
Habitat in America *auſtrali &* India.

punctatus. 76. Sc. ſcutellatus muticus teſtaceus, elytris punctis tribus ſubfuſcis obſoletis diſtantibus. *Mus. Lud. Ulr.* 23. *
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 38. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 16. Melolontha teſtacea, elytris punctis tribus fuſcis diſtantibus.
Gron. zooph. 438.
Drury inſ. 1. *t.* 34. *f.* 5.
Voet. coleoptr. t. 8. *f.* 65.
Habitat in America, *lævis, aurati magnitudine unguibus arcuatis acutiſſimis.*

longicornis. 312. Sc. ſupra glaber niger, elytris ferrugineis antennarum clava elongata. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 20. *n.* 15. *Hab.*

Habitat ad Caput bonæ ſpei, *lanigeri ſtatura & magnitudine.*

unicolor. 313. Sc. totus ſpadiceus lævis, elytris punctis impreſſis. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 7. p. 154. n. 18. t. 43. f. 5.*
Habitat in India, *brunno ſimilis, at quadruplo major.*

ciliatus. 314. Sc. niger ſubtus piloſus, elytris villoſis & thorace poſterius pilis longis albis ciliato punctatis. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 7. p. 155. n. 19. t. 43. f. 6.*
Habitat in India, *antennis ad fullonem accedens, his pedibusque fuſcis.*

pellucidus. 315. Sc. holoſericeus obſcurus albo-obumbratus, elytris coſtatis. *Sulz. hiſt. inſ. t. 1. f. 9.*
Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 7. p. 155. n. 21. Melolontha Berolinenſis.
Voet coleoptr. t. 21. f. 150.
Habitat in Germania & Helvetia, *brunno ſimilis, at brevior, magisque rotundatus & convexus.*

cerealis. 316. Sc. ſcutellatus, ſubtus hirſutus, abdominis latere utroque albo-maculato. *Scop. delic. inſubr. 1. p. 49. t. 21. f.* E. a. b. c.
Habitat in Inſubria, *ſub initium æſtatis veſpere frequens in celti auſtrali aliisque arboribus, melolonthæ valde affinis.*

finuatus. 317. Sc. exſcutellatus niger, tibiis toto margine exteriore denticulatis. *Scop. delic. inſubr. 1. p. 52. t. 21. f.* E.
Habitat in agro Ticinenſi, *glaber, totus niger, ſupra punctulatus.*

fuſcefcens. 318. Sc. ſcutellatus fuſcefcens, ſcutello lineola tranſverſa duplicata, tibiis poſterioribus quadri-

den-

dentatis. *Scop. delic. insubr.* 1. *p.*53. *t.* 21. *f.* F.
Habitat in Insubria, *frequens inter segetes, æstate in arboribus, statura solstitialis, supra badius, subtus villis longioribus & rufescentibus hirsutus.*

deserti. 322. Sc. supra nigricans, subtus lanugine alba obsitus, elytris corpore brevioribus, scutello triangulari villoso albo. *Lepech. it.* I. *p.*313. *t.*19. *f.*7.
Habitat in deserto Sibiriæ uralensi, 9 *lineas longus, an hujus tribus?*

sepicola. 55. Sc. scutellatus muticus ferrugineus, thorace elytrisque pilosis. *Mus. Lud. Ulr.* 24.*
Habitat in India, *habitu horticolæ, at triplo major.*

syriacus. 56. Sc. scutellatus muticus, capite thoraceque piloso viridibus, elytris pilosis ciliatis. *Mus. Lud. Ulr.* 25.*
Habitat in India, *horticolæ statura.*

Leei. 427. Sc. scutellatus muticus cæruleus nitidissimus, capitis disco, thoracis fascia interrupta, elytrorumque vittis quatuor aureis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 4.
Habitat in India, *facie sc. vitis, at duplo fere major.*

bivittatus. 428. Sc. flavus nitidissimus, capite thoraceque vittis duabus communibus, elytris striis pluribus abbreviatis viridibus. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 5.
Habitat in Brasilia, *fervidæ facie, at paulo minor.*

†† *mandibula recta.*

a) *acuta*, Cetoniæ.

Chrysis. 49. Sc. scutellatus muticus, sterno porrecto, scutello elytris dimidio breviore. *Mus. Lud. Ulr.* 21.*

Fa-

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 52. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 15. Cetonia ſcutello elytris dimidio breviore, ſterno porrecto, corpore viridi.
Degeer inſ. 4. *p.* 319. *n.* 12. *t.* 19. *f.* 4. Scarabæus, ſcutello longiſſimo, &c.
Gron. zooph. p. 428. *t.* 15. *f.* 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 1. *f.* 10.
Voet coleoptr. t. 8. *f.* 63.
Habitat in America *magis auſtrali, aurati colore & magnitudine.*

ſurinamus. 50. Sc. ſcutellatus muticus niger, thoracis inciſurarumque marginibus flavis, ſterno porrecto. *Amœn. ac.* 6. *p.* 391. *
Habitat Surinami.
Caput *linea flava*, abdominis *ſegmentum ultimum maculis* 3-4 *flavis pictum.*

nitidus. 51. Sc. ſcutellatus muticus thorace poſtice lobato, capite ſpina recumbente, ſterno porrecto. *Muſ. Lud. Ulr.* 26. *
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 52. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 13. Cetonia thorace poſtice lobato, capite ſpina recumbente, ſterno cornuto.
Degeer inſ. 4. *p.* 321. *n.* 16. *t.* 19. *f.* 8. 9. Scarabæus ſcutello minimo, &c.
Gron. zooph. 455.
Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 5. 6.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* B. *f.* 4.
Voet coleoptr. t. 3. *f.* 23.
Habitat in America, *præſertim* Carolina.

Carmelita. 323. Sc. nigro-viridis, thorace elytrisque teſtaceis, ano albo bipunctato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 14.
Habitat in Africa, *ſtatura nitidi, capite nigro.*

qua-

quadri-punctatus. 324. Sc. niger, ano bipunctato, pedibus rufis: tibiis posterioribus spinis annulatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 27. *n.* 12.
Habitat in India, *antennis pedibusque ferrugineis.*

areatus. 325. Sc. niger pubescens, elytris disco rufo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 59. *n.* 49. *mant. inf.* 1. *p.* 31. *n.* 59.
Habitat in Virginia.

cruentatus. 326. Sc. niger, elytris viridibus nitidis, thoracis margine anoque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 59. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 31. *n.* 58.
Habitat ad Caput bonæ spei.

acuminatus. 327. Sc. obscure æneus pallido-maculatus, elytris acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 58. *n.* 47. *mant. inf.* 1. *p.* 31. *n.* 57.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 37.
Habitat ad Caput bonæ spei.

maculatus. 328. Sc. æneus nitidus, thorace utrinque macula, elytris plurimum albis, sterno obtuso. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 58. *n.* 46. *mant. inf.* 1. *p.* 31. *n.* 36.
Voet coleoptr. t. 1. *f.* 8. Antheus.
Habitat in Coromandel, *acuminati statura.*

stolatus. 329. Sc. viridi-fuscus, thorace margine punctisque, elytris fascia media maculisque niveis posterius acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 58. *n.* 45. *mant. inf.* 1. *p.* 31. *n.* 55.
Habitat in nova Hollandia.

philippensis. 330. Sc. æneus nitidus, thorace margine punctisque duobus albis, elytris maculatis acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 58. *n.* 44. *mant. inf.* 1. *p.* 30. *n.* 54.
Habitat in insulis Philippinis.

au-

auricalceus. 331. Sc. æneus opacus, elytris acuminatis albomaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 53.
Habitat prope Surate Indiæ.

fordens. 332. Sc. nigro-æneus, elytris lineis duabus elevatis alboque maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 52.
Habitat in Braſilia.

tetradactylus. 333. Sc. ſcutellatus muticus niger, pedibus triunguiculatis, pollice fixo. *Mont. pl. p.* 530.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 58. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 51. Cetonia atra, ſcutello elytris dimidio breviore, pedibus triunguiculatis: pollice fixo.
Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 7.
Sloan. jam. 2. 237. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali*, *inſulisque oppoſitis*.

orichalcus. 88. Sc. ſcutellatus muticus æneus glaber, ſubtus ferrugineo varius. *Syſt. nat. T.* III. *app. p.* 224.
Habitat in India.

gagates. 334. Sc. ater nitidus, clypeo truncato reflexo, ſterno obtuſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 50. *Foſter cent. inſ.* 6, 6.
Habitat in Sierra Leona Africæ.

Iris. 335. Sc. viridis nitidiſſimus fuſco-micans immaculatus. *Fabr. ſpec. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 49.
Habitat Surinami, *fulgidi magnitudine*, *ſterno porrecto*.

fulgidus. 336. Sc. æneus nitidiſſimus, abdominis ultimo ſegmento prominente quadripunctato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 30. *n.* 48.

Voet. coleoptr. t. 3. f. 24?
Hospitatur in museo Ill. Banks.

tricolor. 337. Sc. viridi-æneus hirtus, elytris testaceis: vitta media nigra futuraque ænea. *Fabr. sp. inf. 1. p. 57. n. 37. mant. inf. 1. p. 30. n. 47.*
Voet. coleoptr. t. 7. f. 60.
Habitat in America.

quadricolor. 338. Sc. thorace nigro: margine rufo, elytris æneo-nitidis: futura nigra. *Fabr. sp. inf. 1. p. 57. n. 36. mant. inf. 1. p. 30. n. 46.*
Habitat in Africa.

africanus. 339. Sc. æneus nitens, capitis spina incumbente, sterno porrecto, elytris punctis nigris striatis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 57. n. 35. mant. inf. 1. p. 30. n. 45.*
Drury inf. 2. t. 30. f. 4.
Habitat in Sierra Leon Africæ.

venereus. 340. Sc. cupreus nitidus, thorace scutello elytrisque viridibus. *Fabr. sp. inf. 1. p. 57. n. 34. mant. inf. 1. p. 30. n. 44.*
Herbst Arch. Inf. 7. p. 156. n. 10. Cetonia æruginea.
Voet coleoptr. t. 4. f. 26.
Habitat in Jamaica.

æthiopicus. 341. Sc. viridis fulvo micans, elytris maculis duabus nigris, sterno obtuso. *Fabr. sp. inf. 1. p. 56. n. 33. mant. inf. 1. p. 30. n. 43.*
Habitat in Africa *æquinoctiali.*

elegans. 342. Sc. viridis nitidissimus, elytrorum futura punctoque apicis atris. *Fabr. sp. inf. 1. p. 56. n. 32. mant. inf. 1. p. 30. n. 42.*
Habitat in Coromandel, *aurati magnitudine.*

spe-

speciosissimus. 343. Sc. scutellatus aurato-viridis, punctulatus lævis, tibiis interno latere rufo-ciliatis: posterioribus edentatis bispinosis. *Scop. delic. insubr. p.* 48. *t.* 21. *f.* A. a. b.
Habitat . . . . *Eremita major, aurato affinis, at corpore utrinque splendidissimo, thoracis foveis nullis, abdomine posterius non punctato, ejusque segmento primo ab reque lateribus unidentatis distinctus.*

coruscans. 344. Sc. cyaneus, thoracis margine elytrisque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 56. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 30. *n.* 41.
Voet. coleopt. t. 8. *f.* 62.
Habitat in India.

limbatus. 345. Sc. niger, thoracis margine ferrugineo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 56. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 30. *n.* 40.
Habitat in Ægypto.

fuliginosus. 346. Sc. scutellatus niger, supra opacus, subtus nitens, segmento femorali in dentem exeunte. *Scop. delic. insubr.* 1. *p.* 51. *t.* 21. *f.* D. b.
Habitat Paviæ *in hortis, campis, frequens in floribus onopordi acanthii, statura nobilem simulans.*

quinquelineatus. 347. Sc. niger thorace quinquelineato, elytris albo maculatis, clypeo reflexo spinaque incumbente. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 56. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 30. *n.* 39.
Hospitatur in museo Ill. Banks.

semipunctatus. 348. Sc. viridis nitidus, thorace quadrilineato, elytris basi lineatis, apice punctatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 38.
Habitat . . . . *mediæ magnitudinis, subtus albo villosus.*

trilineatus. 349. Sc. niger, thorace lineis tribus, elytris fa-

scia flexuosa scutelloque albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 56. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 37.
Habitat ad Caput bonæ spei.

pictus. 350. Sc. niger, thorace quinquelineato, elytris acuminatis albo maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 56. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 36.
Habitat in Oriente.

olivaceus. 351. Sc. testaceus, thorace lineis punctisque duobus, elytris maculis quatuor transversis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 55. *n.* 26. *mant. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 35.
Habitat in Sierra Leona Africæ.

thoracicus. 352. Sc. niger, thorace ferrugineo, elytris nigris subpurpurascentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 55. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 34.
Habitat Alexandriæ *in* Ægypto.

alexandrinus. 353. Sc. niger, thoracis margine elytrisque testaceis, elytris sutura fasciaque dentata nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 55. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 33.
Habitat Alexandriæ *in* Ægypto.

sinuosus. 354. Sc. fusco-viridis, thorace elytrisque margine punctisque duobus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 55. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 32.
Degeer inf. 7. *p.* 639. *n.* 38. *t.* 47. *f.* 20. Scarabæus punctato-marginatus.
Habitat ad Caput bonæ spei.

Ephippium. 355. Sc. niger, thoracis margine lineaque dorsali, elytris macula difformi ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 31.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 81.
Habitat in India, *lineolæ statura & magnitudine.*

li-

lineola. 53. Sc. muticus niger, lineola flava a capite ad scutellum ducta. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 55. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 30.
Degeer inf. 4. *p.* 320. *n.* 13. *t.* 13. *f.* 5. Scarabæus scutellatus niger nitidus flavo-maculatus, &c.
Roes. inf. 2. *Scar.* 1. *t.* B. *f.* 7.
Voet coleoptr. t. 9. *f.* 81.
Habitat in America, *stercorario minor.*

fictitius. 54. Sc. scutellatus muticus niger glaber, punctis albis sparsis, abdomine subtus punctis quatuor albis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 18. *n.* 5. *t.* 19. *f.* 27.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 59. *n.* 51. *mant. inf.* 1. *p.* 31. *n.* 61. Cetonia clypeo emarginato nigra albo-maculata, abdomine subtus punctis quatuor albis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 79. *n.* 14. Scarabæus nigro-cæruleſcens, &c.
Raj. inf. p. 104. *n.* 8.
Habitat in Galliæ & Calabriæ *carduis.*

funestus. 356. Sc. glaber niger, thorace elytrisque albo-punctatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 31. *n.* 62. *Scop. ent. carn.* 7.
Habitat in Carniola & Italia, *mediæ magnitudinis.*

thebanus. 357. Sc. niger, thorace rufo nigro maculato, elytris nigris albo punctatis, dorso rufo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 59. *n.* 52. *mant. inf.* 1. *p.* 31. *n.* 64. *Herbst Beschr. der berl. Naturf. Fr.* 4. *t.* 1. *f.* 8. & *apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 18. *n.* 6. *t.* 19. *f.* 28.
Habitat in Ægypto.

floralis. 358. Sc. glaber niger, thoracis, elytrorum abdominisque margine albo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 31. *n.* 63.

Ha-

Habitat in Africæ *floribus compositis, satis magnus.*

lugubris. 359. Sc. glaber ater, elytris macula laterali anoque albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 60. *n.* 53. *mant. inf.* 1. *p.* 31. *n.* 65.
Habitat ad Caput bonæ spei.

Histrio. 360. Sc. testaceus, capite, thoracis lineis duabus, elytrorum futura maculisque tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 60. *n.* 54. *mant. inf.* 1. *p.* 31. *n.* 66.
Habitat in Ægypto.

albellus. 361. Sc. ater, thorace, margine elytrisque maculis sparsis albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 60. *n.* 55. *mant. inf.* 1. *p.* 31. *n.* 67. *Pall. it.* I. *p.* 462. *n.* 17. *ic. inf. Roff.* 1. *p.* 17. *t.* A. *f* 18.
Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. *p.* 18. *n.* 7. *t.* 19. *f.* 29.
Habitat Tranquebariæ.

hottentottus. 362. Sc. ater glaber, elytris posterius punctis duobus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 60. *n.* 56. *mant. inf.* 1. *p.* 31. *n.* 68.
Habitat ad Caput bonæ spei.

cruentus. 363. Sc. ater glaber, thorace posterius maculis duabus elytrisque vitta sanguineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 32. *n.* 69.
Hospitatur in museo Ill. Banks, *statura hottentotti.*

squalidus. 68. Sc. scutellatus muticus niger hirtus, thorace subcarinato. *Sp. ent. carn.* 13.
Voet coleoptr. t. 4. *f* 33.
Habitat in Germania, *hirtello simillimus, an varietas?*

hirtellus. 69. Sc. scutellatus muticus hirtus testaceo-nigricans, elytris pallido-maculatis.

Fa-

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 59. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 31. *n.* 60. Cetonia (hirta) nigricans hirta elytris pallido maculatis, thorace carinato.
Scop. ent. carn. 8. *Poda inſ.* 21. Scarabæus hirtus.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 34.
Habitat in Europa *magis auſtrali, vere etiam frequens in omnibus deſertis* Volgæ *finitimis ad* Terek *uſque, vitis ubi gemmas foliiferas & floriferas exedens, faſciato dimidio minor.*

afer. 364. Sc. viridis, thoracis elytrorumque margine ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 29.
Habitat in Sierra Leon Africæ.

marginatus. 365. Sc. glaber ater, thoracis elytrorumque margin bus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 28.
Drury inſ. 2. *t.* 32. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 1. *f.* 4.

inſignitus. 366. Sc. thorace nigro: margine albo, elytris teſtaceis: ſutura margineque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 54. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 29. *n.* 27.
Voet coleoptr. t. 2. *f.* 13.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

capenſis. 73. Sc. ſcutellatus muticus rufus hirtus, adſperſus punctis albis. *Muſ. Lud. Ulr.* 30. *
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 54. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 26. Cetonia hirta rufa albo-punctata.
Degeer inſ. 7. *p.* 640. *n.* 40. *t.* 48. *f.* 2. Scarabæus albo punctatus.
Petiv. gaz. t. 8. *f.* 6.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 1. *t.* B. *f.* 6.
Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 2. *f.* 11.
Habitat in Africa.

ca-

cafer. 367. Sc. viridis nitidus, thoracis margine elytrorumque maculis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 54. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 25.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magnus, punctis inter oculos* 2. *albis.*

Eremita. 74. Sc. ſcutellatus æneo-ater, thorace inæquali, thorace ſulco longitudinali. *Scop. ent. carn.* 15. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 23.
Degeer inſ. 4. *p.* 300. *n.* 28. *t.* 10. *f.* 22. Scarabæus coriarius, &c.
Voet coleoptr. t. 3. *f.* 21. Scarabæus lugubris.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* 3. *f.* 8.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 10. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 26. *f.* 1.
Habitat in pyri, ſalicis *truncis putridis, recens corium ruſſicum olens.*

faſciularis. 75. Sc. ſcutellatus, thorace lineolis quatuor albis, elytris viridibus, abdominis inciſuris barbatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 26. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 24.
Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 2.
Voet coleoptr. t. 3. *f.* 17.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſubtus lana helvola in faſciculos digeſta veſtitus.*

ſmaragdinus. 368. Sc. ferrugineo-flaveſcens, elytris vireſcentibus, ſterno cornuto. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 22.
Habitat in America.

mœſtus. 369. Sc. piceus, abdominis ſegmentis margine albis, clypeo emarginato, ſterno cornuto. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 21.
Habitat in America *boreali.*

ater-

aterrimus. 370. Sc. niger obſcurus, elytris obſolete rufo-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 496. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 19.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura lanii.*

corniger. 371. Sc. niger obſcure immaculatus, thoracis margine anteriori ſubcornuto. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 496. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 20.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura aurati.*

ruber. 372. Sc. ſcutellatus ruber, elytris nigro-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 18.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* B. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 2. *f.* 16.
Hoſpitatur in muſeo Ill. Banks.

Lanius. 77. Sc. exſcutellatus muticus ruber, adſperſus punctis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 17.
Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 7. 8.
Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 8.
Voet coleoptr. t. 5. *f.* 44.
Habitat in america *meridionali.*

S. Franciſci. 373. Sc. piceus, thoracis margine flaveſcente, ſterno porrecto. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 28. *n.* 16.
Habitat in India, *ſtatura chryſis.*

micans. 374. Sc. viridis nitens, clypeo porrecto recurvo bifido, tibiis anterioribus ſerratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 1.
Drury inſ. 1. *t.* 32. *f.* 3.
Habitat in Sierra Leona Africæ.

ſinenſis. 375. Sc. æneus, clypeo emarginato ſubſpinoſo, thorace poſterius lobato, elytris acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 2.

For-

Forſter cent. inſ. 2. 2.
Voet coleoptr. t. 5. *f.* 40.
Habitat in Sina.

nigrita. 376. Sc. glaber ater, clypeo emarginato ſubſpinoſo, thorace poſterius lobato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 3.
Hermann. muſ. p. 17. *n.* 257.
Petiv. gazoph. t. 28. *f.* 3.
Habitat in Zeylon.

auratus. 28. Sc. ſcutellatus auratus, ſegmento abdominis primo lateribus unidentato, clypeo planiuſculo.
Fn. ſuec. 400. *Scop. ent. carn.* 17.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 50. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 4. Cetonia aurata, ſegmento abdominis primo lateribus unidentato, elytris albo maculatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 73. *n.* 5.
Hoeffn. pict. t. 6. *f.* prior.
Friſch inſ. 12. 25. *t.* 3. *f.* 1.
Raj. inſ. p. 76. *n.* 7.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 1. *t.* 2. *f.* 8. 9.
Degeer inſ. 4. *p.* 279. *n.* 25. *t.* 11. *f.* 1. Scarabæus Smaragdus.
Bergſtr. nomencl. 1. 14. *n.* 5. 6. 7. *t.* 2. *f.* 5. 6. 7.
Schaeff. icon. t. 26. *f.* 2. 3. 7. & *t.* 50. *f.* 8. 9.
Voet coleoptr. t. 1. *f.* 1. 2. 3.
Drury inſ. 1. *t.* 33. *f.* 1.
Pet. gaz. t. 23. *f.* 12.
Worm muſ. 342.
Ammir. inſ. t. 12.
Habitat, magnitudine & colore varius, in Europa, *larva in lignis putreſcentibus, & formicarum acervis, imago in floribus, præſertim pæoniæ, ſorbi aucupariæ, tacta per anum ejicit liquorem fœtidiſſimum.*
Sternum *porrectum*; pectoris *latera poſterius in dentem terminata.*

Mo-

Morio. 377. Sc. niger obſcurus, corpore ſubtus nitidiore. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 5. *mant. inſ.* 1, *p.* 27. *n.* 6.
Voet coleoptr. t. 2. *f.* 14.
Habitat in Europa *auſtrali*, *aurato proxime affinis.*

opacus. 378. Sc. obſcure viridis opacus, capitis clypeo reflexo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 27. *n.* 5.
Habitat in Africæ *floribus compoſitis*, *aurati magnitudine & ſtatura.*

erythropus. 379. Sc. niger, capitis clypeo porrecto baſi utrinque ſinuato, thoracis limbo elytrorumque margine cinereis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 27. *n.* 7.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *morionis ſtatura & magnitudine.*

variabilis. 79. Sc. ſcutellatus lævis opacus ater, elytris albo-punctatis. *Fn. ſuec.* 402. *
Fabr. mant. 1. *p.* 27. *n.* 11. Cetonia (octopunctata) nigra, thorace punctis quatuor albis.
Degeer inſ. 4. *p.* 301. *n.* 29. *t.* 10. *f.* 22. Scarabæus albo-punctatus.
Schaeff. ic. t. 198. *f.* 8.
Voet coleoptr. t. 5. *f.* 42.
Habitat in Germaniæ & Sibiriæ *quercubus*, *colore rubro & aureo varians*; *mas quintuplo minor.*

æruginoſus. 80. Sc. ſcutellatus auratus ſupra viridis. *Gron. muſ.* 424. *t.* 15. *f.* 7.
Habitat in regno Tunetato & Calabriæ *lentiſco*, *ſtatura aurati.*

cordatus. 380. Sc. niger, thorace utrinque puncto baſeos elytrisque duobus flavis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 27. *n.* 10.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 51. *n.* 7. Cetonia octopunctata.
Habitat . . . .

Lun-

Lundii. 381. Sc. ater nitidus, capitis clypeo cordato. *Fabr. mant.* 1. *p.* 27. *n.* 9.
Habitat ad Caput bovis ſpei.

nobilis. 81. Sc. ſcutellatus lævis auratus, abdomine poſterius albo-punctato. *Fn. ſuec.* 401. * *Scop. ent. carn.* 18.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 51. *n.* 6. Cetonia aurata, abdomine poſtice albo-punctato, elytris rugoſis.
Fabr. mant. 1. *p.* 27. *n.* 8. Cetonia cuſpidata.
Udm. diſſ. 1. Scarabæus viridi æneus, thorace ſulcato, elytris rugoſis.
Degeer inſ. 4. *p.* 297. *n.* 26. Scarabæus viridulus, &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 73. *n.* 6.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 1. *t.* 3. *f.* 1-5.
Schaeff. icon. t. 66. *f.* 5.
Voet coleoptr. t. 4. *f.* 28.
Habitat in Europa, *larva* (*griſea, capite ſanguineo, pedibus flaveſcentibus,*) *in ligno putreſcente, imago in floribus præſertim umbellatarum.*

æneus. 82. Sc. ſcutellatus oblongus cyaneus glaber, abdomine teſtaceo, capitis apice tridentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 29. *
Habitat - - - *brunni magnitudine, ſubtus pubeſcens.*

cæruleus. 382. Sc. glaberrimus glaucus, elytris chalybeis punctato-ſtriatis, maculis quinque albis. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 19. *n.* 8. *t.* 19. *f.* 30.
Habitat in India.

metallicus. 383. Sc. viridis auratus, ſubtus violaceus, annulis abdominis quatuor macula alba notatis.
Herbſt apud Fuessli n. ent. Mag. 1. *p.* 314.
Habitat in Europa.

bimucronatus. 384. Sc. teſtaceus, tibiis anterioribus majoribus bar-

barbatis, clypeo utrinque mucronato, villis fimbriato. *Pall. ic. inf. Roſſ.* 1. *p.* 13. *n.* 13. *t.* A. *f.* 13.
Habitat in Amboina, *habitu longimani, eremita duplo major.*

aureolus. 385. Sc. depreſſo-ſubangulatus, polline aureolus, thorace elytrisque nigro-punctatis. *Pall. ic. inf. Roſſ.* 1. *p.* 18. *t.* A. *f.* 20.
Habitat in Dauria, *Junio in rheo compacto florente frequens, farinoſo affinis, an hujus tribus?*

glaucus. 386. Sc. cylindraceus, totus teſtaceus glaber, commiſſura thoracis pallido-villoſa, abdomine glauco. *Pall. ic. inf. Roſſ.* 1. *p.* 19. *t.* B. *f.* A. 22.
Habitat in ſaluietis Aniketeri *inter* Cunnam & Caucaſum, *vere frequens ſullonis magnitudine.*

ſanguinolentus. 387. Sc. depreſſo-angulatus niger, thorace ſupra elytrisque diſco rubris, punctis elytrorum abdominisque crebris albis. *Pall. ic. inf. Roſſ.* 1. *p.* 21. *t.* B. *f.* A. 24.
Habitat in America *boreali, ſtictici forma & magnitudine.*

pulcher. 429. Sc. thorace elytrisque variegatis lævibus, capite nigro: ſpina incumbente. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 6.
Habitat in inſula Tobago, *marginati facie & magnitudine, ſubtus totus, antennis pedibusque ater.*

trivittatus. 430. Sc. thorace vittis tribus albidis, elytris flavo-teſtaceis: ſutura limboque nigro, hoc albo maculato. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 7.
Habitat in Sierra Leon Africæ, *aurato paulo minor, & magis depreſſus.*

ſubfaſciatus. 431. Sc. ſcutellatus muticus niger opacus, elytris fa-

fasciis quatuor lateralibus abbreviatis fulvis: posteriori maxima. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 8.
Habitat ad Caput bonæ spei, *aurato paulo minor & magis depressus.*

scabriusculus. 432. Sc. aureo niger, elytris anterius glabris posterius scabriusculis: linea elevata glabra abdomine utrinque albo-maculato. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 9.
Habitat - - - aurati facie, at paulo major.

b) *mandibula obtusa*, Trichii.

fasciatus. 70. Sc. scutellatus niger tomentoso-flavus, elytris fasciis duabus luteis coadunatis. *Fn. suec.* 395.* *Scop. ent. carn.* 5.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 48. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 25. *n.* 1. Trichius niger tomentoso-flavus, elytris fasciis tribus nigris abbreviatis.
Mouff. inf. 161. *f.* 6.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 80. *n.* 16.
Gunner act. Nidros. 4. *t.* 17. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 4.
Degeer inf. 4. *t.* 10. *f.* 19.
Drury inf. 1. *t.* 36. *f.* 2.
Voet coleoptr. t. 5. *f.* 43.
Habitat in Europæ *borealis*, *etiam* Calabriæ *ulterioris floribus Syringæ, filipendulæ, umbellatarum.*

succinctus. 388. Sc. niger tomentoso-cinereus; elytris nigris: fasciis duabus flavis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 25. *n.* 2. *Pall. ic. inf. Roff.* 1. *t.* A. *f.* 19.
Habitat in Germania, *statura fasciati, at duplo minor.*

indus. 71. Sc. scutellatus thorace hirsuto, elytris lividis fusco-punctatis. *Mus. Lud. Ulr.* 27. * *Fabr.*

br. ſp. inſ. 1. *p.* 48. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 25. *n.* 3.
Habitat in India, *ſtatura faſciati, cetoniis affinis.*

punctulatus. 389. Sc. capite thoraceque viridi-æneis glabris, elytris teſtaceis, abdominis ultimo ſegmento prominente bipunctato. *Fabr. mant.* 1. *p.* 25. *n.* 4.
Hoſpitatur in muſeo H. Banks.

bibens. 390. Sc. capite & thorace viridi-æneis piloſis, elytris teſtaceis viridi cæruleis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 5.
Habitat in America.

hemipterus. 63. Sc. ſcutellatus thorace tomentoſo rugis duabus longitudinalibus marginato, elytris abbreviatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 6.
Scop. ent. carn. 28. Scarabæus variegatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 78. *n.* 17.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 11. *f.* 7.
Voet coleoptr. t. 10. *f.* 88-90.
Habitat in Europa, *larva in ligno, imago in floribus, femina aculeo ani rigido brevi munita.*

lunulatus. 391. Sc. glaber cyaneus, elytris lunulis duabus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 7.
Habitat in Carolina.

virens. 392. Sc. viridis pubeſcens, ano albo bimaculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 8.
Habitat in India.

piger. 393. Sc. capite thoraceque æneis villoſis, elytris teſtaceis albo maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 9.
Habitat in America *boreali.*

Del-

Delta. 394. Sc. thorace nigro: triangulo albo, elytris teſtaceis: puncto fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 10.
Forſter cent. inſ. 1. *p.* 7. *n.* 7. Scarabæus ſcutellatus muticus flavus thorace atro: triangulo flavo, elytris teſtaceo-flavis nigro-maculatis.
Drury inſ. 2. *t.* 30. *f.* 1. 2.
Habitat in Americæ *floribus.*

fulvus. 395. Sc. pubeſcens, thorace fulvo nigro-lineato, elytris teſtaceis: ſutura fulva. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 11.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

nigripes. 396. Sc. hirtus fuſcus, elytris ſubteſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 12.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura fulvi.*

nævius. 397. Sc. ſupra glaber cinereo-maculatus, capite thoraceque nigris, elytris piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 26. *n.* 13.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura nigripedis.*

carbonarius. 423. Sc. hiſſutus totus niger, clypeo anguſto apice bifido. *Muſ. Lesk. p.* 4. *n.* 75.
Habitat extra Europam.

unguiculatus. 424. Sc. griſeus tomentoſus, thorace fuſco, clypeo apice anguſto ſulcato bifido, elytris rufis margine nigris piloſis, pedibus poſterioribus elongatis unguiculatis. *Muſ. Lesk. p.* 4. *n.* 76.
Habitat extra Europam.

** *palpis capitatis*, Trox.

fabulofus. 48. Sc. ſcutellatus niger opacus, tuberculis rugoſis, antennis baſi piloſis. *Fn. ſuec.* 390. *
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 34. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 1.

Trox

Trox thorace elytrisque rugosis, thorace integerrimo.
Scop. ent. carn. 23. Scarabæus rugosus.
Degeer inf. 4. *t.* 10. *f.* 12.
Habitat in Europæ *collibus fabulosis apricis.*

arenosus. 398. Sc. thorace subcanaliculato, elytris striatis, corpore obscuro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 18. *n.* 2.
Habitat Halæ Saxonum, *statura fabulosi, at duplo minor fuscus.*

subterosus. 399. Sc. griseus, thorace marginato: margine posteriori dentato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 34. *n.* 2. *inf.* 1. *p.* 18. *n.* 3.
Habitat in Brasilia.

horridus. 400. Sc. ater, thorace elytrisque spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 34. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 18. *n.* 4. *Pall. ic. inf. Roff.* 1. *p.* 10. *t.* A. *f.* 10. Scarabæus pectinatus.
Habitat in India.

silphoides. 401. Sc. niger, thorace marginato inæquali, elytris striatis spinosis. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 496. *mant. inf.* 1. *p.* 18. *n.* 5.
Habitat ad Caput bonæ spei, *statura horridi.*

spinicornis. 402. Sc. nigricans, thorace posterius utrinque emarginato, antennis spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 35. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 18. *n.* 6.
Habitat . . . .

cenebrioides. 403. Sc. ovatus piceus glaber, punctato-scaber, clypeo margine ciliato. *Pall. ic. inf. Roff.* 1. *p.* 9. A. 8. *t.* A. *f.* 9.
Habitat in Dauuriæ *campis glareosis aridis, inter* Ononem & Argunum *positis, Maio primo veris calore obvius, interdiu humi immobilis.*

mortici-nii. 404. Sc. filphoides, clypeo inæquali ciliato, elytris ſtriatis convexe punctatis hiſpidulis. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 11. *t.* A. *f.* 11.
Habitat in Tatariæ *deſertis aridiſſimis, ad fluvios* Ural & Irtin, *ſub cadaveribus æſtivo calore exſiccatis frequens, ani ad elytra attritu ſtridens, ut ſabuloſus, niger, opacus, foſſoris magnitudine.*

quadri-guttatus. 410. Sc. teſtaceus, capite thoraceque æneo nitidulis, abdominis ultimo ſegmento prominulo bipunctato. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 377.
Habitat in Sina, *ſtatura melolonthæ.*

miliarius. 425. Sc. elevato punctatus niger, thoracis dorſo ſulcato, elytris abdomen ſuperantibus deciſſato ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 54.
Habitat extra Europam, *elytris ſtriarum punctatarum ordinibus novem capitis punctis elevatis ſex.*

coracinus. 426. Sc. niger, frontis tuberculis duobus, thorace tuberculato, elytris abdomen ſuperantibus punctorum elevatorum ordinibus novem. *Muſ. Lesk. p.* 3. *n.* 55.
Habitat extra Europam.

longipes. 433. Sc. ſcutellatus muticus, capite thoraceque nigro, elytris pallide teſtaceis: lunula communi nigra, pedibus poſterioribus longiſſimis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 10.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magnitudine hortolæ, at ſupra magis depreſſus.*

**** palpis cylindricis, antennarum clava tunicata,* Lathrus.

cephalotes. 405. Sc. clypeo emarginato-bilobo. *Pall. it.* I. *app. p.* 461. *n.* 23.
Laxmann. nov. comm. Petrop. 14. *p.* 59. *n.* 4. *t.* 24. *f.* 1.

f. 1. *Pall. ic. inf. Roſſ.* 1. *t.* A. *f.* 1. Lucanus apterus.

Acharius nov. act. Stockh. 1781. *p.* 246. *t.* 5. *f.* 3-12. Bulbocerus cephalotes.

Scop. introd. in hiſt. nat. p. 439. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 2. Lathrus.

Habitat in Tatariæ, Roſſia, Hungariæ, *deſertis aridis ſub terra, monogamus, lævis, niger, ſubopacus, ſubrotundus thorace convexo marginato, elytris coalitis, vix thoracis longitudinem ſuperantibus, pedibus ſaltatoriis, mandibula adunco-falcata intus denticula, medius inter ſcarabæos & lucanos.*

hemiſphæricus. 406. Sc. hemiſphæricus, clypeo anterius obtuſe bidentato. *Pall. ic. inſ. Roſſ.* 1. *p.* 20. A. 23. *t.* B. *f.* A. 23.

Habitat - - - *ſacro major, cephalotæ perquam affinis, an ſpecie diſtinctus?*

190. LUCANUS. *Antennæ* clavatæ: clava compreſſa, latere latiore pectinatofiſſili.

Maxillæ porrectæ, exſertæ, dentatæ.

Penicilli duo ſub labio palpigeri.

Alces. 8. L. mandibulis exſertis apice quadridentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 1. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 1. *n.* 1. *Petiv. gazoph. t.* 47. *f.* 15.

Habitat in Aſia.

Cervus. 1. L. ſcutellatus: maxillis exſertis apice biſurcatis latere unidentatis. *Fn. ſuec.* 405. *Scop. ent. carn.* 1.

Fn. ſuec. 1. *n.* 377. Scarabæus cornibus duobus mobilibus æqualibus apice bifurcatis: introrſum ramis denticulisque inſtructis.

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 1. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 1. *n.* 2. Lucanus mandibulis exſertis unidentatis apice bifurcatis, labio deflexo: ruga tranſverſali elevata.

Geoffr. inſ. 1. *p.* 61. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1. Platycerus fuſcus, &c.

Mouff. inſ. 148. Cervus volans.

Raj. inſ. p. 74. *n.* 2. Scarabæus maximus platyceros, &c.

Olear. muſ. t. 16. *f.* 5. Taurus volans.

Aldrov. inſ. 151. *f.* 1.

Hoeffn. pict. t. 6.

Worm. muſ. 242.

Jonſt. inſ. t. 14. *f.* 1. 2.

Merean. eur. t. 168.

Imperat. nat. 924. *f.* 3.

Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* 4. 5.

Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 18. *n.* 1-3. *t.* 3. *f.* 1-3. & *t.* 4. *f.* 1.

Sulz. inſ. t. 1. *f.* 4.

Degeer inſ. 4. *t.* 12. *f.* 1.

Schaeff. ic. t. 133. *f.* 1.

Voet. coleoptr. t. 29. *f.* 1. 3.

Schluga t. 1. *f.* 1.

b) Scarabæus maxillis lunatis prominentibus dentatis, thorace inermi. *Fn. ſuec.* 338. (femina).

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 60. *n.* 2. Platycerus fuſcus, elytris lævibus, capite lævi.

O. F. Muller prodr. zool. dan. p. 444. Lucanus Dorcas.

Imper. nat. 925. *f.* 1. 2.

Gron. zooph. 446.

Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 1. *t.* 5. *f.* 8.

Schaeff. elem. t. 9. *f.* 1.

Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 25. *n.* 2. 3. *t.* 4. *f.* 2. 3.

Voet coleoptr. t. 29. *f.* 2. 4.

Habitat in Europæ & Sibiriæ *ligno quercino putretreſcente, femina minor, larva obeſa albida, capite*

te pedibusque ferrugineis, *a* Roeſelio *pro craſſo veterum habita.*

Elaphus. 9. L. mandibulis exſertis unidentatis apice bifurcatis, labio deflexo conico. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 1. *n.* 3.
Voet coleoptr. t. 30. *f.* 5.
Habitat in Virginia, *femina minor*, *mandibulis haud exſertis.*

Capreolus. 2. L. ſcutellatus, maxillis exſertis, apice tantum furcatis. *Amœn. acad.* 6. *p.* 391. *n.* 4. * *Muſ. Lud. Ulr.* 30. *
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 2. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 1. *n.* 4. Lucanus mandibulis exſertis apice tantum bifurcatis, labio ruga tranſverſa elevata interrupta.
Degeer inſ. 4. *t.* 19. *f.* 11. 12.
Merian. Europ. 168.
ß) Lucanus platyceros. *Scriba Schr. der. bel. Naturf.* 7. *p.* 728.
Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 63. *n.* 5.
Habitat in America *boreali*, Alſatia, Calabria, *cervo dimidio minor.*

Dania. 10. L. mandibulis exſertis intus bidentatis longitudine capitis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 1. *n.* 5.
Muſ. Lud. Ulr. 30. Lucanus Capreolus ß.
Habitat in Virginia.

Gazella. 11. L. mandibulis intus bidentatis, ater, elytrorum margine exteriori teſtaceo. *Fabr. mant.* 1. *p.* 1. *n.* 6.
Habitat in Siam, *damæ magnitudine.*

tridentatus. 3. L. maxilloſus depreſſus niger, thorace utrinque tridentato. *Fn. ſuec.* 406. *It. cel.* 152. * *Bonsdorf. nov. act. Stockh.* 1785. 3. *n.* 10. *p.* 216.

Ha-

Habitat in Oelandia, *thorace trilobato*; *an cervi parvus mera varietas minor?*

interruptus. 4. L. exſcutellatus antennis arcuatis, corpore oblongo depreſſo, vertice ſpina recumbente, thorace abdomineque remotis. *Muſ. Lud. Ulr.* 33. * *Muſ. Ad. Fr.* 82. *Gron. zooph.* 447. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 3. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 8. *Brown jam.* 429. *t.* 44. *f.* 7. Dermeſtes.
Merian. ſurin. t. 50.
Petiv. gaz. t. 27. *f.* 7.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 2.
Degeer inſ. 4. *t.* 19. *f.* 13.
Voet coleoptr. t. 29. *f.* 1.
Habitat in America, *ſub ſaccharo putreſcente, ſcarabæo vulgo proxime affinis*; *mas major ſpina capitis incumbente mandibulis truncato tridentatis, elytrorumque ſulcis lateribus punctatis, femina ſpina capitis elevata, arcuata, mandibulis acuto-tridentatis, elytrorumque ſulcis omnibus lævibus diſtincta.*

carinatus. 5. L. depreſſus, thorace mutico capite breviore: angulis poſterioribus excavatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 34. *
Habitat in India *abdomine breviſſimo, pectore poſterius angulum acutum terminato.*

parallelepipedus. 6. L. ſcutellatus depreſſus niger, maxillis dente laterali elevato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 2. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 1. *n.* 7. *Pontopp. alt. dan.* 1. *p.* 666. *t.* 29. *f.* 1.
Creſſr. inſ. par. 1. *p.* 62. *n.* 3. Platiceros niger, &c.
Voet coleoptr. t. 29. *f.* 7.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 1. *f.* 3. 4.
Degeer inſ. 4. *t.* 12. *f.* 9.
Schaeff. elem. t. 101. *f.* 1.
icon. t. 63. *f.* 7.
Habitat in Calabriæ, Galliæ, Angliæ, Germaniæ, Da-

Daniæ, Sueciæ, Sibiriæ *silvis*, *cervo feminæ similis*, *at* 8-*ies minor*, *niger*, *magis depressus*; *femina mare minor*, *mandibulis minoribus*, *punctoque capitis duplici prominente distincta.*

cancroides. 12. L. mandibulis incurvis: intus dente incrassato difformi, elytris punctato-subpubescentibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 2. *n.* 9.
Habitat in terra van Diemen, *virescente paulo major.*

virescens. 13. L. mandibulis tridentatis, corpore viridi-æneo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 3. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 2. *n.* 10.
Habitat in America.

tenebroides. 14. L. mandibulis lunatis unidentatis ater, thorace marginato, elytris subtiliatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 2. *n.* 11.
Habitat in Novogorod *inferiori* Rossiæ, *statura caraboidis*, *at paulo major*, *ater.*

caraboides. 7. L. scutellatus cærulescens, mandibulis lunatis, thorace marginato. *Fn. suec.* 407. * *Scop. ent. carn.* 2. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 3. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 2. *n.* 12.
Udm. diss. n. 40. Carabæus cærulescens.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 63. *n.* 4. Platyceros violaceo-cæruleus, &c.
Schaeff. ic. t. 6. *f.* 8. *et. t.* 75. *f.* 7. Platycerus.
Degeer inf. 4. *t.* 12. *f.* 11.
Voet coleoptr. t. 29. *f.* 8.
Habitat in Europæ *locis suffocatis*, *varians colore viridi & cæruleo.*

piceus. 15. L. ater glaber striatus, antennis, abdomine & pedibus piceis. *Bonsdorf nov. act. Stockh.* 1785. 3. *n.* 10. *p.* 217. *t.* 8. *f.* a.
Habitat in Ostrogothiæ & Westrogothiæ *lapidosis*, *Junio frequens.*

ca-

capensis. 16. L. exſcutellatus niger, elytrorum ſulcis punctatis. *Thunberg nov. inſ. ſpec.* 1. *p.* 5. *f.* 1.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *cylindricus, glaber, tenebrione foſſore paulo major.*

Pilmus. 17. L. exſcutellatus ater, corpore depreſſo, thorace ſtriato. *Molin. hiſt. nat. Chil. p.* 184.
Habitat in provincia Chilenſi Makle, *arvis leguminе conſitis infeſtus, 8 lineas longus; an hujus generis?*

Tarandus. 18. L. ſcutellatus ater glaberrimus, mandibulis exſertis apice tridentatis a latere interiori bidentatis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 1. *t.* 8. *f.* 2.
Habitat in Sierra Leon Africæ, *L. Cervo major.*

Antilope. 19. L. mandibulis exſertis a latere interiori bimarginatis: margine ſuperiori bidentato, inferiori quinquedentato. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 2. *t.* 8. *f.* 3.
Habitat in Sierra Leon Africæ, *brunneus, ſubglaber, magnitudine capreoli.*

Bubalus. 20. L. niger, mandibulis bifidis: altera parte porrecta, ſublunata interius tridentata; altera majore deflexa arcuata integra. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 3. *t.* 8. *f.* 4.
Habitat in Georgia Americæ, *caraboide duplo major.*

191. DERMESTES. *Antennæ* clavatæ : clava perfoliata : articulis tribus craſſioribus.
Thorax convexus, vix marginatus.
Caput ſub thorace inflexum condens.

* *maxilla bifida.*

lardarius. 1. D. niger, elytris anterius cinereis. *Fn. ſuec.* 408. *Geoffr. inſ. pariſ.* 1. *p.* 100. *n.* 5. *Scop. ent. carn.* 34. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 1.
Goed. inſ. 2. *t.* 41.
Blank. inſ. t. 11. *f.* K. L. M.
Raj. inſ. p. 107. *n.* 4.
Mer. inſ. 2. *t.* 33.
Friſch. inſ. 6. *t.* 9.
Degeer inſ. 4. *p.* 192. *n.* 1. *t.* 7. *f.* 15.
Schaeff. elem. t. 7. *f.* 1. 2.
icon. t. 42. *f.* 3.
Habitat in Europa, *larva ovata cinerea hirſuta in animalibus diu aſſervatis, lardo, carnibus, repaſtoriis culinariis & muſeis libris potiſſimum corio ſuillo aut aſinino a pilis non ſatis repurgato tectis infeſta, imago, olea & pinguedines aliis inſectis lethalia appetens, ſcybala inter vorandum ex ano protrudit concatenata pendula; rarior elytris anterius ferrugineis conſpicua.*

elongatus. 2. D. niger, elytris baſi faſciaque poſteriore lividis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 409. *
Habitat in Europa, *fere filiformis.* un-

Dermeſtis *larvæ exedunt & deſtruunt animalium cadavera, res culinares, pelles, libros;* apodes *lignum putreſcens.*

undatus. 3. D. oblongus niger, elytris faſcia alba lineari duplici. *Fn. ſuec.* 410. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 6.
Degeer inſ. 4. *p.* 199. *n.* 5. Dermeſtes oblongus niger, &c.
Schaeff. ic. t. 157. *f.* 7. a. b.
Habitat in Europæ *putridis, ſuffocatis.*

pellio. 4. D. niger, colleopteris punctis albis binis. *Fn. ſuec.* 411. * *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 100. *n.* 4. *Scop. ent. carn.* 37.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 63. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 5. Dermeſtes niger, elytris puncto albo.
Degeer inſ. 4. *p.* 197. *n.* 3. Dermeſtes bipunctatus.
Raj. inſ. p. 85. *n.* 35.
Friſch. inſ. 5. *p.* 22. *t.* 8.
Schaeff. ic. t. 42. *f.* 4.
β) Dermeſtes minor non punctatus. *Muſ. Leſk. p.* 5. *n.* 101.
Habitat in Europæ *pellibus, lardo, aliis cibariis, libris vetuſtis.*
Larva *oblonga, piloſa, cauda ſetoſa.*

macellarius. 5. D. niger glaber, pedibus piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 4.
Habitat in Germania, *lardario affinis.*

cadaverinus. 7. D. niger, ore ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 3.
Habitat in inſula S. Helenæ.

carnivorus. 8. D. niger, elytris anterius teſtaceis, abdomine albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 2.
Habitat in nova Hollandia & Seelandia.

trifaſciatus. 9. D. ovatus niger, elytris faſciis tribus undatis cinereis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 34. *n.* 7.

Geoffr.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 112. *n.* 5. Byrrhus fuſcus, &c.
Habitat in Europa *magis auſtrali, undati magnitudine & ſtatura.*

20 guttatus. 10. D. oblongus ater, punctis viginti albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 7. *mant.* 1. *p.* 34. *n.* 8. *Sulz. hiſt. inſ. t.* 2. *f.* 3.

bicolor. 11. D. oblongus niger ſubtus teſtaceus, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 9.
Habitat in Germania, *ſtatura murini.*

domeſticus. 12. D. niger, elytris griſeis margine nigris, thorace villoſo. *Fn. ſuec.* 424.*
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 111. *t.* 1. *f.* 6. Byrrhus.
Habitat in Europa, *thorace fere hemiſphærico.*

violaceus. 13. D. nigro-cæruleſcens, thorace villoſo. *Fn. ſuec.* 422.* *Scop. carn.* 51. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 15.
Fn. ſuec. 373. Dermeſtes nigro-cæruleus.
Degeer inſ. 5. *p.* 163. *n.* 4. *t.* 5. *f.* 13. Clerus cæruleus, &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 304. *n.* 2. Clerus nigro-cæruleus.
Raj. inſ. 100. Scarabæus antennis clavatis 12.
Habitat in Europæ *cadaveribus frequens, etiam in floribus.*

rufipes. 16. D. nigro-cæruleſcens, thorace villoſo, pedibus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 16.
Thunb. nov. inſ. ſpec. 1. *p.* 10. Anobium rufipes.
Habitat in Africa *æquinoctiali, an varietas violacei?*

ruficollis. 17. D. violaceus, thorace elytrorumque baſi rufis.

Fa-

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 65. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 17.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 8. *f.* 7.
Habitat in Africa & India, *violacei magnitudine, totus hirtus.*

cæruleus. 24. D. cæruleus hirtus linearis.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 10. Anobium cæruleum.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *violaceo ſimilis, at linearis.*

hirtus. 14. D. ater hirtus.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 82. *n.* 6. Hiſpa (hirta) antennis ferratis atra hirta.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 94. *n.* 18. Lagria atra.
Habitat in Europa, *undati magnitudine, pilis nigris hirtus.*

feneſtralis. 15. caſtaneus, capite nigricante, thorace fuſco. *Fn. ſuec.* 423.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 29.
Degeer inſ. 5. *p.* 197. *n.* 7. Ips ſpinoſus, &c.
Mull. prodr. zool. dan. p. 57. *n.* 505. Byrrhus feneſtralis, &c.
Habitat in Europa *borcali, frequens in feneſtris.*

vulpinus. 25. D. oblongus lævis niger, thoracis lateribus cinereo-villoſis ſubtus albidus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 10.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *carnivoro affinis & æqualis.*

felinus. 28. D. oblongus villoſus cinereus immaculatus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 34. *n.* 11.
Habitat in terra van Diemen, *an ſatis a vulpino diſtinctus?*

mu-

murinus. 18. D. oblongus tomentoſus nigro alboque nebuloſus, abdomine niveo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 12.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 563. *n.* 18. *Fn. ſuec.* 426. * *Scop. ent. carn.* 35. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 102. *n.* 7. Dermeſtes tomentoſus oblongus fuſco cinereoque nebuloſus, ſcutello luteo.
Degeer inſ. 4. *p.* 197. *n.* 2. Dermeſtes nebuloſus, &c.
Friſch. inſ. 4. *p.* 34. *t.* 18.
Schaeff. ic. t. 42. *f.* 1. 2.
Voet coleoptr. t. 31. *f.* 11.
Habitat in Europæ *cadaveribus frequens.*
Larva *oblonga brunnea, ore atro.*

teſſellatus. 31. D. oblongus tomentoſus fuſco cinereoque nebuloſus, abdomine fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 13.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 100. *n.* 8. Dermeſtes flavescens piloſus.

navalis. 32. D. elongatus ferrugineo-fuſcus, oculis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 14.
Habitat in nova Seelandia, *murino quadruplo minor.*

ſcaber. 33. D. griſeus, thorace elytrisque ſcabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 20. *mant. inſ* 1. *p.* 35. *n.* 25.
Habitat in nova Seelandia.

teſtaceus. 34. D. oblongus teſtaceus, oculis abdominisque baſi nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 24.
Habitat in Belgio.

fumatus. 22. D. oblongus teſtaceus, oculis nigris. *Fn. ſuec.* 432. * *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 104. *n.* 12. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 19. *Scop. ent. carn.* 59. Dermeſtes roſæ. *De-*

Degeer. inſ. 4. *p.*195. *n.*3. Ips teſtaceo-flavus, &c.
Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 4. *p.* 20. *n.* 7. *t.*20. *f.* 1 ?
Habitat in Europæ *floribus*, *in viis*, *fimo equino.*

picipes. 35. D. oblongus nigricans, pedibus piceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 23.
Habitat Halæ Saxonum, *tomentoſi ſtatura & magnitudine.*

chinenſis. 36. D. oblongus ferrugineus, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 66. *n.*21, *mant. inſ.* 1. *p.*36. *n.*27.
Habitat in ſeminibus e Sina *allatis.*

paniceus. 19. D. oblongus ferrugineus, oculis rufis. *Fn. ſuec.* 431. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 22.
Friſch inſ. 2. *p.* 36. *t.* 8.
Habitat in Europæ *pane diutius aſſervato*, *glutine bibliopegorum*, *& libris ultisque*, *quibus hoc adhæret*, *ſeminis milii magnitudine.*
Larva *ovata alba nitida.*

ferrugineus. 21. D. oblongus ferrugineus ſemicylindricus, elytris abbreviatis. *Fn. ſuec.* 433. *
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 91. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 6. Nitidula ferruginea ?
Schranck apud Fuessli n. entom. Mag. 1. *p.* 140. Dermeſtes teſtaceus.
Laicharting inſ. tyr. 1. *p.* 104. *n.* 2. Oſtoma ferruginea ?
Lesk. it. p. 46. *t.* A. *f.* 11 ?
Habitat in Europa.

Euſtatius. 20. D. ater glaber obtuſiſſimus, pedibus ferrugineis.
Habitat in inſulæ Euſtatii *fungis*, *pediculi magnitudine.*

pedi-

pedicularius. 23. D. oblongus teſtaceus, elytris abbreviatis. *Fn. ſuec.* 424. * *Schranck inſ. auſtr. n.* 56. *Herbſt. apud Fuessli Arch. Inſ* 4. *p.* 22. *n.* 13. *t.*20. *f.*6. *Fn. ſuec.* 1. *n.* 441. Chryſomela dilute teſtacea hemiptera.
Habitat in Europæ *floribus frequens.*

fuſcus. 37. D. oblongus villoſus fuſcus immaculatus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 21.
Habitat Halæ Saxonum & Kilonii, *tomentoſi ſtatura & magnitudine.*

tomentoſus. 38. D. oblongus villoſus griſeus, capite punctis duobus fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.*1. *p.*66. *n.*17. *mant. inſ.* 1. *p.* 35. *n.* 20.
Degeer inſ. 4. *p.* 199. *n.* 4. *t.* 7. *f.* 18.
Habitat in Angliæ, Sueciæ *floribus.*

ſanguinicollis. 39. D. elongatus hirtus violaceus, thorace abdomineque rufis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 35. *n.* 18.
Habitat Halæ Saxonum, *chryſomelæ ſtatura, antennis dermeſtis.*

limbatus. 40. D. fuſcus, elytris punctatis: limbo cinereo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.*36. *n.* 28.
Habitat in nova Seelandia, *parvus.*

ſcanicus. 26. D. ater thorace punctoque elytrorum teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 22. *mant. inſ.*1. *n.*27. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 564. *n.* 26. *Fn. ſuec.* 437. * Dermeſtes fuſcus, thorace teſtaceo.
Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 4. *p.* 21. *n.* 8. *t.*20. *f.* 2.
Habitat in Suecia & Germania.

Colon. 27. D. thorace lateribus flavis, elytris griſeis: puncto nigro. *Fn. ſuec.* 430. *
Habitat in Europa.

furi-

ſurinamenſis. 29. D. teſtaceus, elytris ſtriatis, thorace ſtriis tribus elevatis marginibusque denticulato.
Habitat in Surinamo & Sibiria, *oblongus, pediculi magnitudine.* Rolander.

hemipterus. 30. C. elytris abbreviatis baſi exteriore apiceque teſtaceis.
Habitat Surinami, *pediculi magnitudine.* Rolander.
Antennæ *capitatæ*; pedes *ferruginei*; elytra *abdomine dimidio breviora; ſingulis macula cuneiformis in apice, & punctum glaucum ad baſin exteriorem elytri.*

bifaſciatus. 41. D. niger, elytris faſciis binis undulatis luteis, thorace cinereo-teſſellato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 6. *f.* 2.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *undati magnitudine, at latior.*

interruptus. 42. D. niger, faſcia baſeos elytrorum rubra interrupta. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 6. *f.* 3.
Habitat --- undati magnitudine.

bipuſtulatus. 43. D. ater glaber, capite, thorace punctoque baſeos elytrorum rubris. *Thunb. nov. ſp. inſ.* 1. *p.* 6. *f.* 4.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 45. *n.* 7. Ips humeralis.
Habitat --- magnitudine pulicis.

marginatus. 44. D. niger, thoracis lateribus, pectore inciſuriſque abdominis albis. *Thunb. nov. ſp. inſ.* 1. *p.* 7. *f.* 6.
Habitat in India & *ad* Caput bonæ ſpei, *magnitudine & facie lardarii, ſed paulo major, & totus hirtus.*

piceus. 45. D. totus ferrugineus, elytris ſtriatis. *Thunb. nov. inſ.* 1. *p.* 8.

Ha-

Habitat in India *& ad* Caput bonæ ſpei, *marginati magnitudine & ſtatura.*

capenſis. 46. D. ater hirtus, elytris flexilibus violaceis: faſciis duabus albis.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 9. *f.* 8. Anobium capenſe.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magnitudine majoris pediculi.*

cafer. 47. D. niger glaber, elytris faſciis duabus luteis.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *t.* 9. *f.* 9. Anobium bifaſciatum.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſublineari oblongus.*

viridis. 48. D. viridis hirtus, pedibus rubris.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 9. Anobium viride.
Habitat in Africa *&* India.

fimetarius. 49. D. flaveſcente fuſcus, thorace marginato, antennis pedibusque ſpadiceis. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 21. *n.* 10 *t.* 20. *f.* 3.
Habitat Berolini *in fimo & floribus, convexus,* 1½ *lineas longus.*

cellaris. 50. D. fuſceſcens, antennis longis, elytris ſtriatis. *Scop. ent. carn. n.* 42.
Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 4. *p.* 22. *n.* 12. *t.* 20. *f.* 5.
Habitat in Germaniæ *parietibus, vere frequens,* ⅔ *lineæ longus.*

longicornis. 51. D. fuſcus, antennis longis, thorace medio excavato, elytris punctatis. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 23. *n.* 15. *t.* 20. *f.* 8.
Habitat Berolini, *lineam longus, cellari affinis.*

Plura hujus nominis inſecta habent Scopoli & Geoffroi, Schranck, Laicharting, Moll.

flaveſcens. 52. D. ferrugineus ſubtus flaveſcens, capite obſcuriore, oculis nigris, thorace tereti. *Schranck apud Fuessli n. ent. Mag.* 1. *p.* 140.
Habitat in Bavaria, *ferrugineo affinis.*

fulvipes. 53. D. niger oblongus, elytris punctatis, pedibus fulvis.
Schranck apud Fuessli n. ent. Mag. 1. *p.* 141. Dermeſtes leucophilus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 108. *n.* 21.
Habitat - - -

fulcatus. 61. D. fuſco ruber, oculis nigris, elytris fulcatis punctatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 2. *n.* 1.
Habitat in Suecia, *pediculo duplo major.*

feneſtratus. 62. D. fuſcus, elytris maculis ſedecim pallidis, tibiis omnibus ſpinoſis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 3. *n.* 2.
Habitat Upſaliæ, *ptini mollis magnitudine.*

ruber. 63. D. ruber, thorace glaberrime ferrugineo-nigro, lateribus rufis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 3. *n.* 3.
Habitat Upſaliæ, *pediculo vix major, ſilphæ melanocephalæ affinis.*

linearis. 64. D. corpore elytrisque linearibus ferrugineis, capite thoraceque fuſcis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 4. *n.* 4.
Habitat in Suecia, *feneſtrali ſimilis, at multoties major.*

ater. 658. D. ater nitidus, elytris tenuiſſime punctatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 4. *n.* 5.
Habitat Upſaliæ, *magnitudine coccinellæ bipunctatæ.*

bipuſtulatus. 66. D. niger, capite thoraceque rubris, elytris nigris: baſi macula rubra. *Thunb. nov. act. Upſ.* 1. *p.* 4. *n.* 6.

Ha-

Habitat Upſaliæ, *pediculo vix major.*

faſciatus. 67. D. niger, elytris faſciis duabus undulatis luteſcentibus. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 5. *n.* 7.
Habitat Upſaliæ, *pedicali magnitudine.*

** *maxilla unidentata:* Apate.

muricatus. 6. D. elytris reticulatis poſterius retuſis dentatis, thorace muricato gibbo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 1.
Pall. ſpic. zool. 9. *p.* 7. *t.* 1. *f.* 3. Ligniperda terebrans.
Habitat in Americæ *meridionalis lignis.*

hamatus. 54. D. elytris ante apicem uniſpinoſis, thoracis margine anteriori bihamato denticulato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 2.
Habitat in Saxoniæ *lignis, ſtatura muricati, at minor.*

Monachus. 55. D. elytris obtuſis, thorace gibbo truncato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 3.
Pall. ſpic. zool. 9. *p.* 8. *t.* 1. *f.* 4. Ligniperda cornuta.
Habitat in Americæ *meridionalis lignis.*

Jeſuita. 56. D. elytris integris variolaſis, thorace anterius truncato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 4.
Habitat in nova Hollandia.

indicus. 57. D. elytris integris nigris, thorace anterius ſcabro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 5.
Habitat in Coromandel, *minuto affinis, at paulo major.*

minutus. 58. D. niger, elytris integris piceis, thorace anterius ſcabro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 6.
Habitat in nova Seelandia.

exilis. 59. D. ater, elytris integris pallidis: margine omni nigro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 7.
Habitat Kilonii *ſub fagi cortice, parvus.*

villoſus. 60. D. thorace villoſo, elytris integris fuſcis: margine punctisque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 8.
Habitat Halæ Saxonum.

pallipes. 68. D. oblongus planus ater nitidus, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Succiæ *floribus, minutus.*

lunatus. 69. D. oblongus niger, elytris lunula dorſali cinerea. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Suecia, *ſub arborum corticibus, parvus.*

ruficornis. 70. D. fuſcus capite retracto, antennis pedibusque ruſis. *Muſ. Leſk. p.* 5. *n.* 108. b.
Habitat in Europa, *minimus.*

BOSTRICHUS. *Antennæ* clavatæ: clava ſolida. *Thorax* convexus vix marginatus. *Caput* ſub thorace inflexo conditum.

Capucinus. 1. B. niger, elytris abdomineque rubris, thorace retuſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 1. *Syſt.*

Boſtrichi *fertiliſſimi larva et imago cortices arborum et ligna excedit, ſilvarum aliquando peſtis pernicioſiſſima. ſ. F. Gmelin Abh. von der Wurmtrocknis Liſſ.* 1787.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 562. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 416. Dermeſtes capucinus.
Geoff. inſ. par. 1. *p.* 302. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 1. Boſtrichus niger, &c.
Schaeff. elem. t. 28.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 5. 6. c.
ε) Dermeſtes capucinus abdomine nigro. *Lepechin it.* II. *t.* 11. *f.* 3.
Habitat in Europæ, ε) Sibiriæ, *truncis, præſertim emortuis, parietibus.*

flavicornis. 2. B. piceus, elytris apice ſpinoſo-dentatis, antennis flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 2.
Habitat in America *boreali.*

elongatus. 3. B. elongatus ater, pedibus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 3.
Habitat in Upſaliæ *ligno antiquo.*

typographus. 4. B. teſtaceus piloſus, elytris ſtriatis retuſis præmorſo-dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 67. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 4.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 562. *n.* 7. *Fn. ſuec.* 418. *It. oel.* 26, 195. *Lepech. it.* II. *p.* 202. *t.* 81. *f.* 21. Dermeſtes typographus.
Degeer inſ. 5. *p.* 193. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 1. 2. Ips piloſus fuſcus, &c.
Raj. inſ. p. 100. *n.* 10.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 4.
Habitat intra Europæ, Americæ, Sibiriæ *cortices arborum, præſertim piceæ infeſtiſſimus, fertiliſſimus, voraciſſimus, intra corticem canalem effodiens, ex quo ad latus plures utrinque minores ſubparalleli exeunt, pro ætate magnitudine, magis adhuc colore flaveſcente, fuſceſcente, fuſco, ſubatro varians, vitæ tenaciſſimus.*

chal-

chalcographus. 5. B. ater, elytris præmorſo-dentatis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 4. *mant. inſ.* 36. *n.* 5. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 562. *n.*8. *Fn. ſuec.* 417. Dermeſtes chalcographus.
Habitat intra arborum Europæ *cortices*, *colore nigro & teſtaceo varians.*

polygraphus. 6. B. nigricans, elytris glaucis obtuſiuſculis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*68. *n.*5. *mant. inſ.* 1. *p.*37. *n.*6. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 562. *n.* 10. *Fn. ſuec.* 420. Dermeſtes polygraphus.
Degeer inſ. 5. *p.* 106. *n*, 5. Ips rufo-fuſcus, &c.
Habitat in Europa *boreali ſub arborum corticibus, labyrinthos formans, inter nocentiores ſui generis.*

micrographus. 7. B. ferrugineus, elytris integris teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 7.
Syſt. nat. XII. 2. *p.*562. *n.*9. *Fn. ſuec.* 419. Dermeſtes (micrographus) teſtaceus glaber, thorace nigro, elytris apice retuſo-dentatis.
Habitat in Europæ *ligno*, *etiam intra cortices arborum*, *parvus*, *niger*, *elytris*, *antennis pedibusque teſtaceis.*

bidentatus. 8. B. niger, coleopteris teſtaceis apice retuſis bihamatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 8.
Herbſt apud Fuesslı Arch. inſ. 4. *p.* 24. *n.* 6. *t.* 20. *f.* 10. Boſtrichus bidentatus.
Lepech. it. II. *p.*202. *t.* 11. *f.* 22. Scarabæus thorace mutico, elytris apice excavatis mucronibus 4 inſtructis?
Habitat in Saxonia & Sibiria, *polygraphi magnitudine.*

Scolytus. 9. B. glaber nigricans, elytris truncatis integris, abdomine retuſo, fronte villoſa cinereſcente. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 9.

Geoffr.

Geoffr. inſ. pariſ. 1. *p.* 310. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 5. Scolytus.
Suæz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 13.
Schæff. ic. t. 112.
Habitat ſub Angliæ *ulmorum cortice, quas miſere devaſtat.*

crenatus. 10. B. glaber ater, elytris integris piceis crenato-ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 10.
Habitat in Germania, *ſcolyti ſtatura & magnitudine.*

pygmæus. 11. B. ater nitidus, elytris integris rufis, abdomine retuſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 11.
Habitat Halæ Saxonum, *ſcolyto proxime affinis, at tripla minor.*

ligniperda. 12. B. villoſus teſtaceus, corpore nigricante, tibiis quatuor poſterioribus ſerratis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 12.
Habitat in Germaniæ *ligno, piniperda paulo major.*

piniperda. 13. B. niger ſubvilloſus, elytris piceis integris, plantis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 13. *Lesk. it. p.* 11. *t.* A. *f.* 2. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 563. *n.* 11. *Fn. ſuec.* 421. Dermeſtes piniperda.
Degeer inſ. 5. *p.* 194. *n.* 2. *t.* 6. *f.* 8. 9. Ips ſubvilloſus niger nitidus, &c.
Habitat in Europæ *pini ramulis inferioribus, quos perforat, exſiccat, deſtruit, hortulanus naturæ, curculionis fere ſtatura; colore elytrorum varians.*

teſtaceus. 14. B. glaber teſtaceus, elytris lævibus, longitudine abdominis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 37. *n.* 14.
Habitat in pini truncis, *piniperdæ ſtatura oblonga.*

varius. 15. B. ſubvilloſus, corpore nigro cinereoque vario.

Fa-

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 69. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 15.

Habitat in Hafniæ *arboretis antennarum clava acuminata.*

vittatus. 16. B. ſubvilloſus fuſcus, elytris vitta abbreviata cinerea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 16.

Habitat in Europæ *truncis arborum, ſtatura varii, at duplo minor.*

minutus. 17. B. glaber ater immaculatus, elytris integris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 17.

Habitat Kilonii *in boleto verſicolore.*

maculatus. 18. B. niger, elytris faſcia undata punctisque rubris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 7. *f.* 5.

Habitat in Suecia, *ſtatura dermeſtis undati, antennis moniliformibus, an hujus generis?*

bifaſciatus. 19. B. ater, elytris flavis: faſciis duabus nigro-cæruleſcentibus denticulatis.

Lepech. it. II. *p.* 206. *t.* 10. *f.* 3. Dermeſtes bifaſciatus.

Habitat in Sibiria.

limbatus. 20. B. niger, elytris flaveſcentibus marginatis fuſco-limbatis.

Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 1. *p.* 24. *n.* 7. *t.* 20. *f.* 11.

Habitat in Pomeramia, 1½ *lineas longus thorace capucino ſimilis.*

fuſcus. 21. B. fuſcus, elytris ſtriatis: ſtriis apice cohærentibus, tibiis extus dentatis, plantis ruſis. *Muſ. Leſk. p.* 6. *n.* 112.

Habitat in Europa.

pi-

pilosus. 22. B testaceus pilosus, elytris punctato-striatis, apice retusis dentatus. *Mus. Lesk. p.* 6. *n.* 113. *Habitat in* Europa.

MELYRIS. *Labium* clavatum emarginatum.
Antennæ totæ perfoliatæ.
Maxilla unidentata acuta.

viridis. 1. M. viridis elytris lineis elevatis tribus. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 1. *mant. ins.* 1. *p.* 36. *n.* 1. *Habitat ad* Caput bonæ spei.

nigra. 2. M. nigra, elytris lineis elevatis tribus. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 36. *n.* 2. *Habitat* - - - *statura viridis, at triplo minor.*

192. PTINUS. *Antennæ* filiformes: articulis ultimis majoribus.
Thorax subrotundus, non marginatus, caput excipiens.

* *palpis clavatis*: Anobia.

rugosus. 1. Pt. fuscus thorace inæquali, elytris striatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 39. *n.* 1. *Habitat* Kilonii, *pertinace duplo major, immaculatus.*

pertinax. 2. Pt. fuscus unicolor. *Fn. suec.* 414. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 71. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 2. Anobium fuscum immaculatum. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 112. *n.* 4. Byrrhus totus nigro-fuscus. *Degeer inf.* 4. *p.* 227. *n.* 1. *t.* 8. *f.* 24. 25. Byrrhus nigro-fuscus, &c. *Habitat in* Europa *captus mortui instar se contrahens immobilis, e ligno, petissimum querno confecta*

ſta deſtruens, libris etiam infeſtus, ab attelabo formicario eradicatur.

mollis. 3. Pt. teſtaceus oculis fuſcis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 71. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 3. Anobium teſtaceum, oculis nigris.
Fn. ſuec. 415. *Bergius nov. act. Stockh.* 1786. 4. *p.* 268. Dermeſtes mollis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 112. *n.* 2. Byrrhus teſtaceus glaber.
Degeer inſ. 4. *p.* 230. *n.* 4. *t.* 8. *f.* 29. Byrrhus rufo-fuſcus, oculis nigris, &c.
Habitat in Europæ quiſquiliis, herbariis etiam inviſus, calore furni pellendus.
Larva *alba frigoris patientiſſima.*

frumentarius. 7. Pt. teſtaceus, thorace ciliato: dorſo plano carinato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 5.
Habitat in pane diutius aſſervato, capitur in navi prope Braſiliam.

planus. 8. Pt. fuſcus, thorace plano, elytris crenato-ſtriatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 39. *n.* 4.
Habitat Kilonii.

flavipes. 9. Pt. villoſus niger, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 4.
Habitat Hamburgi.

lineatus. 10. Pt. piloſus niger, elytris lineis ſeſquitertiis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 6.
Habitat in Braſilia, *ſtatura cantharidis nigræ; an hujus generis?*

cyaneus. 11. Pt. ſubvilloſus cyaneus, antennis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 7.
Habitat in America *magis auſtrali, cantharidis nigræ ſtatura & magnitudine.* mi-

minutus. 12. Pt. subvillosus niger thorace elytrisque cyaneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 72. *n.* 8.
Habitat in nova Seelandia, *statura cyanei, at duplo minor, elytris interdum virescentibus.*

pulsator. 13. Pt. cylindricus opacus rugosus maculis griseis adspersus. *Schaller Abh. hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 249.
Habitat Halæ Saxonum *in truncis vetustis salicis & domibus, vero præsertim termitis instar pulsans, statura pertinacis, magnitudine dermestis lardarii.*

fagi. 14. Pt. niger, antennis fuscis, elytris punctato-sulcatis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 26. *n.* 2. *t.* 28. *f.* 12.
Habitat Berolini, 3. *lineas longus.*

ferrugineus. 15. Pt. ferrugineus, oculis nigris, elytris obsolete striatis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 37. *n.* 3. *t.* 20. *f.* 13.
Habitat in Marchia.

testaceus. 16. Pt. ferrugineus, oculis nigris, elytris glaberrimis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 7. *p.* 158. *n.* 4.
Habitat Berolini, *an satis a ferrugineo distinctus?*

capensis. 26. Pt. ferrugineus, elytris striatis pallidioribus. *Fabr. mant. inf.* 2. *app. p.* 378.
Habitat ad Caput bonæ spei, *statura pertinacis, at duplo minor.*

fuscus. 27. Pt. fuscus, corpore griseo irrorato, scutello griseo, antennis ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 6. *n.* 121.
Habitat in Europa.

rufus. 28. Pt. rufus luteo nitens, thorace utrinque posterius

rius macula lutea, elytris punctato striatis. *Muſ. Lesk. p.* 6. *n.* 122.
Habitat in Europa.

ferrugineus. 29. Pt. ferrugineus, thorace inæquali, elytris punctato striatis, antennis rufescentibus. *Muſ. Lesk. p.* 6. *n.* 123.
Habitat in Europa, *antennarum articulis* 3 *ultimis majoribus, compreſſis obconicis.*

striatulus. 30. Pt. testaceus, elytris leviſſime striatis, antennarum articulis tribus ultimis majoribus. *Muſ. Lesk. p.* 6. *n.* 127.
Habitat in Europa.

brunneus. 31. Pt. brunneus, elytris leviſſime striatis, pubescentibus. *Muſ. Lesk. p.* 6. *n.* 128.
Habitat in Europa.

** *palpis filiformibus:* Ptini.

Gigas. 17. Pt. griseus, elytris posterius cinereis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 1.

imperialis. 4. Pt. fuscus, thorace subcarinato, coleoptris macula lobata alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 5.
Mull. zool. dan. prodr. p. 57. *n.* 507. Bruchus imperialis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 7.
Habitat in Europæ *borealis*, & Calabriæ *arboribus, ſeminis tritici magnitudine.*
Antennæ *longitudine corporis* pedesque *ferruginei*; scutellum *niveum*; elytra *nigra*, *macula alba aquilam inſignium quodammodo referente notata.*

Fur. 5. Pt. testaceus subapterus, thorace quadridentato, elytris fasciis duabus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*

p. 73. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 40. *n.* 4.
Fn. Suec. 651. Cerambyx Fur.
Geoffr. inf. parif. 1. *p.* 164. *n.* 4. *t.* 2. *f.* 6. Bruchus teſtaceus.
Degeer inſ. 4. *p.* 231. *n.* 5. *t.* 9. *f.* 5. 6. Byrrhus rapax.
Scop. ent. carn. 210. Bupreſtis Fur.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 8.
Schaeff. elem. t. 30.
Friſch. inſ. 13. *t.* 15.
Habitat in Europæ *ſeminibus*, *in muſeis peſſimus*, *deſtruens herbaria*, *inſecta*, *aves*, *pelles*, *utenſilia*, *libros*, *culinaria*, *imo pulverem tabaci*, *ambroſiacis non peliendus*, *frigoris & humiditatis amans*, *calore & ſiccitate arcendus*, *arſenico & alumine*, *certius mercurio corroſivo ſublimato albo occidendus*, *habitu*, *facie*, *moribus*, *metamorphoſi ad dermeſtes*, *dentibus thoracis lateralibus ad cerambyces accedens*; femina *aptera*; larva *hexapus obeſa*, *mollis*, *piloſa*, *ſegmentis dorſalibus prominulis*; puppa *intra globum glutinoſum*.

longicornis. 18. Pt. ater nitidus, pedibus flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 3.
Habitat in Germania, *furis magnitudine*.

germanus. 6. Pt. fuſcus, thorace tranſverſim rugoſo, pedibus ferrugineis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 72. *n.* 2. *mant. inſ. p.* 40. *n.* 2. Ptinus fuſcus, thorace quadridentato, elytris villoſis cinereo-variis.
Habitat in Europæ *quercu*, *furi affinis*, *ſed major*. Antennæ *ferrugineæ*, *longitudine corporis*.

Latro. 19. Pt. teſtaceus immaculatus, thorace bidentato.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 73. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 40. *n.* 6.
Habitat Argentorati. Hermann.

ſpi-

spinicornis. 20. Pt. oblongus, antennarum articulis duobus prioribus longioribus spinosis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 40. *n.* 7.
Habitat in Sandwichii *insulis.*

sulcatus. 21. Pt. albidus, thorace quadrisulcato villoso, elytris connatis fusco-testaceis nitidis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 73. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 40. *n.* 6.
Habitat in plantis siccis ex insulis Canariis *missis, fure minor.*

Scotias. 22. Pt. thorace lævi piceo, elytris connatis fusco testaceis nitidis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 74. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 40. *n.* 8. *Herbst apud Faessli Arch. Ins.* 4. *p.* 27. *n.* 5. *t.* 20. *f.* 14.
Czenpinsk. diss. 51. 155. *Jacquin miscell. austr. t.* 23. *f.* 1. Scotias pslyloides.
Scranck inf. austr. Scotias Seminulum.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 164. *n.* 2. Bruchus totus testaceus, &c.
Scop. introd. hist. nat. 505. Gibbium?
Habitat in Europæ *magis australis betula.*

striatus. 23. Pt. thorace gibbo bituberculato, coleoptris globosis striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 40. *n.* 10.
Habitat Halæ Saxonum, *statura scotiæ.*

upsaliensis. 24. Pt. testaceus, oculis nigris, elytris striatis, thorace convexo-plano. *Thunb. nov. act. Upsal.* 4. *p.* 6. *n.* 9.
Habitat Upsaliæ, *pediculi magnitudine, molli duplo minor; an hujus tribus?*

Faber. 25. Pt. testaceo-obscurus, elytris lævibus cinereo-undulatis. *Thunb. nov. act. Upsal.* 4. *p.* 6. *n.* 10.
Habitat in Hollandia, *pertinace major.*

apterus. 32. Pt. capite fusco: fronte canaliculata, elytris ama-

annatis pedibus antennisque rufis, femoribus clavatis; tibiis ciliatis. *Muſ. Lesk. p.7. n. 130.*
Habitat - - -

193. HISTER. *Antennæ* clavatæ: clava ſolida, infimo articulo compreſſo, decurvato.
Caput intra corpus retractile.
Os forcipatum.
Elytra corpore breviora.
Tibiæ anteriores dentatæ.

maximus. 1. H. maximus.
Muſ. Lud. Ulr. 36. * Hiſter unicolor.
Habitat in India, *unicolori ſimilis, ſed decuplo major, thoracis angulis rotundatis, pectoris apice non ad os uſque extenſo.*

major. 2. H. ater, elytris ſubſtriatis, thoracis marginibus ciliatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 1.
Voet. coleoptr. t. 31. *f.* 6.
Habitat in Africa, *unicolori ſimillimus, at duplo major.*

niger. 7. H. niger, punctis elevatis ſcaber. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 4.
Habitat in Hiſpania, *unicoloris magnitudine.*

unicolor. 3. H. ater, elytris oblique ſtriatis. *Fn. ſuec.* 440. * *Scop. ent. carn.* 30. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 2.
Degeer inſ. 4. *p.* 342. *n.* 1. *t.* 12. *f.* 12.
Hiſter niger nitidus, elytris ſtriatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 94. *t.* 1. *f.* 4. Attelabus totus niger, &c.
Raj. inſ. p. 91. *n.* 7. Scarabæus antennis globuloſis, &c.

Gun-

Gunner act. nidroſ. 4. *t.* 16. *f.* 4.
Schaeff. ic. t. 42. *f.* 10. & *t.* 208. *f.* 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 8. 9.
β) Hiſter elytris ſtriis quinque punctatis dimidiatis. *Muſ. Lesk. p.* 5. *n.* 89.
γ) Hiſter elytris ſtriis tribus integris duabusque parvulis. *Muſ. Lesk. p.* 5. *n.* 90.
Habitat in Europæ & Americæ *arena*, *terra*, *ſtercore*, β) *triplo*, γ) *quadruplo minor.*

cyaneus. 8. H. thorace æneo, elytris cæruleſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 4.
Habitat in nova Hollandia.

planus. 9. H. planus ater opacus, elytris lævissimis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 9.
Habitat in Helvetia.

brunneus. 10. H. ferrugineus, elytris ſubſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 6.
Habitat in Sueciæ *ſtercore.*

pygmæus. 4. H. ater, elytris lævissimis. *Fn. ſuec.* 441. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 7.
Degeer inſ. 4. *p.* 344. *n.* 4. Hiſter nigro-fuſcus, &c.
Schaeff. ic. t. 42. *f.* 10.
Habitat in Europa *boreali*, *unicolori ſimillimus*, at *quadruplo minor.*

depreſſus. 11. H. depreſſus ater nitidiſſimus, elytris ſubſtriatis. *Fabr. mant. inſ. p.* 32. *n.* 8.
Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 4. *p.* 20. *n.* 7. Hiſter compreſſus.
Habitat ſub betulæ *cortice.*

abbreviatus. 12. H. ater, elytris crenato-ſtriatis: ſtriis interiori-

ribus abbreviatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 32. *n.* 9.
Habitat in America *boreali*, *ſtatura pigmæi.*

bimaculatus. 5. H. ater, elytris poſterius rubris. *Fn. ſuec.* 442.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 6. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 10.
Scop. ent. carn. 51. Hiſter fimetarius.
Degeer inſ. 4. *p.* 343. *n.* 2. Hiſter niger nitidus, &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 95. *n.* 2. Attelabus niger, &c.
Udm. diſſ. 80. Coccinella atra glabra, elytris abdomine brevioribus, maculis duabus rubris.
Schaeff. ic. t. 3. *f.* 9.
elem. t. 24. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 31. *f.* 1.
Habitat in Europæ *ſtercore bovino.*

quadrimaculatus. 6. H. ater, elytris bimaculatis. *Fn. ſuec.* 443.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 61. *mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 11.
Degeer inſ. 4. *p.* 344. *n.* 3. Hiſter niger nitidus, &c.
Gadd ſatag. 76. Scarabæus ovatus niger glaber, maculis duabus rubris in ſingulo elytro.
Schaeff. elem. t. 24. *f.* 2.
icon. t. 3. *f.* 9. *& t.* 14.
Voet coleoptr. t. 31. *f.* 3.
Habitat in Europa *boreali*, *maculis elytrorum interdum cohærentibus.*

æneus. 13. H. æneus, elytris baſi ſtriatis apice punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 33. *n.* 12.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 95. *n.* 3. Attelabus nigro cupreus.
Habitat in Anglia, Gallia.

detritus. 14. H. ater nitens, elytris piceis apice obſcuris.

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 62. *n.*10. *mant. inſ.*1. *p.*33. *n.* 13.
Habitat in nova Hollandia.

ſtriatus. 152. H. ater, thorace elytrisque ſtriatis. *Forſter nov. ſp. inſ. cent.* 1. *p.* 11. *n.* 11.
Habitat in Anglia.

pulicarius. 16. H. niger, elytris ſtriatis apice pallidis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 7. *n.* 11.
Habitat in Suecia, *pygmæi magnitudine.*

apterus. 17. H. fulvus, alis nullis. *Scop. ent. carn. n.* 32.
Habitat in Carniola.

194. GYRINUS. *Antennæ* cylindricæ.
Maxilla cornea, acutiſſima.
Oculi 4: duo ſupra, duo infra.

Natator. 1. G. ſubſtriatus. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 194. *t.* 3. *f.* 3. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 297. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 1.
En. ſuec. 779. *Scop. ent. carn.* 299. Dytiſcus ovatus glaber, antennis capite brevioribus obtuſis.
Merret pin. 203. Pulex aquaticus.
Pet. gaz. 21. *t.* 13. *f.* 9. Scarabæus niger noſtras, ſupra aquam velociter circumnatans.
Raj. inſ. p. 89. *n.* 9. Scarabæus aquæ, ſubrotundus e cæruleo viridi ſplendente undique tinctus.
Modeer act. ſoc. phyſiogr. Lond. I. 3. *p.* 158. *Gyrinus pygolampis.*
Roeſ. inſ. 3. *p.* 195. *t.* 31.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 43.
Poda inſ. 44. *n.* 4.
Schaeff. elem. t. 67.
Habitat in Europæ *lacubus, frequens, nitidiſſimus, fœtens, velociſſime ſupra aquam per orbes curſitans, dum*

dum vero urinatur, bullam aeream hydrargyri coloris secum trahens.

bicolor. 3. G. niger subtus ferrugineus, pedibus posterioribus compressis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 194. *n.* 2.
Habitat in Suecia *aquis, natatore major.*

australis. 4. G. subtriatus virescens: elytris abbreviatis unidentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 298. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 194. *n.* 3.
Modeer act. soc. physiogr. Lond. I. 3. *p.* 159. *n.* 5.
Habitat in novæ Hollandiæ *aquis.*

americanus. 2. G. lævis ater opacus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 298. *n.* 3. *mant. inf* 1. *p.* 194. *n.* 4. *Modeer act. soc. physiogr. Lond.* I. 3. *p.* 157. *n.* 2.
Habitat in America *meridionalis aquis, natatori similis, sed duplo major.*

spinosus. 5. G. niger nitidus, thoracis elytrorumque margine flavo, elytris spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 298. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 194. *n.* 5.
Habitat in Coromandel, *congeneribus similis, at spinis elytrorum duabus elongatis acutissimis distinctus.*

grossus. 6. G. subtus ater, supra niger, lævis, glaberrimus, elytris apicibus rotundatis. *Modeer act. soc. physiogr. Lond.* I. 3. *p.* 156. *n.* 1.
Habitat in aquis claris ad Caput bonæ spei.

formosus. 7. G. subtus ater, pectore, sterno pedibusque ferrugineis, supra obscure æneo-virescens, linea labii transversa, maculis binis frontis, thoracis linea transversa interrupta, striisque elytrorum rubro-subauratis. *Modeer act. soc. physiogr. Lond.* I. 3. *p.* 157. *n.* 3.
β) Gyrinus minor non auratus. *Modeer act. soc. physiogr. Lond.* I. 3. *p.* 157.

Habitat in aquis claris ad Caput bonæ ſpei, β) *duplo minor.*

orientalis. 8. G. ſubtus pallide ferrugineus, ſupra æneo-niger, elytris utrinque compreſſis ſtriatis ſubauratis, poſterius quadridentatis. *Modeer act. ſoc. phyſiogr. Lond.* I. 3. *p.* 160. *n.* 6.
Habitat - - - *teretiuſculus, elytris abdominis longitudine.*

Viola aquatica. 9. G. ſubtus pallide ferrugineus, ſupra ater glaberrimus, ſubtomentoſo murinus. *Modeer act. ſoc. phyſiogr. Lond.* I. 3. *p.* 160. *n.* 7.
Aldr. inſ. l. 7. *c.* 1. *Jonſt. inſ. l.* 4. *c.* 1. Viola aquatica.
Habitat in aquis ſalſis.

195. BYRRHUS. *Antennæ* clavatæ: clava perfoliata.
Palpi æquales, ſubclavati.
Maxilla bifida.
Labium bifidum.

Gigas. 1. B. niger, elytris punctatis ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* I. *p.* 38. *n.* 1.
Habitat in Auſtria, *pilula major.*
Feminæ *anus aculeo armatus.*

Pilula. 4. B. fuſcus, elytris ſtriis atris interruptis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 69. *n.* 1. *mant. inſ.* I. *p.* 38. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 427. Dermeſtes tomentoſus ovatus fuſco-nebuloſus.
Degeer inſ. 4. *p.* 213. *n.* 9. *t.* 7. *f.* 23. Dermeſtes ovatus, &c.
Geoffr. inſ. par. 4. *p.* 116. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 8. Ciſtela ſubvilloſa virideſcens, &c.
β) Byrrhus maculatus. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 25. *n.* 2.

Ha-

Habitat in Europæ *ſabuloſis*, *colore nigro interdum conſpicuus.*

ater. 2. B. niger immaculatus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 117. *n.* 3. Ciſtela nigra nitens glabra.
Habitat in Germania, *piſtulæ ſtatura & magnitudine.*

dorſalis. 3. B. nigricans, coleoptris macula tranſverſa ferruginea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 4.
Habitat Kilonii, *atro proxime affinis, at paulo minor.*

varius. 5. B. niger, thorace æneo, elytris fuſcis: ſtriis tribus abbreviatis viridibus nigro maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 5.
Habitat in Anglia.

æneus. 6. B. totus æneus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 38. *n.* 6.
Habitat Upſaliæ, *ſcutello albido.*

nitidus. 7. B. totus nitidus, ſupra æneo-viridis, ſubtus niger. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 252.
Habitat Halæ Saxonum *in ſaxoſis*, *vere infra ſaxa frequens.*

faſciatus. 8. B. nigricans, elytris faſcia lata fuſca. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 26. *n.* 4.
Voet coleoptr. t. 32. *f.* 2?
Habitat Berolini.

vireſcens. 9. B. vireſcens, ſcutello luteo. *Muſ. Lesk. p.* 6. *n.* 116.
Habitat in Europa.

AN-

ANTHRENUS. *Antennæ* clavatæ: clava solida.
Palpi inæquales, filiformes.
Maxilla membranacea, linearis, bifida.
Labium integrum.

Pimpinellæ. 4. A. niger, elytris fascia alba apice ferrugineus, litura alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 70. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 1.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 114. *n.* 1. Anthrenus squamosus niger, &c.
Habitat in pimpinellæ floribus Galliæ.

Scrophulariæ. 1. A. niger, elytris albo-maculatis: sutura sanguinea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 70. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 2.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 569. Byrrhus Scrophulariæ.
Fn. suec. 429. Dermestes tomentosus maculatus, sutura elytrorum rubra.
Degeer inf. 4. *p.* 200. *n.* 6. *t.* 7. *f.* 20. Dermestes ovatus niger, &c.
Raj. inf. p. 85. *n.* 35.
Sulz. hist. inf. t. 2. *f.* 11. h.
Bergstr. nomencl. 1. *t.* 11. *f.* 9. 10.
Schaeff. elem. t. 17.
icon. t. 176. *f.* 4.
Habitat in Europæ *scrophulariis.*

museorum. 2. A. nebulosus, elytris subnebulosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 70. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 39. *n.* 3.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 568. *n.* 2. Byrrhus museorum.
Fn. suec. 430. Dermestes tomentosus maculatus, elytris puncto albo.

De-

An ad hoc genus spectat dubius Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 1. *p.* 41. *n.* 10. *t.* 21. *f.* k. k.

Degeer inf. par. 4. *p.* 203. *n.* 7. *t.* 8. *f.* 11. 12. Dermeſtes ovatus fuſcus, &c.
Habitat in muſcis, *animalia aſſervata deſtruens, libris quoque infeſtus, præcedenti ſimilis, at minor.*

Verbaſci. 3. A. niger, elytris faſciis tribus undatis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 39. *n.* 4.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 568. *n.* 3. Byrrhus fuſcus, elytris faſciis tribus undulatis pallidis.
Geoffroi inſ. par. 1. *p.* 115. *n.* 2. Anthrenus ſquamoſus niger, elytris fuſcis, &c.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 11. *f.* 11. 12.

vagus. 5. A. cinereus, elytris faſciis nigris tribus obſoletis.
Habitat in Europa, *Suecia*; *an hujus generis?*

glaber. 6. A. glaber niger, elytris, pedibus antennisque fuſcis. *Herbſt apud Fuesslı Arch. Inſ.* 4. *p* 26. *n.* 4.
Habitat Berolini, *magnitudine dermeſtis pellionis.*

fuſcus. 7. A. fuſcus pilis luteis leviſſime tomentoſus apice pallido. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n.* 119. b.
Habitat in Europa.

196. SILPHA. *Antennæ* clavatæ: clava perfoliata.
Elytra marginata.
Caput prominens.
Thorax planiuſculus, marginatus.

germanica. 1. S. oblonga atra, clypeo obrotundo inæquali marginato, elytris obtuſiſſimis margine laterali ferrugineis.
Degeer inſ. 4. *p.* 173. *n.* 2. *t.* 6. *f.* 4. Silpha tota atra, elytris truncatis abdomine brevioribus.

Fa-

Harum *larva & imago, animalium imprimis cadaveribus paſcitur.*

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 83. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 569. *n.* 1. Necrophorus ater, thorace obrotundo inæquali.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 99. *n.* 2. Dermeſtes thorace marginato, elytris abſciſſis, totus niger.

Raj. inſ. p. 107. *n.* 1.

Liſt. ſcar. angl. p. 381.

Voet coleoptr. t. 30. *f.* 4. 5.

Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 10.

ε) Silpha ſpecioſa, elytris maculis duabus aurantiacis. *Schulze Naturf.* 6. *p.* 95. *t.* 4.

γ) Silpha humator. *Bergſtr. nomencl.* 1. *t.* 10. *f.* 9.

Habitat multiplici varietate in Germania, *cadavera ovo impregnata ſepeliens.*

Veſpillo. 2. S. oblonga atra, clypeo orbiculato inæquali, elytris faſcia duplici ferruginea. *Fn. ſuec.* 444. * *Muſ. Lud. Ulr.* 37. *

Degeer inſ. par. 4. *p.* 168. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 1. Silpha nigra, elytris truncatis, &c.

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 84. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 2. Nicrophorus ater, elytris faſcia duplici ferruginea.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 98. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 5. Dermeſtes thorace marginato, &c.

Scop. ent. can. 33. Dermeſtes veſpillo.

Raj. inſ. 106.

Liſter ſcar. p. 381. *n.* 2.

Mouff. inſ. 149. *f.* 1.

Imp. alt. 692. *t.* 2. *f.* 2.

Blanck. inſ. 160. *t.* 14. *f.* 1.

Gleditſch act. Berol. 1752. *p.* 53.

Petiv. gazoph. t. 13. *f.* 6.

Poda inſ. t. 1. *f.* 2.

Voet coleoptr. t. 30. *f.* 1-3.

Roeſ. inſ. 4. *t.* 1. *f.* 1. 2.

Friſch inſ. 12. *p.* 28. *t.* 3. *f.* 2.

Bergſtr. nomencl. 1. 10. 14. *t.* 1. *f.* 14.

Scha-

Schaeff. ic. t. 9. f. 4.

β) Silpha veſpilloides. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 4. p. 32. n. 3.*

Habitat multiplici varietate, in Europa, America, *cadavera ovo impregnata ſepeliens, moſchum non raro ſpirans, elytris erectis approximatis, ocyſſime volitans, acaris infeſtata; in* America *interdum decuplo major.*

bimaculata. 3. S. ovata nigra, antennarum capitulis globoſis, pedibus ferrugineis.

Habitat in Barbaria, *oryzæ magnitudine, thoracis margine ſubferrugineo, elytris in medio macula rubra notatis.*

quadripuſtulata. 5. S. oblonga nigra, elytris punctis duobus ferrugineis. *Fn. ſuec. 446.**

Degeer inſ. 4. p. 185. n. 12. t. 6. f. 20. 21. Silpha nigra oblonga depreſſa, &c.

Fabr. ſyſt. ent. p. 69. n. 3. Tritoma quadripuſtulata.

Fabr. ſp. inſ. 1. p. 80. n. 2. mant. inſ. 1. p. 45. n. 5. Ips quadripuſtulata.

Geoffr. inſ. par. 1. p. 106. n. 16?

Friſch. inſ. 9. 36. t. 19.

β) Silpha americana quadruplo major.

Habitat in Europæ & Americæ *ligno putreſcente, glaberrimus, ſtatura ſcarabæi*, larva *oblonga hirſuta griſea.*

dorſalis. 4. S. oblonga ſupra pallida coleoptris macula media nigra. *Fabr. mant. inſ. 1. p. 45. n. 4.*

Habitat in Europa *auſtrali, quadripuſtulata paulo major.*

notata. 17. S. atra, elytris macula baſeos rufa. *Fabr. mant. inſ. 1. p. 45. n. 3.*

Habitat Halæ Saxonum, *dorſalis ſtatura.*

bi-

bipunctata. 53. S. atra, elytris rufis: macula magna atra. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 45. *n.* 2.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

faſciata. 24. S. atra, elytris faſciis duabus rufis: anteriori nigro-maculata. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 80. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 45. *n.* 1.
Habitat in America *boreali.*

rufipes. 25. S. atra, capite, thorace pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 45. *n.* 6.
Fabr. ſp. inf. 1. *p.* 80. *n.* 2. Tritoma rufipes.
Habitat in Norwegiæ *fungis arboreis*, *in* Germania *duplo major.*

quadrimaculata. 27. S. rufa, thorace elytrisque nigris: his maculis duabus rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 45. *n.* 8.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 256. Silpha quadrimaculata oblonga ferruginea, ſuperne nigra, elytris ſtriatis: maculis duabus ferrugineis.
Habitat Halæ Saxonum, *ad ruſſicam accedens.*

punctulata. 32. Sc. oblonga nigra, elytris punctis faſciaque poſteriore fulvis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 46. *n.* 9.
Habitat Halæ Saxonum, *parva.*

glabra. 34. S. oblonga nigra, thorace rufo, elytris nigris: maculis duabus obſolete rufis, pedibus rufis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 255. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 46. *n.* 10. Ips ſanguinicollis.
Habitat Halæ Saxonum, *mediæ magnitudinis*, *ad ruſſicam accedens.*

picea. 36. S. picea, elytris nigris, baſi faſciaque poſteriore ferrugineis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 46. *n.* 11. *Ha-*

Habitat in Germania, *quadripuſtula minor.*

quadri-guttata. 37. S. oblonga nitida atra, elytris maculis duabus albis, anteriore ſinuata. *Fab. ſp. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 14. *Herbſt. apud Fuesslı Arch. Inſ.* 7. *p.* 158. *n.* 4. *t.* 43. *f.* 17. *Habitat* Kilonii.

nigri-cornis. 38. S. flava, antennis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 12.
Habitat Halæ Saxonum, *ænea paulo major; an hujus generis?*

ænea. 39. S. oblonga rufa, elytris cæruleo-viridibus, antennis nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 254.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 46. *n.* 13. Ips ænea.
Habitat in ſilvis Magdeburgicis, *mediæ magnitudinis.*

crenata. 40 S. oblonga nigra, thorace rugoſo, elytris ſtriato-crenatis: maculis duabus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 15. *Herbſt apud Fuesslı Arch. Inſ.* 4. *p.* 31. *n.* 2. *t.* 20. *f* 2.
Fabr. Syſt. ent. p. 69. *n.* 4. Tritoma crenata.
Habitat in Suecia, *quadripuſtulata quadruplo minor.*

rufi-frons. 41. S. oblonga glabra atra, fronte pedibus maculisque duabus elytrorum ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 46. *n.* 16. *Fabr. ſyſt. ent. p.* 69. *n.* 5. Tritoma rufifrons.
Habitat in Anglia.

bifaſciata. 42. S. nigra, elytris faſciis duabus punctoque apicis ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 17.
Habitat Halæ Saxonum, *minuta.*

ni-

nigra. 43. S. oblonga nigra immaculata. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 18.
Habitat in Uplandiæ *boletis*, *parva.*

hæmorrhoidalis. 79. S. rufa, elytris nigris apice rufis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Suecia, *rufipedi proxime affinis.*

binotata. 80. S. teſtacea, elytris ſtriatis: maculis duabus nigris. *Petagn. inſ. Calabr. p.*7,*n.*31. *f.*XXXIII.
Habitat in ſepibus circa Bellimontum Calabriæ, *ſtatura ruſticæ.*

ſpadicea. 81. S. oblonga glabra, oculis apiceque elytrorum nigris. *Leſk. it. p.* 14. *t.* A. *f.* 3.
Habitat in Luſatiæ *monte* Keulenberg, 2½ *lineas longa.*

ſexdentata. 44. S. nigra, thorace ſexdentato, elytris anguſtis punctato-ſulcatis. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 31. *n.* 3. *t.* 20. *f.* 21.
Habitat in oryza, 1½ *lineas longa.*

collaris. 45. S. ovata nigra, thorace, pedibus antennisque luteis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 256.
Habitat in ligno ducatus Magdeburgici, *ruſſica dimidio minor.*

carnaria. 46. S. fuſca, elytris obtuſis pubeſcentibus: maculis duabus teſtaceis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 257.
Habitat in cadaveribus, *nitidulæ rufipedi ſimilis, at minor.*

indica. 6. S. nigra, elytris faſciis duabus ferrugineis, thorace anterius bidentato. *Muſ. Lud. Ulr.* 38.*

Fa-

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 85. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 4.
Habitat in India.

americana. 7. S. ovata fuſca, clypeo flavo, centro nigro intra annulum fulvum.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 85. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 5. Silpha depreſſa nigra, thorace flavo: centro nigro.
Catesb. Car. 3. *t.* 10. *f.* 5. Blatta americana.
Habitat in America, *veſpillonis magnitudine.*

Seminulum. 8. S. ovata atra nitida immaculata, abdomine rubro. *Fn. ſuec.* 447.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 79. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 13. Sphæridium atrum, abdomine pedibusque rufis.
Habitat in Europæ *hortis & floribus, parva; teſtam duſypodis inſtar componens, terrefacta ſimilis ſemini caput & pectus abdomini applicans, ut exacte granum glabrum lucidum referat, quiete jaciendo facile ſeducens inventorem.*

agaricina. 9. S. ovata atra glaberrima hemiptera. *Fn. ſuec.* 448.
Scop. ent. carn. 43. Dermeſtes agaricinus.
Habitat in agaricis.

ruſſica. 10. S. oblonga rufa, antennis, elytris, pectoreque nigris. *Fn. ſuec.* 449.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 6.
Uddm. diſſ. 7. Dermeſtes elytris nigris, capite, clypeo & abdomine rubro.
Degeer inſ. 5. *p.* 283. *n.* 1. *t.* 8. *f.* 12. Antribus ruber, &c.
Herbſt Apud Fuesslı Arch. Inſ. 7. *p.* 159. *n.* 14. *t.* 43. *f.* 9.
Habitat in Europa *boreali*, & Calabria.

li-

livida. 47. S. fuſca thorace elytris pedibusque lividis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 48. *n.* 3. *Herbſt apud Fuesslí Arch. Inſ.* 4. *p.* 34. *n.* 10.
Habitat in Germania *littoralis ſtatura, ſed duplo minor.*

littoralis. 11. S. atra, elytris lævibus: lineis elevatis tribus, thorace orbiculato nitido. *Fn. ſuec.* 450. * *Scop. ent. carn.* 55. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 2.
Fn. ſuec. 380. Caſſida atra, elytris lineis tribus elevatis, antennis antice teſtaceis.
Degeer inſ. 4. *p.* 176. *n.* 4. Silpha rufo-clavata, &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 102. *n.* 3. Peltis nigra, &c.
Schaeff. ic. t. 218. *f.* 1.
Friſch inſ. 6. *p.* 12. *t.* 5.
Bergſtr. nomencl. 1. 24. 6. *t.* 3. *f.* 6.
e) Silpha clavipes? *Sulz. hiſt. inſ. t.* 2. *f.* 14?
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 11. *f.* 3.
Habitat in Europæ *cadaveribus.*
Larva *ovata, depreſſa, fuſca, voraciſſima.*

furinamenſis. 48. S. atra, elytris faſcia poſteriore flava, femoribus poſterioribus dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 1.
Habitat in America *meridionali.*

inæqualis. 49. S. atra, elytris lævibus: lineis elevatis tribus, thorace inæquali emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 13.
Habitat in America *ſeptentrionali, atratæ affinis.*

granulata. 50. S. atra, elytris lineis elevatis tribus punctisque granulatis, thorace emarginato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 12.
Habitat in Africa, *atratæ paulo major.*

atrata. 12. S. atra, elytris punctatis: lineis elevatis tribus læ-

lævibus, thorace integro. *Fn. fuec.* 451. * *Scop. ent. carn.* 56. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 11.
Laichart. inſ. tir. 1. *p.* 98. *n.* 10. Silpha tyrolenſis.
Degeer inſ. 4. *p.* 177. *n.* 5. *t.* 6. *f.* 15. Silpha punctata, &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 118. *n.* 1. Peltis nigra, &c.
Schaeff. elem *t.* 96. *f.* 1.
icon. *t.* 93. *f.* 5.
Habitat in Europæ *agris & viis frequens.*

thoracica. 13. S. nigra, elytris obſcuris: linea elevata unica, thorace teſtaceo. *Fn. fuec.* 452. * *Scop. ent. carn.* 54. *Stroem. act. nidr.* 3. *p.* 384. *t.* 6 *f.* 1. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 7.
Degeer inſ. 4. *p.* 174. *n.* 3. *t.* 6. *f.* 7. Silpha nigra, &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 121. *n.* 6. Peltis nigra, &c.
Gadol. d'ff 25. Caſſida nigra, clypeo latiſſimo pallide luteo, macula lata nigra nitida.
Raj. inſ. p. 90. *n.* 10. Scarabæus primo ſimilis, parum canaliculatus, ſcapulis croceis.
Bergſtr. nomencl. 1. 23. 5. *t.* 3. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 75. *f.* 4.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 12.
Habitat in Europæ *cadaveribus.*

lævicollis. 51. S. gibba nigra, elytris rugoſis: lineis elevatis tribus, thorace lævi emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 8.
Habitat in nova Hollandia.

marginalis. 52. S. atra, thoracis margine pallido, elytris fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 9.
Forſter cent. inſ. 1. *p.* 17. *n.* 17. Silpha noveboracenſis.
Habitat in America *boreali*, *atratæ magnitudine.*

qua-

quadri-punctata. 14. S. nigra, elytris pallidis: puncto baſeos medioque nigro, thorace emarginato. *Fn. ſuec.* 453. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 20.
Pet. gaz. t. 12. *f.* 2.
Schreb. inſ. 2. *f.* 5. Silpha quadripunctata nigra, elytris exalbidis: maculis 4 nigris.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 122. *n.* 7. Peltis nigra, thorace elytrisque teſtaceis, thoracis macula coleoptrorumque 5 nigris.
Degeer inſ. 4. *p.* 181. *n.* 6. *t.* 4. Silpha corpore nigro, &c.
Lepechin it. 1. *p.* 202. *t.* 16. *f.* 4. Silpha flavicans.
Habitat in Europæ, *frequens in* Angliæ *quercu.*

pedemontana. 54. S. teſtacea, antennis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 21.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 123. *n.* 9.
Habitat in agris Pedemontanis.

hirta. 55. S. nigricans, villis flavis ſplendidis hirta, elytris lineis duabus & dimidia elevatis. *Herbſt apud Fuesli Arch. Inſ.* 4. *p.* 34. *n.* 11.
Habitat Berolini, *ſinuatæ affinis.*

ſinuata. 56. S. thorace emarginato ſcabro, elytris lineis elevatis tribus apice ſinuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 19.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 15. Silpha appendiculata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 119. *n.* 2. Peltis nigra, &c.
Habitat in Anglia & Germania.

carinata. 57. S. ſpadicea, clypeo glaberrimo, latiſſimo, marginato, anterius exciſo, elytris margine carinatis glabris: lineis tribus elevatis. *Herbſt apud Fuesli Arch. Inſ.* 4. *p.* 34. *n.* 12.
Habitat in Pomerania, *opacæ affinis.*

opa-

opaca. 15. S. fuſca, elytris concoloribus: lineis elevatis ſubternis, thorace anterius truncato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 18. *Muller prodr. zool. dan. p.* 63. *n.* 585. Peltis opaca, &c.
Schaeff. ic. t. 93. *f.* 6.

rugoſa. 16. S. nigricans, elytris rugoſis: lineis elevatis tribus, thorace rugoſo poſterius ſinuato. *Fn. ſuec.* 445. * *Scop. ent. carn.* 53. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 10.
Fn. ſuec. 1. *n.* 379. Caſſida atra, elytris ſtriis quinque punctisque elevatis.
Degeer inſ. 4. *p.* 182. *n.* 7. & *inſ.* 5. *p.* 43. *n.* 5. *t.* 2. *f.* 21. Silpha nigra opaca, &c. & Tenebrio rugoſus, &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 120. *n.* 4. Peltis nigra, &c.
Raj. inſ. 90. *p.* 9. Scarabæus inter cadavera frequens, &c.
Bergſtr. nomencl. 1. 23. 4. *t.* 3. *f.* 4.
β) Silpha pellæ acephalos. *Bergſtr. nomencl. t.* 9. *f.* 8.
Habitat frequentiſſima in Europa & Sibiria, *cadavera, piſces, carnes conſumens, capta humorem fœtidiſſimum evomens.*

cancellata. 58. S. nigra, thorace lævi, elytris rugoſis: lineis elevatis tribus. *Fabr. mant.* 1. *p.* 49. *n.* 17.
Habitat Halæ Saxonum, *obſcuræ proximæ affinis.*

obſcura. 18. S. nigra, elytris punctatis: lineis elevatis tribus, thorace anterius truncato. *Fn. ſuec.* 457. *Scop. ent. carn.* 57. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 16.
Uddm. diſſ. 8. Caſſida ovata nigra, lineis elevatis tribus; media longiſſima.
β) Silpha punctata. *Bergſt. nomencl. t.* 9. *f.* 9?
Habitat in Europa *boreali, rarior.*

ferruginea. 19. S. ferruginea, elytris lineis elevatiſſimis, thorace emarginato capite latiore. *Fn. ſuec.* 458. *Scop. ent. carn.* 60. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 22.
Degeer inſ. 4. *p.* 183. *n.* 9. Silpha cimicoides, &c.
Laichart. inſ. tyr. 1. *p.* 102. *n.* 1. Oſtoma rubicunda.
Raj. inſ. p. 84. *n.* 33.
Schaeff. ic. t. 40. *f.* 7.
Habitat in Europa *boreali*, *etiam* Calabria.

reticulata. 20. S. ferruginea, elytris lineis elevatis ſenis, thorace emarginato ſerrato.
Habitat in Europa, *ferruginea duplo anguſtior.*
Clypeus *lunatus*, *latitudine thoracis*, *& ultra thoracem exſertus*; *hic elytris anguſtior*, *marginibus lateralibus crenulatis*; *elytra profunde ſulcata*; *inter ſingulos ſulcos ordine punctorum excavato.*

groſſa. 21. S. atra, elytris punctatis: lineis elevatis tribus lævibus, thorace tranſverſo emarginato. *Fn. ſuec.* 459. *Uddm. diſſ.* 9.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 87. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 14. Silpha truncata.
Habitat in Europa, *ovata*, *punctis elytrorum confertis.*

lævigata. 59. S. atra, elytris lævibus ſubpunctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 49. *n.* 15.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 122. *n.* 8. Peltis nigra tota, &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 16.
Habitat in Europæ *ſilvis.*

oblonga. 22. S. nigra, elytris ſtriato-punctatis, lineis elevatis ſenis, thorace emarginato. *Fn. ſuec.* 460. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 23. *Herbſt apud Fuesslı Arch. Inſ.* 4. *t.* 20. *f.* 22.

De-

Degeer inf. 4. *p.* 185. *n.* 71. Silpha oblonga, &c.
Fn. fuec. 381. Caſſida atra, elytris ſtriis 10 elevatis, punctis excavatis ſtriatis.
β) Silpha flavifrons. *Schaeff. elem. t.* 18 ?

ſcabra. 23. S. oblonga nigra, thorace anterius elytrisque ante apicem bidentatis.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 50. *n.* 24. Sylpha dentata ?
Habitat in Europa, *ſtatura & magnitudine oblonga*

limbata. 60. S. nigra, thoracis elytrorumque [illegible] ſubferrugineo, elytris lineis elevatis [illegible] obſoletis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 25.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *ſtatura ferrugineæ*, *at paulo minor.*

undata. 61. S. nigra nitida, elytris faſciis duabus undatis, punctoque apicis albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 26.
Habitat in Saxonia, *ſub arborum cortice*, *dermeſtis undati ſtatura & magnitudine.*

ſuccinéta. 26. S. ferruginea nitida, elytris medio nigris.
Habitat in Suecia, *pediculo major.*

fuſca. 28. S. fuſca elongata, ſubtus picea.
Habitat in Suecia, *pediculo major*, *ſtatura cicindelæ.*

depreſſa. 29. S. ferruginea, elytris lævibus, thorace emarginato. *Fn. ſuec.* 463.*
Habitat in Europa.

uralenſis. 62. S. ſupra atra, ſubtus ferruginea, thoracis atque elytrorum marginibus rubicundis. *Lepech. it.* I. *p.* 312. *t.* 16. *f.* 3.
Habitat in deſerto Uralenſi, *aliorum inſectorum cadavera ſepeliens*; *an hujus generis ?*

grisea. 30. S. grisea, elytris lævibus, thorace emarginato. *Fn. suec.* 464. *
Habitat in Europa.

testacea. 31. S. testacea, thorace integro.
Habitat in Germania, *nitidula æstiva triplo major, an hujus generis?*

pulicaria. 33. S. nigra oblonga, elytris abbreviatis, abdomine acuto. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 79. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 44. *n.* 15. Spæridium pulicarium.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 564. *n.* 24. *Fn. suec.* 370. Dermestes pulicarius.
Geoffr. inf. par. 1, *p.* 308. *n.* 4. Antrhibus niger.
Raj. inf. 108. *n.* 29.
Habitat frequens in Europa, *in floribus currentans.*

minuta. 63. S. atra, elytris striatis, pedibus concoloribus.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 79. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 44. *n.* 14.
Habitat in Anglia.

fimetaria. 64. S. atra, immaculata, elytris lævissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 79. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 43. *n.* 12. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 30. *n.* 4. *t.* 20. *f.* 17.
Habitat in Angliæ *stercore.*

cruentata. 65. S. atra nitida, thoracis margine elytrorumque macula sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 79. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 43. *n.* 11.
Habitat in nova Hollandia.

rufa. 66. S. atra nitida, thorace pedibusque anterioribus rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 43. *n.* 10.
Habitat Halæ Saxonum, *statura parva & gibba hæmorrhoidalis.*

hæ-

hæmorrhoidalis. 67. S. atra, elytris apice rufis, pedibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 9. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 308. *n.* 5. Anthribus niger ovatus, &c.
Habitat in Europæ *ſtercore bovino.*

melanocephala. 68. S. atra glabra, elytris griſeis: macula communi baſeos nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 8.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 563. *n.* 16. *Fn. ſuec.* 425. Dermeſtes melanocephalus, &c.
Habitat in Europæ *ſtercore frequens.*

atomaria. 35. S. nigra ſubovata, elytris immarginatis, pedibus pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 7. Sphæridium læve atrum, elytris crenato-ſtriatis, pedibus pallidis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 117. *n.* 19. Dermeſtes niger ſubrotundus, &c.
Habitat in Europæ *ſtercore.*

ſtriata. 69. S. ferruginea, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 6.
Habitat Kilonii, *ſtatura marginatæ.*

marginata. 70. S. lævis atra, elytrorum margine pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 5.
Habitat Halæ Saxonum, *glabratæ ſtatura & magnitudine.*

glabrata. 71. S. atra, antennis pedibusque rufis, elytris lævibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 4.
Habitat in inſula Madera, *ſtatura dyticoidis, at minor.*

dyticoides. 72. S. ferruginea, elytris atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 3.
Habitat in inſula S. Helenæ.

ſter-

ſtercorea. 73. S. atra nitida, elytrorum macula apicis rubra, pedibus piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 2.
Habitat Kilonii *in ſtercore.*

ſcarabæoides. 74. S. ovata atra, elytris maculis duabus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 43. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 563. *n.* 17. *Fn. ſuec.* 428. *Scop. ent. carn.* 36. Dermeſtes ſcarabæoides.
Gadd ſatag. 76. Scarabæus ovatus niger glaber, maculis 2 rubris in ſingulo elytro.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 106. *n.* 17. Dermeſtes niger, &c.
Degeer inſ. 4. *p.* 345. *t.* 12. *f.* 17. Hiſter teſtudinarius, &c.

inſignita. 75. S. nigra, elytris obſolete ſtriatis: maculis duabus magnis coccineis. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 30. *n.* 5. *t.* 20. *f.* 18.
Habitat rarior Berolini *in ſtercore vaccino.*

nigricans. 76. S. nigricans, elytris lævissimis: maculis quatuor flavis. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 30. *n.* 6. *t.* 20. *f.* 19.
Habitat rarior Berolini *in ſtercore vaccino, ſtatura & magnitudine melanocephalæ.*

hiſteroides. 77 S. nigra, antennis pedibusque rubris, elytris abbreviatis: macula rubra. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 8. *n.* 12.
Habitat Upſaliæ, *oblonga, anguſta, pediculo vix major.*

biguttata. 78. S. tota ferruginea, elytris linea punctoque pallido. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 9. *n.* 13.
Habitat Upſaliæ, *depreſſæ magnitudine & facie.*

lu-

lutea. 81. S. lutea, elytris pubescentibus lævibus. *Fabr. mant. inf.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Suecia.

ruficornis. 82. S. atra glabra, antennis, abdomine pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 7. *n.* 142.
Habitat in Europa.

exilis. 83. S. atra glabra minima, capite thoraceque incurvis. *Muſ. Lesk. p.* 7. *n.* 144. c.
Habitat in Europa.

ſpadicea. 84. S. ferrugineo fuſca glabra, capite thoraceque incurvis. *Muſ. Lesk. p.* 8. *n.* 144. A.
Habitat in Europa.

trilineata. 85. S. elytris punctatis: lineis elevatis tribus; intermedia longiſſima. *Muſ. Lesk. p.* 8. *n.* 154. b.
Habitat in Europa.

melanophthalma. 86. S. teſtacea, oculis nigris, elytris guttis quinque nigris: una communi ad ſcutellum. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 160.
Habitat in Europa.

multicolor. 87. S. nigra, antennis pedibusque rufis, thoracis teſtacei dorſo fuſco: punctis duobus impreſſis, elytris teſtaceis: punctis duobus, tænia media, faſcia inæquali verſus apicem apiceque ipſo nigris. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 171.
Habitat in Europa, *antennarum apice fuſco.*

bicolor. 88. S. fuſca, pedibus rufis. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 172. 174.
Habitat in Europa.

nebuloſa. 89. S. teſtacea, capite, thorace elytrisque fuſco nebuloſis. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 173.
Habitat in Europa.

ru-

rubigi-nosa. 90. S. thorace angusto: dorso sulcato, corpore fusco, elytris rugosis, capite, thorace, abdomine pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p. 9. n. 174. b.*
Habitat - - -

palli-pes. 91. S. nigra, capite, thorace, elytris pedibusque pallidis, oculis nigris. *Mus. Lesk. p. 9. n. 174. d.*
Habitat in Europa.

squali-da. 92. S. fusco-testacea, capite, thorace antennarumque testacearum apice testaceis, elytris sordide testaceis, pedibus lividis. *Mus. Lesk. p. 9. n. 174. e.*
Habitat - - -

striatu-la. 93. S. ferruginea, elytris leviſſime striatis. *Mus. Lesk. p. 9. n. 174. f.*
Habitat in Europa.

trico-lor. 94. S. nigra, antennis pedibusque rufis, elytris fusco-brunneis. *Mus. Lesk. p. 9. n. 174. g.*
Habitat in Europa.

NITIDULA. *Antennæ* clavatæ: clava solida.
Elytra marginata.
Caput prominens.
Thorax planiusculus, marginatus.

* *labio quadrato*: Elophori.

aquati-ca. 1. N. fusca, thorace rugoso elytrisque fusco-æneis. *Fabr. Sp. inſ. 1. p. 77. n. 1. mant. inſ. 1. p. 42. n. 1. Syſt. nat.* XII. 2. *p. 573. n. 25. Fn. ſuec. 461.*
Sylpha cinerea, elytris subſtriatis, thorace emarginato longitudinaliter rugoso virescente.
Geoffr. inſ. par. 1. p. 105. n. 15. Dermestes viridi-

di-æneus, thorace faſciis quatuor elevatis, elytris punctato-ſtriatis.
Degeer inſ. 4. *p.* 379. *n.* 5. *t.* 15. *f.* 5. 6. Hydrophilus æneus, &c.
Habitat in Europæ *aquis ſtagnantibus, parva, frequens inter confervas.*

elongata. 2. N. fuſca, thorace rugoſo, elytris ſulcatis crenatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 257.
Habitat Halæ Saxonum *in aquis ſtagnantibus ſub lemna, magnitudine media ptini pertinacis, anguſta & elongata, pedibus piceis.*

nubila. 3. N. griſea, thorace elytrisque ſulcato-rugoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 2.
Habitat Hamburgi.

minuta. 4. N. fuſca, thorace rugoſo æneo, elytris pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 3.
Habitat in Angliæ *aquis ſtagnantibus, aquaticæ affinis, at triplo minor.*

coccinelloides. 28. N. nigra, capite, thorace elytrisque fumatis. *Muſ. Lesk. p.* 7. *n.* 137. b.
Habitat in Europa, *ſtatura coccinellæ.*

fuſca. 29. N. fuſco teſtacea, elytris punctato ſtriatis, antennis pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 7. *n.* 137. c.
Habitat in Europa.

nebuloſa. 30. N. teſtaceo griſea, capite fuſco: tuberculis inter oculos quatuor, thorace aſpero, elytris lineis, elevatis ſex: interſtitiis punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 7. *n.* 138. b.
Habitat - - - *an forte eadem cum nubila?*

** *la-*

** *labio cylindrico.*

bipuſtulata. 5. N. ovata nigra, elytris puncto rubro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 1. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 570. *n.* 4. *Fn. ſuec.* 445. Silpha oblonga nigra, elytris ſingulis puncto unico rubro.
Laichart. inſ. tyr. 1. *p.* 106. *n.* 3. Oſtoma bipuſtulata.
Degeer inſ. 4. *p.* 186. *n.* 13. *t.* 6. *f.* 22, 23. Silpha nigra, &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 100. *n.* 3. Dermeſtes niger, &c.
Habitat in Europæ *cadaveribus, carnibus, lardo.*

obſcura. 6. N. ovata nigra obſcura, pedibus piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 2. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 36. *n.* 2. *t.* 20. *f.* 23.
Habitat in Germania.

abbreviata. 7. N. ovata nigra obſcura, elytris lævibus obtuſis abbreviatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 3.
Habitat in nova Seelandia, *obſcuræ ſtatura & magnitudine, pedibus nunc flavis, nunc nigris.*

margi-nata. 8. N. ovata elytris ſulcatis: margine punctisque diſci ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 4.
Habitat in Italia, *ſtatura bipuſtulatæ.*

æſtiva. 9. N. teſtacea ſubtomentoſa, thorace emarginato, oculis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 91. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 5. *Herbſt. apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 36. *n.* 3. *t.* 20. *f.* 24.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 574. *n.* 32. *Fn. ſuec.* 465. Silpha æſtiva.
Habitat in Europæ *floribus.*

ſtri-

striata. 10. N. ovata fusca, thoracis margine, elytris margine, lineola baseos striaque apicis fulvis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 51. *n.* 7.
Habitat Halæ Saxonum, *mediæ magnitudinis, subtus fusca.*

varia. 11. N. ovata, thorace elytrisque nigro ferrugineoque variis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 52. *n.* 8. *Herbst apud Fuessli Arch. Ins.* 4. *p.* 76. *n.* 4. *t.* 20. *f.* 25.
Habitat Kilonii *in hortis, statura dermestis ferruginei.*

bicolor. 12. N. ferruginea, elytris nigris, fascia baseos punctoque apicis ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 52. *n.* 9.
Habitat in arvis Kilonienſibus.

Colon. 13. N. nigra, elytris ferrugineo-variis, thorace emarginato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 52. *n.* 10.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 573. *n.* 27. *Fn. suec.* 462. *Degeer inf.* 4. *p.* 117. *n.* 14. *t.* 6. *f.* 24. Silpha Colon.
Habitat in Europæ *borealis graminosis.*

limbata. 14. N. nigra, thoracis margine, elytrorumque limbo ferrugineis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 52. *n.* 11.
Habitat Halæ Saxonum *parva.*

hæmorroidalis. 15. N. nigra, elytris apice ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 52. *n.* 12.
Habitat Hamburgi.

discoidea. 16. N. nigra, thorace marginato, elytrorum disco ferrugineo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 52. *n.* 13.
Habitat in Anglia.

pedi-

pedicularia. 17. N. nigra, elytris lævibus, thorace marginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 14.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 574. *n.* 34. *Fn. ſuec.* 466. Silpha pedicularia.
β) Dermeſtes (pſyllius) ovatus niger, abdomine obtuſo thorace elytrisque marginatis.
Habitat in Europæ *borealis hortis, floribus, pediculi magnitudine, ovato-oblonga.*

litura. 18. N. teſtacea, elytris litura arcuata nigra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 15.
Habitat Halæ Saxonum, *parva.*

bipunctata. 19. N. teſtacea, coleoptris maculis quinque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 16.
Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 4. *p.* 58. *n.* 32. *t.* 23. *f.* 20. c. Chryſomela ſcutellata.
Habitat Halæ Saxonum, *ſtatura lituræ.*

ænea. 20. N. viridi-ænea, thorace marginato, antennis pedibusque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 17.
Habitat in Anglia.

virideſcens. 21. N. viridi-ænea, thorace marginato, pedibus rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 18.
Habitat Kilonii, *ſtatura æneæ.*

pubeſcens. 22. N. thorace elytrisque griſeis pubeſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 19.
Habitat in Germania.

hirta. 23. N. atra, thorace elytrisque pubeſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 20.
Habitat in Germania, *pubeſcenti affinis.*

ru-

rufipes. 24. N. nigra nitida, pedibus pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 52. *n.* 21. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 573. *n.* 24. Silpha nigra lævis, thorace ſubemarginato, pedibus pallidis.
Habitat in Europæ *hortis.*

ſeriacea. 25. N. ochracea immaculata, oculis nigris, elytris lævitſimis. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 36. *n.* 6.
Habitat - - - *ſtatura & magnitudine coli, dermeſti ferrugineo affinis.*

pectoralis. 26. N. fuſca, capite pedibusque ferruginea, antennarum clava flava. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 41. *n.* 12. *t.* 21. *f.* M. m.

piloſa. 27. N. nigra, elytris villoſis, antennis pedibusque ferrugineis. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 39. *n.* 7. *t.* 21. *f.* G. g.
Habitat in Marchia, *lineam longa.*

OPATRUM. *Antennæ* moniliformes, extrorſum craſſiores.
Elytra marginata.
Caput prominens.
Thorax planiuſculus, marginatus.

griſeum. 1. O. cinereum, thorace plano marginato, elytris ſtriis tribus elevatis poſterius dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 1.
Habitat in Italia, *ſabuloſo major.*

ſabuloſum. 2. O. fuſcum, elytris lineis elevatis tribus dentatis, thorace emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 572. *n.* 17. *Fn. ſuec.* 456. Silpha ſabuloſa.

Udm.

Udm. diff. 5. Dermeſtes niger, inter elytrorum lineas quatuor elevatas ſcrobiculis exaratus.
Fn. ſuec. 382. Caſſida nigra, elytris ſtriis quinque utrinque dentatis, clypeo emarginato.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 350. *n.* 7. Tenebrio atra, &c.
Habitat in Europæ *& borealis* Americæ *campis apricis ſabuloſis.*

gibbum. 3. O. nigrum, elytris lineis elevatis plurimis obſoletis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 3.
Habitat in Sueciæ *collibus arenoſis.*

lævigatum. 4. O. nigrum, clypeo anterius piceo, elytris ſubſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 50. *n.* 4.
Habitat in nova Scelandia, *ſtatura gibbi.*

arenarium. 5. O. griſeum, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 5.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

orientale. 6. O. cinereum, thorace elytrisque rugoſis, tibiis anterioribus dilatatis triangularibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 511. *n.* 6. *Forsk. Fn. ar. p.* 77. *n.* 1. Silpha multiſtriata.
Habitat in Orientis *arenoſis.*

tibiale. 7. O. nigrum, elytris punctato ſubrugoſis, tibiis anterioribus compreſſo-triangularibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 51. *n.* 7.
Habitat ſub Scaniæ *lapidibus, parva.*

Agricola. 8. O. nigrum, thorace lævi, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 8. *Herbſt apud Fuesslii Arch. Inſ.* 4. *p.* 35. *n.* 2.
Habitat Berolini *&* Halæ Saxonum, *parva.*

mi-

minutum. 9. O. cinereum, thorace rugoso, elytris lineis elevatis quatuor lævibus. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 90. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 51. *n.* 9.
Habitat in Suecia *arenosis, primis speciebus quadruplo minor.*

quisquiliarum. 10. O. nigrum, thorace granulato medio glabro elytris glaberrimis. *Herbst apud Fuessli. Arch. Inf.* 4. *p.* 35. *n.* 3.

cinereum. 11. O. nigrum cinereo obumbratum, elytris punctato-sulcatis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 159. *n.* 4. *t.* 43. *f.* 10.
Habitat in India.

Lithophilus. 12. O. nigrum, thorace & subtus coccineum, thorace emarginato posterius utrinque acuminato, elytris glaberrimis, tarsis triarticulatis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 37. *n.* 1. *t.* 21. *f.* A. a.
Habitat in Marchia *sub saxis, 2 lineas longum, dubii generis.*

melinum. 13. O. ochraceum glabrum, thorace elytrisque tenerrime punctatis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 37. *n.* 2. *t.* 21. *f.* B. b.
Habitat rarior in Marchiæ *floribus,* 1½ *lineas longum, dubii generis.*

cinetarium. 14. O. badium elongatum, elytris planis glaberrimis. *Herbst apud Fuessli Arch. inf.* 4. *p.* 38. *n.* 3. *t.* 21. *f.* C. c.
Habitat in Pomerania.

bipustulatum. 15. O. ferrugineum, elytris tenerrime sulcatis tharaceque posterius ferrugineis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 38. *n.* 4. *t.* 21. *f.* D. d.
Habitat in Pomerania, 2 *lineas longum, angustum, elongatum.*

mo-

monili-corne. 16. O. fuſcum, thorace elytrisque villoſis. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 39. *n.* 5. *t.* 21. *f.* E. e.
Habitat in Germania, 4 *lineas longum.*

ſilphoides. 17. O. nigrum glabrum, thorace retrorſum dilatato, elytris punctato ſtriatis: maculis duabus fulvis. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 41. *n.* 11. *t.* 21. *f.* L. l.
Habitat in fungis quernis, *generis dubii.*

unipunctatum. 18. O. fuſcum hirtum, thorace ſubcylindrico immarginato media fovea excavato, antennarum articulis duobus ultimis diſtantibus majoribus.
Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 4. *p.* 40. *n.* 8. *t.* 21. *f.* H. h. Dermeſtoides unipunctatus.
Habitat - - - ultra duas lineas longum, utrum hujus, an cum ſequente proprii generis?

bipunctatum. 19. O. fuſcum, thorace ſubcylindrico immarginato: foveis binis, antennarum articulis duobus ultimis diſtantibus majoribus.
Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 4. *p.* 40. *n.* 9. *t.* 21. *f.* I. i.
Habitat - - - unipunctato affine, at minus & magis depreſſum.

clathratum. 20. O. nigrum, elytris ſtriatis: ſtriis punctatis.
Fabr. mant. inſ. 2. *app. p.* 379.
Habitat in Cayenna.

teſtaceum. 21. O. teſtaceus, oculis, thorace, elytris antenniſque fuſcis, his baſi apiceque rufis, elytrorum baſi lunula magna teſtacea, thorace punctis duobus impreſſis. *Muſ. Lesk. p.* 9. *n.* 178.
Habitat in Europa, *ſtatura quadripuſtulati, elytris punctato ſtriatis.*

brun-

brunneum. 22. O. brunneum luteo fericeum, elytris leviſſime punctato ſtriatis: maculis ſex luteis, antennis pedibusque luteſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 10. *n.* 179.
Habitat - - -

TRITOMA. *Antennæ* clavatæ: clava perfoliata. *Palpi* anteriores ſecuriformes.

bipuſtulatum. 1. Tr. atrum elytris macula laterali coccinea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 1.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 335. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 2. Tritoma?
Habitat in Angliæ *boletis arboreis.*

glabrum. 2. Tr. glabrum atrum, antennis pedibusque piceis *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 2.
Habitat ſub Sueciæ *arborum corticibus*, *ſtatura bipuſtulati.*

dubium. 3. Tr. nigrum, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 3.
Habitat Kilonii.

vittatum. 4. Tr. rufum, elytris nigris: vitta rufa. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 4.
Habitat in India, *mediæ magnitudinis.*

Morio. 5. Tr. atrum holofericeum, antennis pedibusque concoloribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 5.
Habitat Kilonii, *ſtatura dubii*, *at duplo major.*

fericeum. 6. Tr. nigricans holofericeum, pedibus teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 6.
Habitat in Germania, *ſtatura dubii*, *ſed major.*

collare. 7. Tr. nigrum, thoracis lateribus abdomineque

rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 7.
Habitat in nova Hollandia.

197. CASSIDA. *Antennæ* moniliformes.
Elytra marginata.
Caput ſub thoracis clypeo plano reconditum.

viridis. 1. C. viridis. *Fn. ſuec.* 467. *It. œl.* 153. *Scop. ent. carn.* 117. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 313. *n.* 1. *Fab. ſp. inſ. p.* 107. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 1.
Degeer inſ. 5. *p.* 174. *n.* 2. Caſſida cardui, &c.
Goed inſ. 1. *p.* 94. *t.* 43.
Blanck. inſ. 89. *t.* 11. *f.* F.
Merian. europ. t. 115.
Volk. heſper. 1. *p.* 166. *f.* 4.
Raj. inſ. 107. *n.* 5.
Reaum. inſ. 3. *t.* 18.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 3. *p.* 13. *t.* 6.
Schaeff. el. t. 35. *icon. t.* 27. *f.* 5.
Habitat in Europæ *carduis & verticillatis frequens.*
Larva *hexapus depreſſa, ſpinis lateralibus acutis & cauda biſeta armata proprio ſtercore obvoluta obambulat.*

Murræa. 2. C. nigra, clypeo rubro, elytris ſanguineis: punctis nigris ſparſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 6. *mant.* 1. *p.* 62. *n.* 8. *Herbſt apud Fuesslii Arch. inſ.* 4. *p.* 50. *n.* 5. *t.* 22. *f.* 29.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 314. *n.* 5. *b.* Caſſida rubra maculis rubris variegata.
Habitat in Europæ *plantis, ſtatura viridis.* J. A. Murray.

atrata. 32. C. atra, clypeo anterius ſanguineo. *Fabr. man. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 7.

Ha-

Habitat in Auſtria, *ſtatura nebuloſæ, at minor.*

nebuloſa. 3. C. pallido-nebuloſa, fuſco punctata. *Fn. ſuec.* 468. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 6.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 313. *n.* 2.
Raj. inſ. p. 88. *n.* 13.
Frisch inſ. 4. *p.* 30. *t.* 15.
Goed. inſ. 1. *p.* 96. *t.* 44.
Liſt. goed. 287. *t.* 117.
Roeſ. inſ. 2. *Scar.* 3. *p.* 13. *t.* 6.
Schaeff. ic. t. 27. *f.* 4.
Habitat in Europæ *carduis.*

nobilis. 4. C. griſea, elytris linea cærulea nitidiſſima. *Fn. ſuec.* 469. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 21.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 313. *n.* 3.
Raj. inſ. p. 107. *n.* 7.
Schaeff. ic. t. 96. *f.* 6.
Habitat in Europæ *carduis*, & *plantis ſtellatis.*
Linea *elytrorum cum vita perit, in aqua calida revivi ſcens.*

cribraria. 33. C. rufeſcens, thorace punctis quatuor, elytris numeroſis nigris, clypeo emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.*20.
Habitat in America.

deuſta. 34. C. rufeſcens, thorace punctis duobus, elytris numeroſis cyaneo nigris, clypeo integro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 19.
Habitat in nova Hollandia.

octo-punctata. 35. C. rufeſcens, thorace punctis duobus, elytris quatuor cyaneo nigris. *Fabr. mant.* 1. *p.* 63. *n.* 18.

Habitat in Siam, *ſtatura & magnitudine deuſtæ.*

interrupta. 36. C. flaveſcens, thorace immaculato elytris ante marginem punctisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 36. *n.* 17.
Habitat in nova Hollandia.

ſexpunctata. 37. C. flaveſcens, coleoptrorum diſco ferrugineo: punctisque ſex nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 16.
Habitat in Cayenna.

annulus. 38. C. flaveſcens, coleoptrorum diſco atro: annulo faſciaque poſteriore flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 15.
Habitat in Cayenna, *ſtatura judaicæ.*

judaica. 39. C. ferruginea, coleoptrorum diſco punctis impreſſis maculisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 14.
Habitat in Cayenna, *hebræa minor.*

hebræa. 40. C. pallida, coleoptris lineolis numeroſiſſimis difformibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 13.
Habitat in Cayenna, *parva, flaveſcens.*

cincta. 41. C. thorace elytrisque obſcuris: margine flaveſcente, elytris ante marginem macula albo-hyalina. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 12.
Habitat in Africa *æquinoctiali, ſtatura interruptæ.*

marginella. 42. C. viridis, thoracis elytrorumque marginibus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 11.
Habitat in Braſilia.

limbata. 43. C. capite thoraceque pubeſcentibus obſcure æneis:

æneis: margine pubeſcente. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 63. *n.* 10.
Habitat Halæ Saxonum *in diantho carthuſianorum, ſtatura & magnitudine ferrugineæ.*

ferruginea. 44. C. nigra, thorace elytrisque ferrugineis immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 9. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 50. *n.* 6. *t.* 22. *f.* 28.
Schranck Beytr. 62. 3. Caſſida ſubferruginea.
Habitat in Germania, *in* Calabria *viridi paulo minor.*

Vibex. 5. C. virens, ſutura dorſali ſanguinolenta. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 5.
Habitat in Germaniæ *plantis, viridi ſimilis, elytrorum tamen dorſo vireſcente.*

affinis. 45. C. elytris griſeis nigro-punctatis, thorace flaveſcente immaculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 4.
Habitat in Germania, *viridi valde affinis.*

maculata. 6. C. viridis, elytris rarius, ſutura dorſali confertius nigro maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 62. *n.* 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 314. *t.* 5. *f.* 6. Caſſida viridis maculis nigris variegata.
Degeer inſ. 5. *p.* 175. *n.* 3. Caſſida ſupra viridis, ſubtus nigra, &c.
Habitat in Germaniæ *plantis, an varietas viridis?*

equeſtris. 46. C. viridis, elytrorum baſi argentea, abdomine atro: margine pallido. *Fabr. mant.* 1. *p.* 62. *n.* 2.
Habitat Halæ Saxonum *in mentha aquatica, viridi major, pedibus flaveſcentibus.*

trun-

Caſſidarum *larvæ plantarum folia ſubtus exedunt.*

truncata. 47. C. rufa, elytris ſubreticulatis nigro-maculatis dorſo gibbis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 41.
Habitat - - - *magna.*

gibboſa. 48. C. atra, thorace maculis duabus villoſo-aureis, elytris vireſcenti-reticulatis: ſpina ſuturali obtuſa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 40.
Habitat in Braſilia, *magna.*

bidens. 49. C. atra, elytris anterius porrectis: ſpina ſuturali erecta. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 39.
Habitat in Braſilia, *magna.*

ſpinifex. 7. C. ferruginea, elytris angulo anteriore ſpina porrecta, thorace utrinque ſpina tranſverſali. *Amœn. acad.* 6. *p.* 92. *n.* 7. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 38.
Habitat in India, *ad baſin elytrorum linea nigra notata.*

bicornis. 8. C. cyanea, elytris angulo anteriore ſpina truncata. *Amœn. acad.* 6. *p.* 393. *n.* 9. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 36.
Habitat in America *auſtrali &* India.

perforata. 50. C. teſtacea, elytris angulo anteriore ſpinoſo baſique perforatis. *Pall. ſpicil. zool.* 9. *p.* 3. *t.* 1. *f.* 1. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 35.
Habitat in America *meridionali.*

margaritacea. 51. C. virens, elytris viridi-argenteis lucidis, capite pectoreque nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 259. *Fab. mant.* 1. *p.* 63. *n.* 22.

Ha-

Habitat Halæ Saxonum *vere ſub lapidibus, nebulosæ proxime affinis, colore cum vita pereunte.*

faſtuoſa. 52. C. atra, elytris rubro-æneis nigro maculatis.
Schaller Abh. der. hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 529.
Habitat varior Halæ Saxonum *in populo alba, nobili vix major, colore cum vita pereunte.*

fuſca. 53. C. ſpadicea, elytris ſtriis duabus elevatis. *Laichart. inſ. tyr.* 1. *n.* 4. *Herbſt. apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 51. *n.* 9.
Habitat in Germania, *viridi minor.*

cruciata. 9. C. pallida, elytris diſco fuſco-cruciato.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 110. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 23. Caſſida flaveſcens, coleoptris diſco nigro: maculis quatuor flaveſcentibus.
Degeer inſ. 5. *p.* 187. *n.* 12. *t.* 15. *f.* 15. Caſſida hyalina pallide flava, &c.
Habitat in Europæ *plantis.*

Crux. 54. C. flava, thoracis linea dorſali ferruginea, coleoptrorum diſco ferrugineo: maculis quatuor flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 119. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 24.
Habitat in Cayenna, *an vere a cruciata diverſa?*

11 punctata. 55. C. flaveſcens, thoracis puncto medio, coleoptris undecim nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 25.
Habitat in America *meridionali, ſubtus dilute ferruginea.*

bifaſciata. 10. C. pallida, corpore faſciis duabus fuſcis.
Habitat in America *meridionali.*

flava. 11. C. flava immaculata, corpore teſtaceo, puncto ſcutellari nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 42. De-

Degeer inſ. 5. *p.* 184. *t.* 15. *f.* 13. Caſſida pallide flava immaculata, &c.
Habitat in Europa *auſtrali.*

purpurea. 12. C. flava, ſupra corpus purpurea.
Habitat in America, *parva.*

leucophæa. 13. C. teſtacea, margine punctis flavis. *Amœn. Acad.* 6. *p.* 392. *n.* 8. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 43.
Habitat in America.

tuberculata. 14. C. teſtacea, margine thoracis elytrorumque flavo, coleoptris baſi trituberculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 26. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 576. *n.* 14. Caſſida marginata.
Degeer inſ. 5. *p.* 186. *n.* 11. *t.* 15. *f.* 14. Caſſida cincta.
Habitat in Sierra Leon Africæ.

futuralis. 56. C. brunea, elytris flavis: ſuturis brunneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 27.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

bigutata. 57. C. thorace flavo, elytris rufeſcentibus: margine nigro; maculis duabus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 28.
Habitat in Cayenna.

miliaris. 58. C. flava, thorace immaculato, elytris nigropunctatis: margine bifaſciato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 29.
Habitat in inſula S. Helenæ.

punctata. 59. C. nigro clypeo brunneo, elytris flavis nigropunctatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 30.

Ha-

Habitat ad Caput bonæ ſpei, *miliaris magnitudine.*

reticularis. 15. C. flava, elytris cæruleo-variegatis: lateribus unifaſciatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 44.
Degeer inſ. 5. *p.* 188. *n.* 14. *t.* 15. *f.* 17. Caſſida pellucida albo-flaveſcens, &c.
Habitat in America *meridionali*, *magna.*

variegata. 16. C. rufa, elytris cæruleo-variegatis: lateribus unifaſciatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 45.
Degeer inſ. 5. *p.* 178. *n.* 2. *t.* 15. *f.* 6. Caſſida fuſco-rubra, &c.
Habitat in America, *magna.*

trifaſciata. 60. C. rufa, elytrorum lateribus trifaſciatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 46.
Habitat in India, *mediæ magnitudinis.*

annulata. 61. C. cærulea, thorace maculis duabus, elytris annulis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 47.
β) Caſſida ornata. *Herbſt apud Fuesſli Arch. Inſ.* 4. *p.* 50. *n.* 8. *t.* 22. *f.* 30.
Habitat in America *auſtrali & in* India *magna.*

groſſa. 17. C. ſanguinea, elytris diſco punctis nigris ſparſis: margine lineis ramoſis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 48.
Schulze Naturf. 6. *p.* 89. *t.* 4. *f.* 1.
Suiz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 1.
Degeer inſ. 5. *t.* 15. *f.* 5.
Habitat in America *meridionali*, *congenerum maxima.*

clathrata. 18. C. ferruginea, elytris margine omni, linea longitudinali & dimidiata tranſverſali nigris.

Ha-

Habitat in India. De Geer.
Thorax *immaculatus*; elytra *latiſſima*; femina *lineis tranſverſis dimidiatis tribus diſtincta.*

7 guttata. 19. C. nigra, coleoptris maculis ſeptem albis.
Habitat in India, *an varietas blattæ Petiverianæ?* Brunnich.

exclamationis. 20. C. flava, elytris lineis ternis nigris, intermedia ſignum! referente. *Fabr. ſp inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 49.
Habitat in America *meridionali, viridi paulo major, ſubtus livida.*

lineata. 62. C. cineraſcens, lineis elytrorum quatuor albidis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 50.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *caſſidæ exclamationis magnitudine & ſtatura.*

jamaicenſis. 21. C. luteo-ænea, elytris immaculatis excavato-punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 34.
Sloan. jam. 2. *p.* 208. *t.* 233. *f.* 27. 28.
Habitat in America, *ad ſuturam anterius gibba, colorem in ſpiritu vini deperditum in aqua calida recuperans.*

dorſata. 63. C. thorace elytrisque obſcuris, elytris ſpina ſuturali margineque albicante: baſi obſcuro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 33.
Habitat in Siam, *ſtatura jamaicenſis, at duplo minor.*

quadripuſtulata. 64. C. thorace obſcuro, elytris ſanguineis: margine cyaneo; maculis duabus rubis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 26. *mant. inſ* 1. *p.* 64. *n.* 32.
Habitat in America, *mediæ magnitudinis, atra.*

cya-

cyanea. 22. C. cyaneo-ænea, elytris immaculatis excavato-punctatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 39. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 37. *Petiv. gazoph. t.* 57. *f.* 6.
Degeer inſ. 5. *p.* 181. *n.* 5. *t.* 15. *f.* 9.
Habitat in America.

margi- 23. C. elytris teſtaceis, corpore elytrorumque mar-
nata. gine nigro, thorace æneo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 64. *n.* 31. *Schulze Naturf.* 9. *p.* 103. *t.* 2. *f.* 3.
Degeer inſ. 5. *p.* 185. *n.* 10. Caſſida thorace violaceo nigro, &c.
Habitat in America *auſtrali* & India.

inæqua- 24. C. ferrugineo-ænea, elytris macula flava fu-
lis. bovata diſci. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 65. *n.* 51. *Schulze Naturf.* 9. *t.* 2. *f.* 6. *Muſ. petrop.* 650. *n.* 130.
Degeer inſ. 5. *p.* 182. *n.* 6. *t.* 16. *f.* 2. Caſſida bimaculata, &c.
Habitat in America *meridionali.*

ſuppo- 25. C. elytris nigris anterius annulatis: puncto
ſita. centrali fulvo.
Lederm. microſc. t. 28. *f.* F. g. & *t.* 44. *f.* b. c. d.
Habitat in America *calidiore.*

latera- 26. C. fuſco-ænea, elytris macula flava laterali.
lis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 52.
Degeer inſ. 5. *p.* 184. *n.* 8. *t.* 15. *f.* 12. Caſſida fuſco-ænea, &c.
Sulz. hiſt. inſ. 1. *t.* 3. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali*, *inæquali duplo minor.*

diſcoi- 27. C. viridi-ænea, elytris macula didyma flava
des. di-

diſci. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 53.
Degeer inſ. 5. *p.* 183. *n.* 7. *t.* 15. *f.* 11. Caſſida quadri-maculata, &c.
Habitat in America *meridionali.*

decuſſata. 28. C. nigro-cæruleſcens, elytris flavo maculatis, maculis dorſalibus reticulatis, lateralibus diſtinctis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 57.
Habitat in Jamaica.

bipunctata. 29. C. flaveſcens, elytris punctis duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 58.
Habitat in India, *nebuloſæ magnitudine & facie, elytrorum punctis interdum tribus.*

bipuſtulata. 30. C. viridis, elytris maculis duabus lateralibus ſanguineis. *Amœn. acad.* 6. *p.* 392. *n.* 8. *Schulze Naturf.* 6. *p.* 91. *t.* 4. *f.* 2. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 54.
Habitat in Cayenna.

ſexpuſtulata. 65. C. cayanea, elytris maculis tribus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 55.
Habitat in Braſilia, *mediæ magnitudinis.*

16-puſtulata. 66. C. nigra, thorace punctis duobus, elytris ſeptem rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 66. *n.* 56.
Habitat in America *meridionali*, *mediæ magnitudinis.*

anguſtata. 31. C. flaveſcens elytris poſterius anguſtatis.
Habitat in India.

bi-

bituberculata. 32. C. brunnea albo marginata, elytris nigro maculatis baſi unituberculatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Cayenna, *tuberculatæ affinis, at duplo minor.*

Taurus. 33. C. atra, elytris angulo anteriore ſpina truncata. *Fabr. mant. inſ.* 1. 2. *app. p.* 380.
Habitat in Cayenna, *ſtatura bicornis, at paulo minor.*

retiformis. 34. C. nigra thorace bimaculato, elytris flavis nigro-reticulatis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Cayenna, *ſtatura tauri.*

palliata. 35. C. nigra, thorace villoſo virescente, elytris viridibus: margine lineaque media ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 370.
Habitat in Cayenna, *mediæ magnitudinis.*

cuprea. 36. C. ſupra cuprea, thoracis margine, elytrisque maculis duabus marginalibus ruſis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 379.
Habitat in Cayenna, *mediæ magnitudinis.*

rubiginoſa. 37. C. ferruginea, thorace elytrisque fuſcis, punctatis: marginibus externis ciliatis. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 236.
Habitat in Europa.

nitens. 38. C. nigra, thorace elytrisque griſeis aureo nitentibus, pedibus lividis. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 237.
Habitat - - -

ſuperba. 39. C. nigro, elytris punctatis clypeoque viridi-aureis, antennis abdomine pedibusque viridibus. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 238.

Ha-

Habitat in Europa, *aureo nitore cum vita pereunte.*

sangui-nolenta. 40. C. aureo-flava, elytrorum annulo ovali tuberculoque futurali sanguineis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 11.
Habitat in Rio Janeiro, *subtus pallida, magnitudinis mediæ.*

arcuata. 41. C. albida, disco communi nigro: limbo, annulo ovali arcuque posterius flavissimis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 12.
Habitat in Rio Janeiro, *mediæ magnitudinis, pectore & abdomine nigris.*

198. COCCINELLA. *Antennæ* clavatæ: clava solida.
Palpi anteriores securiformes, posteriores filiformes.
Corpus hemisphæricum, thorace elytrisque marginatis, abdomine plano.

* *coleoptris rubris flavisve: punctis nigris maculatis.*

margi-nata. 1. C. coleoptris flavis immaculatis: margine nigro, thoracis margine punctis duobus albis.
Coccinella coleoptris rubris: margine nigro, thorace utrinque puncto marginali albo. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 53. *n.* 1.
Habitat in America, *mediæ magnitudinis, nigra.*

imma-culata. 155. C. coleoptris flavescentibus immaculatis, thoracis macula nigra: punctis duobus albis. *Mus. Lesk. p.* 11. *n.* 211.
Habitat in Suecia.

mar-

margi-nella. 6. C. coleoptris obſcure teſtaceis: margine flavo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 3.
Habitat in America, *magna.*

limba-ta. 50. C. atra, coleoptrorum diſco rubro: punctis duobus atris. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 497. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 2.
Habitat Hamburgi, *mediæ magnitudinis.*

furina-menſis. 2. C. coleoptris rubris immaculatis, thorace, capiteque nigris. *Amœn. acad.* 6. *p.* 393. *n.* 12.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 4.
Habitat in America *meridionali.*

ſangui-nea. 3. C. coleoptris ſanguineis immaculatis, thorace maculis nigris. *Amœn. acad.* 6. *p.* 393. *n.* 11.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 5.
Habitat in America *meridionali*, *parva*, *ſubtus atra.*

impun-ctata. 4. C. coleoptris rubris: puncto nullo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 53. *n.* 6.
Habitat in Sueciæ *hortis*, *minor.*

livida. 51. C. coleoptris rubris impunctatis: ſcutello nigro, thorace maculis quinque nigris. *Herbſt apud Fuesslı Arch. Inſ.* 4. *p.* 42. *n.* 1. *t.* 22. *f.* 1. a.
Habitat Berolini, *ſupra ex luteo pallide fuſceſcens*, *ſubtus fuſca.*

Colon. 52. C. coleoptris rubris: puncto nigro, ſcutello maculaque thoracis obſolete nigris. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 42. *n.* 2. *t.* 22. *f.* 1. b.
Habitat Berolini, *magnitudine & colore ad lividum accedens.*

fim-

fimbriata. 53. C. elytris flavis immaculatis: margine nigro, thoracis margine posteriori punctis quatuor nigris. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 11. *f.* 10.
Habitat - - - *magnitudine quinquepunctatæ.*

minuta. 54. C. elytris rubris thoraceque immaculatis. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 11.
Habitat in India, *minima.*

dimidiata. 55. C. coleoptris sanguineis apice atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 5. *mant. inf.* 1. 53. *n.* 7.
Habitat in Coromandel, *magna.*

albida. 56. C. coleoptris flavis: margine albido; punctis utrinque duobus nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 53. *n.* 8.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. *p.* 260. Coccinella margine punctata.
Habitat Halæ Saxonum, *magna.*

Lineola. 57. C. elytris rubris: lineola baseos apicisque nigra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 53. *n.* 9.
Habitat in nova Hollandia.

unifasciata. 58. C. coleoptris rubris: fascia media atra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 53. *n.* 10.
Habitat Hamburgi, *punctis duobus capitis thoracisque margine albis varians.*

annulata. 5. C. coleoptris rubris: macula sublunari nigra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 53. *n.* 11.
Habitat in Germania, *nigra, mediæ magnitudinis.* D. Schreber.
Thorax *marginibus lateralibus pallidus;* elytra *sanguinea; fascia media nigra, alteraque posteriore, exterius cum priore connexa.*

tri-

trinotata. 59. C. elytris rubris hirtis: punctis tribus nigris, capite rubro. *Thunb. nov. inf. fp.* 1. *p.* 11. *f.* 11.
Habitat ad Caput bonæ fpei, *congenerum minima.*

trilineata. 60. C. coleoptris flavis: lineis tribus abbreviatis nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 53. *n.* 12.
Habitat in America, *parva, atra.*

fexlineata. 61. C. coleoptris flavis: lineis fex punctisque tribus nigris. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 54. *n.* 15.
Habitat in Sibiria, *magna, nigra.*

mofcovica. 62. C. coleoptris flavis: lineis quatuor abbreviatis punctis fex atris. *Fabr. mant.* 1. *p.* 54. *n.* 13.
Habitat in Ruffia *magis auftrali, magna.*

abbreviata. 63. C. coleoptris rubris: faſcia poſteriore abbreviata punctisque duobus nigris, thorace atro: lineis duabus albis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 54. *n.* 14.
Habitat in America *boreali, oblonga, atra.* Blagden.

bipunctata. 7. C. coleoptris rubris: punctis nigris duobus. *Fn. fuec.* 471. * *Scop. ent. carn.* 234. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 54. *n.* 16.
Petiv. gazoph. 34. *t.* 21. *f.* 4.
Merian. inf. 69. *t.* 136.
Raj. inf. 86. *n.* 2.
Liſt. hiſt. 383. *n.* 8.
Bradl. natur. t. 27. *f.* 4.
Reaum. inf. 3. *t.* 31. *f.* 16.
Friſch inf. 9. *p.* 33. *t.* 16. *f.* 4.
Sulz. inf. hiſt. t. 3. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 9. *f.* 9.
Stroem act. Nidroſ. 3. *t.* 6. *f.* 2.
Degeer inf. 5. *p.* 389. *n.* 2.
Habitat in Europæ *hortis & ſilvis frequens, victitans aphidibus.*

tripunctata. 8. C. coleoptris rubris: punctis nigris tribus. *Fn. fuec.* 472. * *Fabr. mant.* 1. *p.* 54. *n.* 17.
Habitat in Germania, *fiatura feptempunctatæ.*

quadripunctata. 9. C. coleoptris flavis: punctis nigris quatuor. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 95. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 56. *n.* 28.
Habitat in Europa, *mediæ magnitudinis, fubtus nigra.*
Thorax *flavus*: *punctis quatuor nigris*; pedes *flavi.*

hebræa. 10. C. coleoptris luteis: maculis luteis fex longitudinalibus difformibus. *Fn. fuec.* 473. *
Habitat in Europa.

quadrinotata. 64. C. coleoptris rubris: punctis quatuor baſeos nigris, thoracis marginibus albidis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 56. *n.* 29.
Habitat Kilonii.

quadrimaculata. 65. C. coleoptris rubris: punctis quatuor nigris, thorace atro: macula marginali alba. *Fabr. mant.* 1. *p.* 56. *n.* 30.
Habitat Halæ Saxonum, *nigra.*

quinquepunctata. 11. C. coleoptris ſanguineis: punctis nigris quinque. *Fn. fuec.* 474. * *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 96. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 56. *n.* 31.
Degeer inf. 5. *p.* 370. *n.* 7.
Schaeff. ic. t. 9. *f.* 8.
Merian. europ. t. 69.
Habitat in Europæ *arboribus.*

quinquemaculata. 66. C. oblonga, coleoptris flaveſcentibus: punctis nigris quinque, thorace atro: margine anteriore triradiato albo. *Fabr. mant,* 1. *p.* 56. *n.* 32.
Habitat Halæ Saxonum.

ſexpunctata. 12. C. coleoptris fulvis: punctis nigris ſex. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 96. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 56. *n.* 33.
Ha-

Habitat in Europæ *hortis*, *parva*, *atra*, *thoracis margine punctisque duobus albis.*

glacialis. 67. C. coleoptris rubris: punctis sex nigris; intermedius majoribus sinuatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 96. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 56. *n.* 34.
Habitat in America *boreali.*

sexmaculata. 68. C. coleoptris rubris: punctis sex nigris: anterioribus quatuor transversis sinuatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 96. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 56. *n.* 35. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 262. Coccinella (undulata) coleoptris rufis: fasciis binis interruptis undulatis nigris, postice puncto unico.
Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 7. *p.* 160. *t.* 43. *f.* 12.
Habitat in India, *mediæ magnitudinis*, *pallide flavescens.*

sexnotata. 69. C. elytris flavis: arcubus quatuor punctisque duobus nigris. *Thunb. nov. act. Upf.* 4. *p.* 9. *n.* 15. *t.* 1. *f.* 2.
Habitat in Suecia, *thorace flavo punctis* 5 *nigris contiguis variis*, *bipunctatæ magnitudine.*

trifasciata. 13. C. coleoptris rubris, fasciis nigris tribus. *Fn. suec.* 475.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 95. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 55. *n.* 26.
Raj. inf. p. 87. *n.* 9. Scarabæus hemisphæricus minor, &c.
Habitat in Europæ *hortis.*

bifasciata. 70. C. coleoptris ferrugineis: fasciis duabus punc-

Species diversas conjunctas vidi, ut bipunctatam cum sexpustulata; species maculis interdum variant, unde maculis plures vel pauciores, nisi rationem thoracis habeas.

ctisque quatuor nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 56. *n.* 27.
Thunb. nov. inſ. ſpec. 1. *f.* 24. Coccinella flexuoſa.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magna, nigra, capite, thorace pedibusque ferrugineis.*

inæqualis. 71. C. coleoptris flavis: punctis anterioribus tribus futura faſciaque apicis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 25.
Habitat in nova Hollandia.

cingulata. 72. C. coleoptris luteis: punctis quatuor baſeos faſcia poſteriore punctoque apicis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 24.
Habitat Tranquebariæ, *magna, nigra, capite, thorace pedibusque flavis.*

flexuoſa. 73. C. ovata, coleoptris luteis: faſcia flexuoſa punctisque duobus nigris, thoracis margine albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 95. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 23.
Habitat Hamburgi.

undata. 74. C. oblonga, coleoptris luteis: faſcia flexuoſa punctisque duobus nigris, thorace flavo punctato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 22.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magna, atra.*

arcuata. 75. C. ovata, coleoptris rubris: punctis quatuor, faſciis duabus punctoque apicis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 21.
Habitat in Sina, *mediæ magnitudinis, nigra, capite albido.*

tricincta. 76. C. ovata, coleoptris rubris: faſciis tribus atris; anteriore abbreviata tricuſpidata. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 55. *n.* 20.
Habitat in Sina, *mediæ magnitudinis, nigra.*

ri-

rivularis. 77. C. coleoptris luteis: fasciis duabus dorsalibus sinuatis punctisque sex nigris, thorace atro flavo-bipunctato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 54. *n.* 19.
Habitat in Suecia, *mediæ magnitudinis.*

hieroglyphica. 14. C. coleoptris luteis: maculis duabus nigris longitudinalibus sinuatis. *Fn. suec.* 476. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 95. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 54. *n.* 18.
Degeer inf. 4. *p.* 382. *n.* 15. Coccinella coleoptris flavo-rubris, &c.
Sulzer hist. inf. t. 3. *f.* 4.
Habitat in Europæ *hortis*, *affinis decempustulatæ.*

septempunctata. 15. C. coleoptris rubris: punctis nigris septem.
Fn. suec. 477. * *Scop. ent. carn.* 235. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 321. *t.* 6. *f.* 1. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 96. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 36.
Frisch. inf. 4. *p.* 1. *t.* 1. *f.* 4.
Petiv. gaz. 33. *t.* 21. *f.* 3.
Goed. inf. 2. *p.* 58. *t.* 18.
Raj. inf. 86. *n.* 1.
Merian. europ. 24. *f.* 11.
Albin. inf. 61. *f.* C.
Roes. inf. 2. *scar.* 3. *p.* 7. *t.* 2.
Reaum. inf. 3. *t.* 31. *f.* 18.
Bradl. nat. t. 27. *f.* 4.
List. sc. angl. 382. *n.* 7.
Ammir. inf. t. 14.
Sulz. inf. t. 3. *f.* 13.
Hollar. t. 4. *f.* 8.
Degeer inf. 5. *p.* 370. *n.* 4. *t.* 10. *f.* 14.
Schaeff. ic. t. 9. *f.* 7.
Habitat in Europæ *plantis frequens.*
Elytrorum *puncta in triangulum posita.*

septemmaculata. 78. C. oblonga, coleoptris rubris: punctis nigris septem; communi trilobo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 97. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 37.

Ha-

Habitat in Germania.
Thorax *ater, margine albus.*

octo-punctata. 79. C. coleoptris rubris: punctis nigris octo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 97. *n.*23. *mant. inſ.* 1, *p.*57. *n.*38.
Habitat in Germania, *an varietas ſexpunctatæ?*

tranſverſalis. 80. C. coleoptris luteis: maculis octo nigris; anterioribus quatuor tranſverſis ſinuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 39.
Habitat in Coromandel, *mediæ magnitudinis, nigra.*

octomaculata. 81. C. coleoptris luteis: punctis nigris octo; anterioribus ſex tranſverſis ſinuatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 40.
Habitat - - - *magna, nigra, capite & thorace luteis.*

novemmaculata. 82. C. coleoptris rubris: punctis novem nigris; poſterioribus communi, thorace bipunctato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.*57.*n.*41.
Fabr. ſyſt. ent. p. 81. *n.* 15. Coccinella novempunctata.
Habitat in nova Hollandia.

novempunctata. 16. C. coleoptris rubris: punctis nigris novem. *Fn. ſuec.* 478. * *Scop. ent. carn.* 236. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 42. *Uddm. diſſ.* 14. Coccinella nigra, elytris rubris, punctis novem nigris.
Fabr. ſyſt. ent. p. 81. *n.*16. Coccinella decempunctata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 322. *n.* 4.
Degeer inſ. 5. *p.* 373. *n.* 6.
β) Coccinella coleoptris rufeſcentibus: punctis 1. 2.

Coccinellarum *larvae aphides conſumunt, eoque plantas a phthiriſi bene tuentur.*

2. 1. cum punctо communi ad ſcutellum, thorace albido: macula ſcutiformi nigra: punctis duobus albis, capite poſterius faſcia nigra. *Muſ. Leſk. p.* 10. *n.* 193.

Habitat in Europæ *hortis & juniperetis.*

decem-punctata. 17. C. coleoptris fulvis: punctis nigris decem. *Fn. ſuec.* 479. * *Scop. ent. carn.* 237. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 43. *Degeer inſ.* 5. *p.* 374. *n.* 7.

β) Coccinella coleoptris flavo rufeſcentibus: punctis 1. 3. 1. thorace maculis 4 punctisque interpoſitis 3. nigris. *Muſ. Leſk. p.* 11. *n.* 195.

Habitat in Europæ *plantis.* Thorax *maculis quatuor.*

decem-maculata. 83. C. oblonga, elytris fulvis: punctis nigris decem; duobus communibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 44.

Habitat in America *boreali, atra, ſtatura tredecim-punctatæ.*

dilatata. 84. C. ſubrotunda, coleoptris marginatis fulvis: punctis nigris decem, thorace bipunctato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 45.

Habitat in America.

11-punctata. 18. C. coleoptris rubris: punctis nigris undecim. *Fn. ſuec.* 480. * *Strom act. nidr.* 3. *p.* 388. *t.* 6. *f.* 2. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 325. *n.* 9. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 57. *n.* 46. *Merian. europ.* 168. *Degeer inſ.* 5. *p.* 375. *n.* 8.

β) C. thorace albo: punctis quinque ſeptemve nigris, coleoptris rubicundis; punctis 11, aliis 6, aliis 4 nigris. *Muſ. Leſk. p.* 10. *n.* 181.

γ) C. coleoptris rubris: punctis nigris undecim 1. 3. 1. una cum communi ad ſcutellum, thorace fla-

flavescente : guttis 5 nigris & utrinque punctulo nigro. *Mus. Lesk. p.* 11. *n.* 194.
Habitat in Europa *boreali.*

11-maculata. 85. C. coleoptris rubris : punctis nigris undecim, corpore ferrugineo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 47. *Schaeff. ic. t.* 254. *f.* 3. a. 3. b?
Habitat in Hispania, 11-*punctata duplo major.*

11-punctata. 19. C. coleoptris flavis : punctis nigris sex ; extimo lineari repando. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 98. *n.* 32. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 48.
Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. *p.* 45. *n.* 13. *t.* 22. *f.* 8. h?
Habitat in Europa, *minuta, flava, subtus nigra.*

variegata. 86. C. coleoptris flavis : punctis nigris duodecim fasciaque media nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 33. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 49.
Habitat ad Caput bonæ spei, *mediæ magnitudinis, flava.*

chrysomelina. 87. C. coleoptris rufis : punctis nigris duodecim, thorace immaculato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.* 57. *n.* 50.
Thunb. nov. sp. inf. 1. *p.* 16. *f.* 21.
Habitat in cacto opuntia Africæ, *& in* Calabria, *ovata, gibba, oculatæ magnitudine.*

borealis. 88. C. coleoptris flavis : punctis nigris duodecim; duobus communibus, ultimis orbiculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 35. *mant. inf.* 1. *p.* 58. *n.* 51.
Thunb. nov. inf. spec. 1. *p.* 15. *f.* 20. Coccinella elytris rufis : punctis duodecim nigris, thorace quadripunctato.
Habitat ad Caput bonæ spei, *gibba, subtus lutea, ocellatæ magnitudine.*

cas-

cassidea. 89. C. oblonga rubra, coleoptris punctis duodecim, thorace quatuor nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 36. *mant. inf.* 1. *p.* 58. *n.* 52.
Habitat in America *boreali.*

13-maculata. 90. C. coleoptris flavis: punctis nigris tredecim, corpore orbiculato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 58. *n.* 53.
Forster nov. inf. sp. cent. 1. *p.* 18. *n.* 18. Coccinella coleoptris luteis: punctis nigris tredecim, thorace albo nigro-punctato.
Habitat in Europa *boreali.*

13-notata. 91. C. elytris flavis; punctis nigris tredecim thorace luteo: punctis septem nigris. *Tunb. nov. act. Upf.* 4. *p.* 10. *n.* 16. *t.* 1. *f.* 4.
Habitat in Europa, *bipunctatæ magnitudine, flava, antennis rubris.*

13-punctata. 20. C. coleoptris luteis: punctis nigris tredecim, corpore oblongo. *Fn. fuec.* 481. *Scop. ent. carn.* 238. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 323. *n.* 6. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 38. *mant. inf.* 1. *p.* 58. *n.* 54. *Degeer inf.* 5. *p.* 375. *n.* 9. *Reaumur inf.* 3. *t.* 31. *f.* 79. *Schæff. ic. t.* 48. *f.* 6.
β) Coccinella oblonga. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 43. *n.* 7. *t.* 22. *f.* 4. d.
Habitat in Europa *frequens.*

ursicolor. 92. C. coleoptris flavis: punctis quatuordecim nigris; duobus communibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 58. *n.* 55.
Habitat in Sina, *orbiculata, gigantea, flava, olivacea aut nigra.*

14-punctata. 21. C. coleoptris flavis: punctis nigris quatuordecim; quibusdam contiguis. *Fn. fuec.* 482.

Fa-

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 99. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 56.
Scop. ent. car. 243. Coccinella teſſulata.
Schaeff. ic. t. 62. *f.* 6.
Herbſt apud Fuesslı Arch. Inſ. 4. *t.* 22. *f.* 5. c.
Habitat in Europæ *hortis*, *frequens.*

14-maculata. 93. C. coleoptris luteis: ſutura punctisque quatuordecim nigris diſtinctis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 57.
Habitat Halæ Saxonum, *14-punctata major*, *thorace nigro-punctato & capite albis.*

16-punctata. 22. C. coleoptris flavis: punctis nigris ſedecim. *Fn. ſuec.* 483. * *Scop. ent. carn.* 240. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 59. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 44. *n.* 11. *t.* 22. *f.* 6. f.
Habitat in Italia, & Germania *major*, *oblonga*, *albida*, *capite quadripunctato.*

16-maculata. 94. C. coleoptris rubris: punctis nigris ſedecim, capite immaculato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 60.
Habitat Halæ Saxonum, *majuſcula*, *oblonga.*

oculata. 95. C. elytris rubris: punctis novem nigris, circulo flavo circum oculos. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 14. *f.* 18.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *atra*, *magnitudine ſeptem-punctatæ.*

ocellata. 23. C. coleoptris luteis: punctis nigris quindecim ſubocellatis. *Fn. ſuec.* 484. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 58. *n.* 58.
Gadd. ſat. 26. Coccinella elytris flavo-luteis, punctis quindecim nigris ocello flavo cinctis.
Degeer inſ. 5. *p.* 376. *n.* 10. *t.* 11. *f.* 1.

Me-

Merian. inſ. eur. 48. *f.* 5.
Sulz. inſ. t. 13. *f.* 14.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 2.
elem. t. 47. *f.* 1.
Habitat in Europæ *hortis*, *congeneribus plurimis major.*

18-punctata. 24. C. coleoptris flavis: punctis nigris octodecim, ultimo arcuato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 61. *Muſ. Lesk. p.* 10. *n.* 184.
Coccinella gemella. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ.* 4. *p.* 44. *n.* 12. *t.* 22. *f.* 7. g.
Habitat in Europa *borcali*, *thoracis lateribus flavis.*

19-punctata. 25. C. coleoptris flavis: punctis nigris novendecim. *Fn. ſuec.* 485. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 325. *n.* 10. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 62.
Mull. prodr. zool. dan. p. 67. *n.* 632. Coccinella lutea, &c.
Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 4. *p.* 45. *n.* 14. *t.* 22. *f.* 9. I.
Habitat in Europæ *plantis.*

20-punctata. 96. C. coleoptris flavis: punctis nigris viginti. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 329. *n.* 17. *Scop. ent. carn.* 242. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 63.
Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 4. *par. t.* 22. *f.* 10. k.
Habitat rarior in Europa.

22-punctata. 26. C. coleoptris flavis: punctis nigris viginti duobus. *Fn. ſuec.* 486. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *p.* 101. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 64.
Degeer inſ. 5. *p.* 379. *n.* 12.
Raj. inſ. p. 87. *n.* 6.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 10.
Habitat in Europæ *hortis*, *parva.*

23-

23-punctata. 27. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti tribus distinctis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 46. *mant. inf.* 1. *p.* 59. *n.* 65.
Habitat in Europæ *plantis, parva, rubra, subtus rufa.*

24-punctata. 28. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti quatuor. *Fn. suec.* 487. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 326. *n.* 11. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 47. *mant. inf.* 1. *p.* 59. *n.* 66. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 45. *n.* 16. *t.* 22. *f.* 11. l.
Degeer inf. 5. *p.* 381. *n.* 14. Coccinella coleoptris rufo-fuscis, &c.
Habitat in Europæ *hortis.*

25-punctata. 29. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti quinque. *Fn. suec.* 488.
Habitat in Europa.
Puncta *quadrata, passim ovalita.*

28-punctata. 97. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti octo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 48. *mant. inf.* 1. *p.* 59. *n.* 67.
Habitat Tranquebariæ.

conglobata. 30. C. coleoptris rubris: punctis nigris plurimis subcontiguis. *Fn. suec.* 489. *
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 326. *n.* 12.
Degeer inf. 5. *p.* 378. *n.* 11. Coccinella rosea.
Frisch inf. 9. *p.* 34. *t.* 17. *f.* 6.
Habitat in Europa, *an mera conglomeratæ varietas?*

conglomerata. 31. C. coleoptris flavescentibus: punctis nigris plurimis contiguis. *Fn. suec.* 490. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 49. *mant. inf.* 1. *p.* 59. *n.* 68.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 316. *n.* 12.
Degeer inf. 5. *p.* 383. *n.* 17.
Raj. inf. p. 87. *t.* 5.

List.

Liſt. loq. p. 383. *n.* 9.
Friſch inſ. 9. 34. *t.* 17. *f.* 4. 5.
Schaeff. ic. t. 171. *f.* 1. a. b.
Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 4. *t.* 22. *f.* 14. 15?
Habitat in Europæ *hortis frequens.*

tricolor. 98. C. coleoptris flavis: punctis decem rubris, maculisque decem atris marginalibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 69.
Habitat in inſula Amſterdam *maris auſtralis.*

detrita. 99. C. flava, coleoptris immaculatis, thorace albo maculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 59. *n.* 70.
Habitat in nova Hollandia.

japonica. 100. C. elytris flavis, cruce ſuturæ duplici maculisque quatuor nigris. *Tunb. nov. inſ. ſpec.* 1. *p.* 12. *f.* 12.
Habitat in Japonia, *magnitudine hieroglyphicæ.*

grandis. 101. C. elytris flavis: punctis nigris tredecim thorace nigro: marginibus flavis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 12. *f.* 13.
Habitat in Sina, *coccinellarum maxima.*

gibba. 102. C. elytris rubris, faſcia punctisque ſex nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 13. *f.* 14.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *tenuiſſime hirta, rubra, pectore nigro, magnitudine ſeptempunctatæ.*

capenſis. 103. C. elytris rubris: punctis octo nigris, thorace immaculato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 13. *f.* 15.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *rubra, magnitudine ſeptempunctatæ.*

Pſi. 104. C. elytris flavis: margine exteriore maculis quatuor nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 13. *f.* 16.

Ha-

Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magnitudine fere ſeptempunctatæ, flavicans, pectore nigro.*

iridea. 105. C. elytris rubris: punctis novem nigris ocellaribus. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 14. *f.* 17.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *glabra, rubra, magnitudine fere ſeptempunctatæ.*

ſimilis. 106. C. elytris rubris: faſciis duabus punctisque quatuor nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 15. *f.* 19.
Habitat - - *magnitudine ſeptempunctatæ, ſupra pilis breviſſimis cinereis hirta, ſubtus nigra.*

puſilla. 107. C. elytris flavis: punctis octo nigris quadriſariis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 16. *f.* 22.
Habitat - - - *flaveſcens, glabra, pulice vix major.*

diſtincta. 108. C. elytris rubris: punctis ſedecim nigris diſtinctis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 17. *f.* 23.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *nigra, ſupra pilis minimis cinereis adſperſa, quinquepunctatæ magnitudine.*

repanda. 109. C. elytris flavis: faſciis tribus undatis nigris. *Thunb. nov inſ. ſp.* 1. *p.* 18. *f.* 25.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *glabra, nigra, ſeptempunctatæ magnitudine.*

flavicollis. 110. C. elytris ſanguineis: punctis decem nigris, thorace flavo. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 18. *f.* 26.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *flavicans, pilis tenuiſſimis hirta, ſeptempunctatæ magnitudine.*

undulata. 111. C. elytris rubris: faſciis undatis dentatisque variis nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 18. *f.* 27.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſeptempuſtulatæ magnitudine, ſupra pilis breviſſimis cinereis hirſuta flaveſcens, ſubtus nigra.*

lu-

lunaris. 112. C. elytris flavis: fasciis duabus arcu punctisque quinque nigris. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 19. *f.* 28.
Habitat ad Caput bonæ spei, *septempunctatæ fere magnitudine, glabra, nigra.*

Crux. 113. C. elytris flavis: lineis duabus cruceque nigris. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 20. *f.* 29.
Habitat ad Caput bonæ spei, *subtus nigra.*

Comma. 114. C. elytris flavis: sutura, margine lineaque nigris. *Thunb. nov. sp. inf.* 1. *p.* 20. *f.* 30.
Habitat ad Caput bonæ spei, *quinque punctatæ magnitudine, supra flava.*

lineata. 115. C. elytris rubris: margine omni maculisque duabus oblongis nigris. *Thunb. nov. sp. inf.* 1. *p.* 21. *f.* 31.
Habitat ad Caput bonæ spei, *glabra, quinquepunctatæ magnitudine, flava, abdomine femoribusque nigris.*

octoguttata. 116. C. elytris rubris: maculis octo flavis. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 24. *f.* 37.
Habitat in Japonia, *ocellata paulo major, glabra, rubra.*

variabilis. 117. C. elytris rubris: maculis undecim nigris, thoracis quatuor cordatis. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 42. *n.* 6. *t.* 22. *f.* 3. c.
Habitat Berolini, *bipunctata paulo major, magis oblonga, macularum punctorumque numero varians.*

centumpunctata. 118. C. elytris fulvis: punctis nigris plurimis; multis confluentibus. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 45. *n.* 17. *t.* 22. *f.* 13.
Habitat in India, *septem lineas longa.*

qua-

quadri-lineata. 119. C. elytris flavis : lineis tribus longitudinalibus tranſverſaque maculisque duabus confluentibus nigris. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 4. p. 46. n. 18. t. 22. f. 12. m.*
Habitat - - - oblonga, nigra.

ſparſa. 120. C. elytris ſpadiceis : punctis viginti-quatuor nigris. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 7. p. 160. n. 37. t. 43. f. 11.*
Habitat in India, *ſeptempunctatæ magnitudine, pilis albicantibus hirſuta, ſpadicea.*

Punctum. 121. C. elytris fulvis immaculatis, thoracis macula media anguloſa nigra. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 7. p. 161. n. 40. t. 43. f. 14. g. h.*
Habitat - - - 1½ lineas longa, capite nigra, thorace fulvo.
** *coleoptris rubris flavisve, albo-maculatis.*

bimaculoſa. 122. C. elytris fulvis : lituris duabus obſoletis albis ſemilunaribus. *Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 7. p. 160. n. 39. t. 43. f. 13. e. f.*

punctato-guttata. 23. C. coleoptris rubris : punctis albis quatuordecim, nigris tribus. *Fn. ſuec. 491.* *
Habitat in Europa, *an ſolo ſexu a decempuſtulata diſtincta?*

bigutta-tata. 123. C. coleoptris rufis : punctis duobus flavis. *Fabr. mant. inſ. 1. p. 59. n. 72.*
Habitat - - - parva, thorace glabro atro, margine laterali flavo.

camtſchatcenſis. 124. C. coleoptris obſcure rufis : punctis octo albis. *Fabr. mant. inſ. 1. p. 59. n. 71.*
Habitat in Camtſchatca, *mediæ magnitudinis, atra.*

10-

10-guttata. 33. C. coleoptris luteis: punctis albis decem. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 102. *n.* 51. *mant. inf.* 1. *p.* 60. *n.* 73. *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 47. *n.* 20. *t.* 22. *f.* 16. p. g.

β) Coccinella 10-guttata minor, coleoptris rubris, puncto anteriori marginali lunato. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 263.

Habitat in Suecia *hortis*, *minor*. Fabricius.

12-guttata. 125. C. coleoptris ex luteo fuscis: punctis albis 12. *Herbst apud Fuessli Arch. inf.* 4. *p.* 47. *n.* 26. *t.* 22. *f.* 10. v.

β) *Schranck enum. inf. Austr. p.* 61. *n.* 111.

γ) C. coleoptris flavo rufescentibus: guttis sex albis 1. 2. 2. 1. *Mus. Lesk. p.* 11. *n.* 210.

Habitat - - -

bisseptemguttata. 126. C. coleoptris luteis: punctis quatuordecim albis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 265. *Habitat* - - - *citrea*, 16-*guttatæ statura & magnitudine.*

14-guttata. 34. C. coleoptris rufis: punctis quatuordecim albis. *Fn. suec.* 492. * *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 327. *n.* 13. *Scop. ent. carn.* 248. *Fabr. sp. inf. p.* 102. *n.* 52. *mant. inf.* 1. *p.* 60. *n.* 74.

Raj. inf. p. 86. *n.* 3.

List. loq. 383. *n.* 10.

Degeer inf. 5. *p.* 385. *n.* 20.

Schaeff. ic. t. 9. *f.* 11.

Herbst apud Fuessli Arch. Inf. 4. *p.* 47. *n.* 21. *t.* 22. *f.* 17. r.

Habitat in Europæ *salicibus*, *ex testaceo lutea*, *capite nigro.*

cayennensis. 156. C. coleoptris fulvis: punctis duodecim lunulisque utrinque duabus connatis albis. *Fabr. mant. inf.* 2. *app. p.* 379.

Habitat in Cayenna, *rufa, mediæ magnitudinis.*

15-gut-tata. 127. C. coleoptris luteis: punctis quindecim albis: communi medio obfoleto. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 75.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 327. *n.* 14.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 4. *p.* 47. *n.* 22. *t.* 22. *f.* 18. f.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

16-gut-tata. 35. C. coleoptris luteis: punctis albis ſedecim.
Fn. ſuec. 493. *Scop. ent. carn.* 249. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 79.
Degeer inſ. 5. *p.* 385. *n.* 21.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 5.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 7. *p.* 161. *n.* 42. *t.* 43. *f.* 16. l. m.
Habitat in Europa.

18-gut-tata. 36. C. coleoptris rubris: punctis albis octodecim.
Fn. ſuec. 494. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 55. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 77. *Scop. ent. carn.* 241.
Schaeff. ic. t. 9. *f.* 12.
ε) Coccinella ornata. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 4. *p.* 47. *n.* 23. *t.* 22. *f.* 19. t.

20-gut-tata. 37. C. coleoptris rubris: punctis albis viginti.
Fn. ſuec. 495. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 78.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 4. *p.* 47. *n.* 24. *t.* 22. *f.* 20. u.

oblongo-gutta-ta. 38. C. coleoptris rubris: lineis punctisque albis.
Fn. ſuec. 496. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 60. *n.* 79. *Scop. ent. carn.* 242.
Degeer inſ. 5. *p.* 384. *n.* 19.
Schaeff. ic. t. 9. *f.* 10.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 9. *f.* 6.

Sulz.

Sulz. hiſt. inſ. t. 3. f. 14.
Habitat rarior in Europæ *hortis.*

oblite-rata. 39. C. coleoptris flavis: punctis quatuor rufis; anterioribus obſoletis. *Fn. ſucc.* 497. *
Habitat in Europa.

pallida. 128. C. elytris flavis: lineis quatuor fuſcis. *Thunb. nov. act. Upſ. 4. p. 9. n. 14. t. 1. f. 1.*
Habitat Upſaliæ, *flava, bipunctatæ magnitudine.*

**** Coleoptris nigris: rubro maculatis.*

impuſtulata. 40. C. coleoptris nigris: puncto nullo. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 103. n. 58. mant. inſ. 1. p. 60. n. 80.*
Habitat in Germaniæ *nemoribus, ſtatura quadripuſtulatæ, tota atra, thoracis lateribus flavis: puncto nigro.*

analis. 129. C. coleoptris atris apice rubris immaculatis. *Fabr. mant. inſ. 1. p. 60. n. 81.*
Habitat Halæ Saxonum, *hæmorrhoidali affinis, at duplo minor.*

hæmorrhoidalis. 130. C. coleoptris atris apice rubris: faſcia nigra. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 104. n. 59. mant. inſ. 1. p. 60. n. 82.*
Habitat Hamburgi, *frequenter puncto ſanguineo communi in dorſo notata.*

flavipes. 131. C. elytris nigris, thorace nigro: maculis duabus flavis. *Trunb. nov. inſ. ſp. 1. p. 21.*
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *bipuſtulatæ magnitudine, impuſtulatæ affinis, at punctum nigrum nullum ad latera thoracis.*

Cacti. 41. C. coleoptris atris: maculis duabus rubris. † *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 104. n. 60. mant. inſ. 1. p. 60. n. 83.*

Gron. zooph. 609. Coccinella coleoptris marginatis nitidis atris, macula solitaria subrotunda utrinque.
Merian. surin. p. 2. *t.* 2. *f.* summa.
Pet. gaz. t. 1. *f.* 5.
Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 31-33. & *t.* 9. *f.* 13.
Habitat in Americæ *cactis, sæpius inter coccos cacti lecta, bipustulatæ similis.*

bipustulata. 42. C. coleoptris nigris: punctis rubris duobus, abdomine sanguineo. *Fn. suec.* 498. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 61. *mant.* 1. *p.* 60. *n.* 84. *Lachart. inf. tir.* 1. *p.* 134.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 334. *n.* 26.
Degeer inf. 5. *p.* 387. *n.* 27. *t.* 10. *f.* 25.
Frisch. inf. 9. *p.* 34. *t.* 16. *f.* 6.
Roes. inf. 2. *scar.* 3. *p.* 10. *t.* 3.
ß) *Herbst apud Fuessli Arch. Inf.* 4. *p.* 48. *n.* 27. *t.* 22. *f.* 22. w.
Habitat in Europæ *hortis frequens, etiam in* America *septentrionali.*
Elytrorum *singula puncta e tribus conflata.*

mutabilis. 132. C. coleoptris nigris, punctis duobus rubris orbiculatis submarginalibus, corpore oblongo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 62. *mant. inf.* 1. *p.* 60. *n.* 85.
Habitat Hamburgi.
Elytra *junioribus lutescentia*; *puncto flavescente.*

frontalis. 133. C. coleoptris nigris: punctis duobus rubris, fronte pedibusque anterioribus rubris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 60. *n.* 86.
Habitat Halæ Saxonum, *capite interdum nigro, punctisque elytrorum quatuor.*

tripustulata. 157. C. coleoptris nigris: basi macula magna lutea,

tea, medio puſtulis duabus apiceque unica rubra. *Lesk. muſ. p.* 12. *n.* 215.
Habitat in Europa.

lunulata. 158. C. coleoptris nigris margine reflexis: puncto medio baſeosque lunula media rubris. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 317.
Habitat - - -

limbata. 159. C. coleoptris nigris: lunula ad marginem baſeos exteriorem rubra, thorace nigro: margine albo. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 219.

leucocephala. 160. C. nigra, thorace anterius, capite, punctisque elytrorum ſeptem albis. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 223.
Habitat - - - *macula capitis trigona nigra, punctis elytrorum tribus ad marginem externum poſitis margine connexis.*

nigra. 161. C. nigra, elytris ſingulis poſterius gutta rubra notatis. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 224.

ruficauda. 162. C. rubra, elytris nigris apice rubris. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 225.
Habitat in Europa.

bifaſciata. 163. C. nigra, thoracis margine externo elytrisque flavis: faſcia media longitudinali & communi futuræ nigræ. *Muſ. Lesk. p.* 12. *n.* 226.
Habitat in America.

quadripuſtulata. 43. C. coleoptris nigris: punctis rubris quatuor: interioribus longioribus. *Fn. ſuec.* 449. * *Scop. ent. carn.* 244. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 63. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 87.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 333. *n.* 25.
Degeer inſ. 5. *p.* 389. *n.* 24.

Ber-

Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 9. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 16. 17.
Habitat in Europæ *hortis, aliquando cum bipunctata copula conjuncta.*

erythrocephala. 134. C. coleoptris atris: punctis rubris ſex, capite thoracisque margine pallide rufeſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 88. *Muſ. Leske. p.* 12. *n.* 220.
Habitat Kilonii, *ſexpuſtulata minor, capite & abdomine rubris.*

ſexpuſtulata. 44. C. coleoptris nigris: punctis rubris ſex. *Fn. ſuec.* 500. * *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 331. *n.* 20. *Scop. ent. carn.* 245. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 64. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 89.
Degeer inſ. 5. *p.* 390. *n.* 25.
Raj. inſ. p. 87. *n.* 4.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 12.
β) *Sulz. hiſt. inſ. t.* 3. *f.* 6.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat in Europæ *hortis, varius varians puncto adhuc minutiſſimo ad ſuturam rubro.*

lunata. 135. C. coleoptris nigris: maculis decem rubris, ſex lunatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 65. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 90.
Thunb. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 22. *f.* 33. Coccinella rivoſa.
Habitat in inſula S. Helenæ *& ad* Caput bonæ ſpei, *gibba, glabra, ocellatæ magnitudine.*

hirta. 136. C. elytris nigris: maculis duodecim rubris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 23. *f.* 35.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ocellatæ magnitudine, atra, pilis cinereis hirta.*

Roppenſis. 137. C. oblonga elytris nigris: maculis fulvis or-

orbicularibus duabus. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 4. *p.* 48. *n.* 28. *t.* 22. *f.* 23. x.
Habitat in Marchia, *nigra.*

campeſtris. 138. C. ſubrotunda, elytris nigris: maculis duabus orbicularibus fulvis, pedibus anterioribus fulvis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 4. *p.* 48. *n.* 29. *t.* 22. *f.* 24. y.
Habitat in Marchia.

faſciata. 139. C. elytris nigris: faſcia tranſverſa maculis quatuor fulvis conflata. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 4. *p.* 49. *n.* 30. *t.* 22. *f.* 25. z.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 334. *n.* 26.
Habitat in Gallia & Germania.

decempuſtulata. 45. C. coleoptris nigris: punctis fulvis decem. *Fn. ſuec.* 501. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 66. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 91.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 330. *n.* 19.
Degeer inſ. 5. *p.* 391. *n.* 26.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 10. & *t.* 171. *f.* 2.
Liſt loq. 383. *n.* 9.
Friſch inſ. 9. *t.* 17. *f.* 4. 5.
Raj. inſ. 87. *n.* 15.
Habitat in Europæ *hortis, varians elytrorum punctis flavis & rubris.*

ruſſica. 140. C. elytris nigris: punctis duodecim fulvis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 4. *p.* 49. *t.* 22. *f.* 26.
Habitat in Ruſſia, *ſeptempunctatæ magnitudine.*

16-puſtulata. 47. C. coleoptris nigris: punctis nigris ſedecim. *Fn. ſuec.* 503.
Habitat in Europa.

20-pu-ſtulata. 141. C. elytris nigris : punctis fulvis viginti. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 24. *f.* 36.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſeptempunctatæ magnitudine, gibba, nigra, tenuiſſime hirta.*

guttato-puſtulata. 142. C. coleoptris nigris : punctis duobus flavis quatuorque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 69. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 94.
Habitat in nova Hollandia.

**** *Coleoptris nigris, albo flavoque maculatis.*

atra. 143. C. elytris nigris: maculis duabus flavis, thoracis marginibus anoque flavis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 21.
Habitat - - - bipuſtulata minor, valde gibba, glaberrima.

lævis. 144. C. elytris nigris : punctis ſex flavis, thoracis angulis anterioribus flavis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 22. *f.* 32.
Habitat - - - glabra, nigra, capite pedibusque flavis, bipuſtulatæ magnitudine.

dentata. 145. C. elytris nigris : margine exteriore linea tridentata punctisque ſex flavis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 23. *f.* 34.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *14-punctatæ magnitudine, nigra, capite, thoracis & abdominis margine pedibusque flavis.*

antherina. 48. C. coleoptris nigris : punctis flavis octo. *Fn. ſuec.* 504. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 71. *mant. inſ.* 1. *p.* 61. *n.* 96.
Degeer inſ. 5. *p.* 392. *n.* 28.
Habitat in Europa *boreali.*

humeralis. 146. C. coleoptris nigris : punctis flavis octo : antete-

terioribus duobus uncinatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 266.
Habitat Halæ Saxonum, *flavicans*, *ad* 14-*pustulatum accedens.*

14-pustulata. 46. C. coleoptris nigris: punctis flavis quatuordecim. *Fn. fucc.* 502. * *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 330. *n.* 18. *Scop. ent. carn.* 246. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 68. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 93.
Uddm. diff. 15. Coccinella coleoptris nigris: maculis decem pallide flavis.
Pod. inf. 26. Coccinella 14-maculata.
Degeer inf. 5. *p.* 391. *n.* 27.
Shaeff. ic. t. 20. *f.* 10.
Habitat in Europæ *floribus.*

tigrina. 49. C. coleoptris nigris: punctis albidis viginti. *Fn. fucc.* 505. * *Uddm. diff.* 11. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 74. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 100.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. *p.* 49. *n.* 36. *t.* 22. *f.* 27.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 9.
Habitat in Europa *boreali*, *an varietas* 20-*guttatæ?*

felina. 147. C. coleoptris atris: punctis sex albis, corpore globoso. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 70. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 95.
Habitat in America *boreali.*

pardelina. 148. C. coleoptris nigris: punctis decem margineque sinuato albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 72. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 97.
Habitat - - - *magna*, *atra.*

ursina. 149. C. coleoptris atris: punctis decem albis, capite thoracisque margine anteriore albis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 98.
Habitat in America *boreali*, *parva*, *nitida*, *atra*, *capite pedibusque albis.*

12-

12-pustulata. 150. C. coleoptris nigris: punctis duodecim albis; exterioribus margine connexis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 67. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 92.
Habitat Hamburgi.

leonina. 151. C. coleoptris nigris: punctis albis sedecim. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 73. *mant. inf.* 1. *p.* 61. *n.* 99.
Habitat in nova Hollandia.

canina. 152. C. coleoptris nigris: punctis albis viginti, capite thoraceque villosis immaculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 75. *mant. inf.* 1. *p.* 62. *n.* 101.
Habitat ad Caput bonæ spei, *magna, nigra.*

Thunbergii. 153. C. elytris nigris: margine punctisque duobus albis, capite nigro: punctis albis. *Thunb. nov. act. Upf.* 4. *p.* 10. *n.* 17.
Habitat Upsaliæ, *bipustulatæ magnitudine, nigra.*

villosa. 154. C. villosa nigra, elytrorum marginibus flavis. *Fabr. mant. inf.* 2. *app. p.* 379.
Habitat in Cayenna, *magna.*

ALURNUS. *Antennæ* filiformes.
Palpi sex brevissimi.
Maxilla cornea, fornicata.

grossus. 1. A. ater, thorace coccineo, elytris flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 115. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 66. *n.* 1.
Habitat in America *australi* & India.

femoratus. 2. A. viridi-æneus, femoribus tibiisque posterioribus dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 115. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 66. *n.* 2.
Drury inf. 2. *t.* 34. *f.* 5. Tenebrio femoratus.
Sulz. hist. inf. t. 7. *f.* 8. Tenebrio viridis.

Ha-

Habitat in India, *magnus, lævis, nitidus, antennis corpore dimidio brevioribus: articulis ultimis nigris.*

dentipes. 3. A. niger, femoribus tibiisque posterioribus dentatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 66. *n.* 3.
Habitat ad Caput bonæ spei, *lævis, immaculatus, femorato affinis.*

199. CHRYSOMELA. *Antennæ* moniliformes.
Palpi sex extrorsum crassiores.
Thorax, nec elytra, marginatus.
Corpus (plerisque) ovatum.

* *femoribus posterioribus æqualibus.*

tenebrioides. 1. Chr. aptera atra, antennis pedibusque violaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 116. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 66. *n.* 1. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *t.* 23. *f.* 1. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 678. *n.* 29. Tenebrio (lævigatus) apterus niger lævis, elytris lævibus, thorace lunato, subtus cæruleus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 295. *n.* 19. Chrysomela atro-purpurea, &c.
Habitat in Europa *magis australi.*
Larva *gibba, violacea, ano rufo, polyphaga, plantis vilitat.*

Morio. 2. Chr. atra, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 66. *n.* 2.
Habitat in terra van Diemen, *tenebrioide paulo minor.*

gœt-

Chrysomelarum & cryptocephalorum *Larvæ conſumunt folia, relictis eorum va-*
ſis, pulpa cortenæ.

gœttingensis. 4. Chr. atra, pedibus violaceis. *Fn. suec.* 506. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 116. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 3.
Degeer inf. 5. *p.* 298. *n.* 8. Chrysomela violaceo-nigra, &c.
Laichart. inf. tyr. 1. *p.* 143. *n.* 2. Chrysomela coriaria.
Habitat in Europa.

vittata. 3. Chr. cyanea, elytris margine vittaque media flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 116. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 4.
Habitat in America, *magna*, *crassa*.

bicolor. 72. Chr. viridi-ænea, subtus violecea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 116. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 63. *n.* 5. *Forsk. Fn. ar. p.* 77. *n.* 2. Chrysomela viridi-ænea.
Habitat Alexandriæ.
Elytra *punctato-striata*.

affinis. 73. Chr. obscure ænea, subtus violacea, elytris lævibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 6.
Habitat sub lapidibus Barbariæ, *bicolori affinis*, at *duplo minor*.

lusitanica. 74. Chr. thorace cupreo, elytris æneis: punctis impressis cærulescentibus, subtus violacea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 116. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 7.
Habitat in Lusitania, *major chr. Banksii*.

ferruginea. 75. Chr. ferruginea, subtus nigra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 117. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 8.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *magna*.

Banksii. 76. Chr. supra ænea: subtus testacea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 117. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 9.
Habitat in Lusitania & Calabria.

So-

Sophiæ. 77. Chr. cærulea, tibiis plantisque flavis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 73. *n.* 86.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 272. Chryſomela ovata viridis, elytris poſtice acuminatis, tibiis plantisque ferrugineis.
Habitat Halæ Saxonum *in Siſymbrio Sophia, lævis, glabra, ſtatura & magnitudine chr. ermoraciæ.*

pallipes. 78. Chr. nigra, elytris pedibusque palleſcentibus. *Fabr. mant.* 1. *p.* 73. *n.* 215.
Habitat Kilonii, *parva.*

bimaculata. 79. Chr. oblonga atra, elytris teſtaceis: macula atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 67. *mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 87.
Habitat in America.

faſciata. 80. Chr. oblonga atra, elytris faſciis tribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 68. *mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 88.
Habitat in America.

ruficollis. 81. Chr. oblonga viridi-ænea, thorace pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 69. *mant. inſ.* 1. *p.* 72. *n.* 89. *Herbſt apud Fuesslı Arch. Inſ.* 7. *p.* 162. *n.* 61. *t.* 45. *f.* 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 263. *n.* 16. Chryſomela nigra, &c.
Habitat in Europa *magis auſtrali, etiam* Germania.

flavicornis. 82. Chr. oblonga punctata viridi-ænea, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 90.
Habitat in Cayenna, *minor.*

crenata. 83. Chr. oblonga ſubtus ænea, ſupra cuprea, antennis flavis: articulo quinto & ultimo fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 91.
Habitat in Cayenna, *flavicorni major.*

lit-

littora-lis. 84. Chr. oblonga atra, elytris porcatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 92.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 252. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 6. Galleraca atro-fuſca, lineis tribus elevatis punctis numeroſis.
Habitat ad Europæ *auſtralis littora, ſtatura chr. tanaceti, at major.*

cayenenſis. 85. Chr. oblonga atra, capite, thorace, femoribusque quatuor anterioribus obſcure rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 93.
Habitat in Cayenna, *ſtatura chr. tanaceti, at paulo major.*

tanaceti. 5. Chr. atra punctata, antennis pedibusque nigris. *Fn. ſuec.* 507. *It. gotl.* 270.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 128. *n.* 70. *mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 94.
Degeer inſ. 5. *p.* 299. *n.* 4. *t.* 8. *f.* 27. Chryſomela oblonga nigra punctata, elytris coriaceis.
Merian. inſ. eur. t. 68.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 14.
Habitat in Europæ *tanaceto, rarius tota obſcura griſea.*

ruſtica. 86. Chr. oblonga nigra, thorace elytrisque griſeis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 95.
Schaller Abh. hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 274. Chryſomela ovata nigra, elytris griſeis: ſtriis quinque eminentibus.
Habitat in Europæ *fruticibus, affinis chr. tanaceti.*

12-punctata. 87. Chr. oblonga, thorace flaveſcente, elytris viridibus: punctis ſex nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 71. *mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 96.
Habitat - - -

hæ-

hæmorrhoidalis. 6. Chr. nigra nitida, antennis basi flavescentibus, ano supra rubro. *Fn. suec.* 508. * *Scop. ent. carn.* 225. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 126. *n.* 60. *mant. inf.* 1. *p.* 72. *n.* 78.
Degeer inf. 5. *p.* 287. *n.* 6.
Habitat in betula & alno, *elytris striato-punctatis.*

fucata. 88. Chr. atra, thorace elytrisque viridi-æneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 126. *n.* 61. *mant. inf.* 1. *p.* 72. *n.* 79.
Habitat in Italia, *statura & magnitudine hæmorrhoidalis.*

fuscicornis. 89. Chr. viridi-ænea, antennis tibiisque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 126. *n.* 62. *mant. inf.* 1. *p.* 73. *n.* 80.
Habitat in Russia, *magnitudine & statura hæmorrhoidalis.*

graminis. 7. Chr. viridi-cærulea nitida, antennis pedibusque concoloribus. *Fn. suec.* 509. *Scop. ent. carn.* 220. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 118. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 68. *n.* 21.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 260. *n.* 10.
Degeer inf. 5. *p.* 304. *n.* 16.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 10.
Habitat in Europæ *plantis, præsertim gramine.*

cuprea. 90. Chr. capite thoraceque æneis, elytris cupreis, corpore atro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 118. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 68. *n.* 22.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 263. *n.* 15.
Laichart. inf. tir. 1. *p.* 144. *n.* 3. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 55. *n.* 26. *t.* 23. *f.* 14. Chrysomela metallica?
Habitat in Germania.

asiatica. 91. Chr. viridi-ænea nitidissima elytris cyaneis. *Pall.*

Pall. it. I. *p.* 463. *n.* 10. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 118. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 68. *n.* 20.
Habitat in Sibiria, *surinamensi major.*

glaberrima. 92. Chr. cyanea glaberrima, antennis plantisque fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 118. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 68. *n.* 19.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 16. Chrysomela americana.
Habitat Surinami, *rarior in* Europa *boreali, aliquando tota ænea.*

ignita. 93. Chr. cyanea nitida, elytris æneis, antennis plantisque fuscis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 68. *n.* 18.
Habitat in Cayenna, *maxima.*

ænea. 8. Chr. viridis nitida, abdomine posterius ferrugineo. *Fn. suec.* 510. *
Fn. suec. 1. *n.* 420. Chrysomela viridis nitida, thorace antice excavato.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 130. *n.* 80. *mant. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 106.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 261. *n.* 12.
Degeer inf. 5. *p.* 305. *n.* 18. *t.* 9. *f.* 4.
Habitat in betula alno, *etiam in* Calabria.

dresdensis. 95. Chr. oblonga, capite thoraceque obscure ferrugineis, elytris nigro-æneis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 105.
Habitat Dresdæ, *statura & magnitudine vitellinæ.*

alni. 9. Chr. violacea, elytris vage punctatis, pedibus antennisque nigris. *Fn. suec.* 511. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 128. *n.* 72. *mant. inf.* 1. *p.* 74. *n.* 97.
Degeer inf. 5. *p.* 314. *n.* 21. *t.* 9. *f.* 18.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 332. *n.* 1.
Frisch inf. 7. 13. *t.* 8.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 13.
Schæff. elem. t. 53. *f.* 1. 2.
Habitat in betula alno.

ab-

abſinthii. 97. Chr. oblonga pallida, thorace macula, elytris lineis tribus nigris. *Pall. it.* II. *p.* 725. *n.* 70. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 129. *n.* 73. *mant. inſ.* I. *p.* 74. *n.* 98.
Habitat in Sibiria, *magnitudine Chr. tanaceti.*

concolor. 98. Chr. oblonga flaveſcens nitida, oculis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 129. *n.* 74. *mant. inſ.* I. *p.* 74. *n.* 99.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *Chr. tanaceti paulo major.*

picea. 99. Chr. oblonga picea, pedibus teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 129. *n.* 75. *mant. inſ.* I. *p.* 74. *n.* 100.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *magna*, *glabra*, *nitida.*

betulæ. 10. Chr. violacea, elytris punctato-ſtriatis. *Fn. ſuec.* 514. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 129. *n.* 76. *mant. inſ.* I. *p.* 74. *n.* 101. *Scop. ent. carn.* 221.
Geoffr. inſ. par. I. *p.* 264. *n.* 17. Chryſomela nigro-purpurea, &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 318. *n.* 24. *t.* 9. *f.* 24. a. b. Chryſomela cærulea ſalicis, &c.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 3. *t.* 1.
Raj. inſ. 90. *f.* 5.
Muſ. Lesk. p. 14. *n.* 267?
Habitat in betulæ albæ *foliis*, *paginam inferiorem exedens.*

tricolor. 100. Chr. oblonga, thorace fulvo-viridi punctato, elytris viridibus nitidis, abdomine nigro. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 129. *n.* 77. *mant. inſ.* I. *p.* 74. *n.* 102.
Habitat --- *major Chr. betulæ*, *capite viridi*, *ore*, *pectore pedibusque fulvis*, *antennis fuſcis.*

hæmoptera. 11. Chr. violacea, plantis alisque rubris. *Fn. ſuec.* 512. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 68. *n.* 23.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 258. *n.* 5. Chryſomela tota violacea.
Degeer inſ. 5. *p.* 312. *n.* 20. *t.* 9. *f.* 13. Chryſomela hyperici?
Pod. inſ. 26. Chryſomela graminis.
Habitat in Europa.

fuſcipes. 250. Chr. violacea, antennis tibiis plantisque fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 243.
Habitat in Europa.

nitens. 251. Chr. oblonga violacea nitida, elytris læviſſime punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 261.
Habitat - - -

ſemiſtriata. 101. Chr. nigra, elytris flavis: faſcia media nigra, anterius & poſterius nigro-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 26.
Habitat in Braſilia.

centaurei. 102. Chr. cuprea nitens, ſubtus viridi-ænea, pedibus cupreis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 68. *n.* 25.
Habitat in Germaniæ *centaureo, variantis ſtaturâ & magnitudine.*

varians. 103. Chr. cærulea ſ. viridis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant.* 1. *p.* 68. *n.* 24.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 271. Chryſomela ſubgloboſa nitida, colore varians, antennis nigris.
Habitat in Saxonia, *ſtatura & magnitudine faſtuoſæ.*

occidentalis. 12. Chr. viridi-ænea, pedibus antennisque flavis.
Habitat in America, *chr. vitellinæ ſimilis.* Rolander. co-

cerasi. 13. Chr. livida, antennarum apicibus, oculisque nigris. *Fn. ſuec.* 570. *

Habitat in pruni padi *foliis, quæ cribri inſtar perforat ſubtus latens larva, depreſſa, viridis, jetoſa.* T. Bergman.

Magnitudo *cimicis lectularii*; thoracis *margo anterior nigricans.*

padi. 14. Chr. nigra, elytris apice lividis. *Fn. ſuec.* 813.* *Habitat in* prunо pado, *pulice major.*

minutiſſima. 15. Chr. nigra opaca. *Habitat in* Suecia, *pulice quadruplo minor, elytris abdomine brevioribus.*

armoraciæ. 16. Chr. nigra nitidiſſima ſubcæruleſcens, ſubtus nigra. *Fn. ſuec.* 515. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 66. *mant. inſ.* 1. *p.* 73. *n.* 84. *Herbſt apud Fuesslı arch. inſ.* 7. *t.* 44. *f.* 7. c. d.

Degeer inſ. 5. *p.* 322. *n.* 25. Chryſomela plantaginis.

Habitat in plantagine, cochlearia armoracia, ranunculo aquatili, flammula.

melanoſtoma. 254. Chr. oblonga nigra, capite, thorace elytrisque rubris: illo poſterius puncto oreque, illo utrinque puncto, dorſo ſcutelloque, his ſutura nigris. *Muſ. Lesk. p.* 14.

carbonaria. 255. Chr. nigra, elytris lævissime punctatis: punctorum ſeriebus novem. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 285. *Habitat in* Europa.

decempunctata. 256. Chr. nigra, elytris ordinibus punctorum quinque parium. *Muſ. Lesk. p.* 14. *n.* 266. *Habitat in* Europa.

luteicornis. 257. Chr. nigra, antennis luteo-rufeſcentibus,

elytris lævissime punctatis: punctorum seriebus novem; margine inflexo testaceo. *Mus. Lesk. p.* 14. *n.* 275.
Habitat in Europa.

subpunctata. 258. Chr. nigra æneo nitens, elytris lævissime punctatis. *Mus. Lesk. p.* 14. *n.* 276.
Habitat in Europa.

erythromelas. 259. Chr. atra, elytris lævibus punctatis margine sanguineis. *Mus. Lesk. p.* 14. *n.* 270.
Habitat in Europa, *an distincta satis a limbata?*

cyanomelas. 260. Chr. violacea, capite, thorace elytrisque nigris: his profunde punctatis, antennarum basi rubra. *Mus. Lesk. p.* 14. *n.* 265.
Habitat in Europa.

dichroa. 261. Chr. oblonga violacea, thorace, elytris tibiisque viridibus. *Mus. Lesk. p.* 14. *n.* 280.
Habitat in Europa.

elegans. 262. Chr. oblonga violaceo-ænea, capite, thorace, elytris profunde punctatis pedibusque viridi-æneis. *Mus. Lesk. p.* 14. *n.* 281.
Habitat in Europa.

ruffica. 104. Chr. cyanea antennarum basi, thorace pedibusque rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 71. *n.* 55.
Habitat in Russia *meridionali, statura chr. polygoni, at paulo minor.*

brunnea. 105. Chr. testacea, elytris sutura lineolaque media fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 123. *n.* 44. *mant. inf.* 1. *p.* 71. *n.* 56.
Habitat in nova Hollandia, *parva.*

quin-

quinquemaculata. 252. Chr. oblonga teſtacea, elytris punctis profundis ſtriatis: lingulis maculis quinque nigris notatis. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 260.
Habitat in Europa.

erythroptera. 253. Chr. ænea, capite thoraceque fuſco-æneis, elytris rubris baſi gibbis. *Muſ. Lesk. p.* 13. *n.* 257.

cerealis. 17. Chr. aurata, thorace lineis tribus, coleoptrisque quinque cæruleis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 57.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 262. *n.* 14. Chryſomela aurea.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 3.
Habitat in Europæ *magis auſtralis ſegete*, montis vogeſi *ſpartio ſcoparie*, *mediæ magnitudinis*, *ſubtus obſcure violacea*, *rarius tota purpurea.*

americana. 106. Chr. viridi-ænea, elytris ſtriis quinque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 58.
Habitat in America & Galliæ *auſtralis lavandula*, *verticis macula coccinea.*

feſtiva. 107. Chr. nigro-ænea, elytris lineis tribus futuraque anteriore flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 59.
Habitat in America.

faſtuoſa. 18. Chr. aurea, coleoptris lineis tribus cæruleis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 71. *n.* 60. *Scop. ent. carn.* 232. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 4. *p.* 53. *n.* 15. *t.* 23. *f.* 6.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 261. *n.* 11. Chryſomela viridis nitida, &c.
Gron. zooph. 561.
Habitat in Europæ *lamio albo*, *urticis*, *rubis.*

glo-

glorio-sa. 108. Chr. viridis nitida, elytris linea cærulea. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 497. *mant. inf.* 1. *p.* 71. *n.* 61.
Habitat in Italia, *festuosæ affinis, at duplo major.*

specio-sa. 19. Chr. viridi-sericea, elytris lineis duabus aureis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 49. *mant. inf.* 1. *p.* 71. *n.* 62. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 54. *n.* 16. *t.* 23. *f.* 7?
Scop. ent. carn. 231. Chrysomela speciosissima.
Hollar inf. t. 6. *f.* 2.
Habitat in Germaniæ *silvis.*
Elytrorum *lineæ anterius & posterius cocunt.*

cyanea. 109. Chr. thorace rotundato cylindrico, corpore cyaneo nitido, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 50. *mant. inf.* 1. *p* 71. *n* 63.
Habitat in insulis, Americæ *meridionali oppositis.*

nitida. 110. Chr. thorace rotundato viridi-æneo, antennis cyaneis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 71. *n.* 64.
Habitat in Siam, *auratæ affinis, at paulo major.*

aurata. 111. Chr. thorace rotundato cyaneo, elytris aureis: margine cyaneo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 51. *mant. inf.* 1. *p.* 71. *n.* 65.
Habitat in America *boreali.*

limbata. 112. Chr. atra, coleoptrorum limbo sanguineo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 52. *mant. inf.* 1. *p.* 71. *n.* 66.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 260. *n.* 9. Chrysomela nigro-cærulea, &c.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 20.
Habitat in Europa *magis australi.*

hypochæridis. 21. Chr. aurata, antennis nigris, elytris abbreviatis. *It. scan.* 210. *Fn. suec.* 516.
Scop.

Scop. ent. carn. 193. Bupreſtis ſyngeneſiæ.
Habitat in hypochæridis maculatæ *floribus.*

vulgatiſſima. 22. Chr. oblonga cærulea, antennis baſi ferrugineis. *Fn. ſuec.* 517. * *Scop. ent. carn.* 223. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 79. *mant. inſ.* 1. *p.* 75. *n.* 104.
Degeer inſ. 5. *p.* 317. *n.* 23. Chryſomela cærulea betulæ.
Habitat in Europa, *potiſſimum in ſalice.*

vitellinæ. 23. Chr. viridi-cærulea. *Fn. ſuec.* 519. * *Scop. ent. carn.* 224.
Fn. ſuec. 426. Chryſomela ænei coloris.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 130. *n.* 78. *mant. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 103. Chryſomela oblonga viridi ænea.
Degeer inſ. 5. *p.* 323. *n.* 27.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 3. *p.* 5. *t.* 1.
Habitat in Europæ *ſalicibus glabris populoque, vulgatiſſima paulo minor, folia ſubtus conſumens.*
Larvæ, *dum paſcuntur, per lineas parallelas diſpoſitæ.*

polygoni. 24. Chr. cærulea, thorace, femoribus anoque rufis. *Fn. ſuec.* 520. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 54.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 283. *n.* 4.
Degeer inſ. 5. *p.* 322. *n.* 26.
Raj. inſ. 100. *n.* 4.
Reaumur inſ. 3. *t.* 17. *f.* 14. 15.
Schaeff. ic. t. 51. *f.* 5. & *t.* 161. *f.* 4. & *t.* 173. *f.* 4.
Habitat in polygono aviculari, rumice acetoſa, *pedibus interdum rufis, ut tamen plantæ nigræ ſint.*
Femina *ovis gravida ultra coleoptra ventricoſa.*

18-guttata. 113. Chr. elytris fuſcis: punctis octo pallidis; qui-

quibuſdam connexis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 53.
Habitat in nova Hollandia.

pallida. 25. Chr. flaveſcens, oculis nigris. *Fn. ſuec.* 521. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 44.
Fn. ſuec. 1. *n.* 423. Chryſomela pallido-griſea.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 243. Chryſomela pallida, oculis nigris.
Habitat in Europæ *ſalicibus.*

ſtriata. 114. Chr. atra nitida, elytris ſtriatis teſtaceis, ſutura atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 45.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *gibba*; *mediæ magnitudinis.*

notata. 115. Chr. thorace fulvo: punctis quatuor nigris, elytris pallidis nigro-variis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 46.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *pallida, capite fulva, ſtatura pallidæ.*

rumicis. 116. Chr. thorace fulvo: punctis quatuor nigris, elytris fulvis: ſutura vittaque media nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 47.
Habitat in Hiſpaniæ *rumice ſpinoſo, ſtatura & magnitudine pallidæ.*

vulpina. 117. Chr. atra, elytris margine, punctis quatuor apiceque nigro-maculato albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 48.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura notatæ.*

craſſicornis. 118. Chr. flaveſcens, elytris maculis duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 49.
Habitat in nova Hollandia.

ſta-

ſtaphy-læa. 26. Chr. obſcure teſtacea tota. *Fn. ſuec.* 518. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 29.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 263. *n.* 15. Chryſomela ſupra rubro-cuprea, &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 294. *n.* 3. *t.* 8. *f.* 24. Chryſomela cuprea.
Habitat in Europæ *pratis.*

ſervida. 119. Chr. teſtacea, elytris æneis: margine teſtaceo *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 30.
Habitat in inſula Java.

polita. 27. Chr. thorace aurato, elytris rufis. *Fn. ſuec.* 522. * *Scop. ent. carn.* 229.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 119. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 31. Chryſomela ovata: thorace aurato, elytris teſtaceis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 257. *n.* 2.
Degeer inſ. 5. *p.* 294. *n.* 2. *t.* 8. *f.* 2. 3.
Schaeff. ic. t. 65. *f.* 9.
Habitat in ſalice, populo.

lurida. 28. Chr. nigra, elytris caſtaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 33.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 258. *n.* 3.
Habitat in Galliæ *vite*, Germania, *ſtatura politæ, at dimidio minor.*

lunata. 120. Chr. ferruginea, elytris margine, vitta lunulaque media flavicantibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 32.
Habitat - - - *ſtatura & magnitudine politæ.*

clavi-cornis. 29. Chr. nigra, elytris abdomine nigris, antennis clavatis.
Habitat in America, *chr. populi facie.* Rolander.

tre-

tremula. 121. Chr. cæruleſcens, elytris teſtaceis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 69. *n.* 28.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 256. *n.* 2.
Habitat in Europæ *populo, chr. populi duplo minor.*

populi. 30. Chr. thorace cæruleſcente, elytris rubris apice nigris. *Fn ſuec.* 523. *
Scop. ent. carn. 228. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 27. *Pod. inſ.* 27. Chryſomela 7-punctata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 256. *n.* 1.
Degeer inſ. 5. *p.* 290. *n.* 1. *t.* 8. *f.* 16.
Liſt. ſcar. angl. 381. *n.* 6.
Merian. inſ. eur. 14. *t.* 27.
Albin. inſ. 63. *f.* 6.
Schaeff ic. t. 21. *f.* 9. & *t.* 9. & *t.* 47. *f.* 4. 5.
Habitat in populo tremula, *folia ſæpe devaſtans, quæ excorticata rudis vaſis relinquit.*
Larva *fœtens, hexapus, albo nigroque varia ex tuberculorum duplici ſerie humorem lacteum fundit.*

viminalis. 31. Chr. nigra, thorace rufo bimaculato, elytris rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 39.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 590. *n.* 31. *Fn. ſuec.* 524. * Chryſomela ovata nigra, thorace bimaculato, elytris teſtaceis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 265. *n.* 18. Chryſomela rubra, &.
Scop. ent. carn. 233. Chryſomela ſignata.
Degeer inſ. p. 297. *n.* 6.
Habitat in Europæ *ſalicibus, aliquando cum hæmorrhoidali copia conjuncta.*

cyanipes. 122. Chr. rufa, elytris punctis poſteriusque cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 40.
Habitat in nova Hollandia.

cya-

cyanicornis. 123. Chr. rufa, thorace macula dorsali punctisque duobus, coleoptris maculis octo cyaneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 32. *mant. inf.* 1. *p.* 59. *n.* 41.
Habitat in nova Hollandia.

10-punctata. 32. Chr. thorace rubro posterius nigro, elytris rufis: punctis subquinis nigris. *Fn. suec.* 525.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 33. *mant. inf.* 1. *p.* 69. *n.* 42.
Fn. suec. 1. *n.* 436. Chrysomela supra rufa, thorace punctis nigris duobus, elytrorum pluribus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 258. *n.* 4. Chrysomela rubra, &c.
Degeer inf. 5. *p.* 294. *n.* 4. *t.* 8. *f.* 25. Crysomela rufipes.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 13.
β) Chrysomela rubra, elytro singulo maculis quinque nigris. *Fn. suec.* 1. *n.* 1354.
Habitat in Europæ *populo*, *punctorum in elytris numero varians.*

sexpunctata. 124. Chr. nigra, thorace rufo: punctis duobus, elytris rufis: punctis tribus nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 70. *n.* 43.
Habitat in Europæ *plantis*, *decempunctatæ affinis.*

variolosa. 33. Chr. nigra, elytris rubris: punctis sparsis impressis cæruleis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 122. *n.* 39. *mant. inf.* 1. *p.* 70. *n.* 50.
Habitat in Africa.

lapponica. 34. Chr. thorace viridi, elytris rubris, fascia inter punctum maculamque lunatam cærulea. *Fn. suec.* 536.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 123. *n.* 40. *mant. inf.* 1. *p.* 70. *n.* 51.
Degeer inf. 5. *p.* 302. *n.* 12. *t.* 9. *f.* 3. Chrysomela curvilinea.

Scha-

Schaeff. ic. t. 44. *f.* 2.
Habitat in Europa *boreali*, Saxoniæ *fraxino*, *elytrorum ſutura cærulea.*

undulata. 35. Chr. rufa, elytris faſciis tribus atro-cæruleis undulatis. *Amœn. ac.* 6. *p.* 393. *n.* 14. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 70. *n.* 52.
Habitat in India.

boleti. 36. Chr. nigra, elytris faſciis tribus flavis repandis. *Fn. ſuec.* 527. * *Sulz. hiſt. inſ. t.* 3. *f.* 9. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 34. *Uddm. diſſ.* 4. *f.* 3. Dermeſtes ater nitens, elytris nigris: faſciis duabus flavis undulatis.
Scop. ent. carn. 247. Coccinella faſciata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 337. *t.* 6. *f.* 3. *Schaeff. elem. t.* 58. *ic. t.* 77. *f.* 6. Diaperis.
Degeer inſ. 5. *p.* 49. *n.* 9. *t.* 3. *f.* 3. Tenebrio boleti.
Habitat in boletis *arboreis.*

novem-vittata. 125. Chr. thorace nigro æneo, coleoptris flavis: vittis novem fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 35.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magnitudine chr. boleti.*

ſtolida. 126. Chr. ferruginea, capite thoraceque flavis, elytris variegatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 36.
Habitat in America.

nigricornis. 127. Chr. nigro-ænea, capite thoracis lateribus, elytrorumque macula duplici baſeos ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 69. *n.* 37.
Habitat in nova Hollandia.

col-

collaris. 37. Chr. violacea, thoracis marginibus albis: puncto nigro. *Fn. suec.* 528. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 69. *n.* 38.
Degeer inf. 5. *p.* 302. *n.* 13.
Schaeff. ic. t. 52. *f.* 11. 12.
Habitat in Europæ & *borealis* Americæ *salicibus.*

sanguinolenta. 38. Chr. atra, elytris margine exteriori sanguineis. *Fn. suec.* 529. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 53. *mant. inf.* 1. *p.* 71. *n.* 67.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 259. *n.* 8. *t.* 4. *f.* 8. Chrysomela nigro-cærulea, &c.
Degeer inf. 5. *p.* 298. *n.* 7. *t.* 8. *f.* 26. Chrysomela rubro-marginata.
Scop. ent. carn. 203. Eupreſtis ſanguinolenta.
Sulz. hiſt. inf. t. 3. *f.* 10.
Schneff. ic. t. 21. *f.* 15.
Habitat in Europæ *ſalicetis.*

marginata. 39. Chr. nigro-ænea, elytris margine luteis. *Fn. ſuec.* 529. * *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 54. *mant. inf.* 1. *p.* 71. *n.* 68.
Degeer inf. 5. *p.* 303. *n.* 14.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 19.
Habitat in Europæ *pratis apricis.*
Elytra *ſtriato-punctata.*

aucta. 128. Chr. thorace cyaneo nitido, elytris punctatis cyaneis: margine rubro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 72. *n.* 69.
Habitat Dreſdæ, *magnitudine & ſtatura marginatæ.*

marginella. 40. Chr. nigro-cærulea, thorace elytrisque margine luteis. *Fn. ſuec.* 530. * *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 55. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 70. *Herbſt apud Oeſſli arch. inf.* 4. *t.* 23. *f.* 9.
Degeer inſ. 5. *p.* 304. *n.* 15. Chrysomela ranunculi.

Raj.

Raj. inf. 99.
Habitat in Europæ *ranunculis.*

hanno-veriana. 129. Chr. cyanea, thorace margine, elytris margine vittaque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 120. *n.* 56. *mant. inf.* 1. *p.* 72. *n.* 71. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 54. *n.* 22. *t.* 23. *f.* 10.
β) Chrysomela potentillæ. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 55. *n.* 23. *t.* 23. *f.* 11.
γ) Chrysomela ranunculi. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 55. *n.* 24. *t.* 23. *f.* 11.
Habitat in Germania.

5-punctata. 130. Chr. nigra, thorace rufo, coleoptris testaceis: punctis quinque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 72. *n.* 72.
Habitat Hamburgi, *mediæ magnitudinis.*

scutelleta. 131. Chr. rufa, coleoptris maculis quinque nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 58. *n.* 32. *t.* 23. *f.* 20. c. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 72. *n.* 73.
Habitat in Germania, *parva.*

litura. 123. Chr. rufescens, elytris sutura lineaque longitudinali nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 126. *n.* 57. *mant. inf.* 1. *p.* 72. *n.* 74. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 57. *n.* 30. *t.* 23. *f.* 18. a.
Habitat in Anglia & Germania.

flavicans. 133. Chr. flavescens, elytris viridi-cinereis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 72. *n.* 75.
Habitat Halæ Saxonum, *statura & magnitudine lituræ.*

castanea. 41. Chr. fusca, elytris margine exteriore castaneo. *Amœn. ac.* 6. *p.* 394. *n.* 15.
Habitat Surinami.

ana-

analis. 42. Chr. atra, elytris fuscis: margine exteriore testaceo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 130. *n.* 81. *mant. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 107.
Habitat in Europa, *capta primum ad prædium* Hammarby. Fabricius.

cruenta. 134. Chr. oblonga sanguinea, thorace immaculato, elytris punctis tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 130. *n.* 82. *mant. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 108.
Habitat in India, *coccineæ statura.*

coccinea. 43. Chr. thorace marginato sanguineo: macula nigra, elytris sanguineis: maculis duabus nigris. *Fn. suec.* 532. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 131. *n.* 83. *mant. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 109.
Oddm. diss. 13. Coccinella coleoptris rubris, maculis quatuor nigris.
Degeer inf. 5. *p.* 301. *n.* 10. *t.* 9. *f.* 1. Chrysomela quadrimaculata.
Habitat in Europæ *borealis corylo.*

cruciata. 135. Chr. oblonga rubra, coleoptris cruce nigra.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. *p.* 273.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 75. *n.* 110.
Habitat Halæ Saxonum, *coccinea minor, elytris, &c. marginatis a plurimis congeneribus distans, an forte cum chr. rustica, & cryptocephalis caprea, nymphæa, &c. proprii generis?*

quadrimaculata. 136. Chr. oblonga, thorace testaceo immaculato, elytris testaceis: maculis duabus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 131. *n* 84. *mant. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 111.
Habitat in nemoribus Kilonienſibus.

decemmaculata. 137. Chr. oblonga nigra, coleoptris rubris: punctis decem nigris: duobus communibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 131. *n.* 85. *mant. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 112.
Habitat in America.

20-punctata. 138. Chr. oblonga viridi-ænea thoracis margine albis, elytris albis: maculis decem æneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 131. *n.* 86. *mant. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 112.
Bergstr. nomencl. 1. *p.* 87. *t.* 13. *f.* 10. Chrysomela vicies maculata.
Petiv. gazoph. t. 29. *f.* 5.
Habitat in Anglia.

bipunctata. 139. Chr. testacea, elytris macula fusca. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 127. *n.* 64. *mant. inf.* 1. *p.* 73. *n.* 82.
Habitat ad Caput bonæ spei, *statura philadelphicæ, at major.*

philadelphica. 44. Chr. viridis, elytris flavis: punctis virescentibus oblonginsculis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 127. *n.* 65. *mant. inf.* 1. *p.* 73. *n.* 83.
Degeer inf. 5. *p.* 353. *n.* 6. *t.* 16. *f.* 13.
Petiv. gaz. t. 26. *f.* 11.
Habitat in Pensylvania, *elytrorum futura nunc viridi, nunc flava.*

trimaculata. 45. Chr. cyanea, coleoptris flavis: fascia maculisque duabus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 117. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 11.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 592. *n.* 45. Chrysomela ovata nigra, elytris flavis, maculis tribus oblongis nigris, intermedia futuræ communi.
Habitat in America, *minuta, forma coccinellæ.*

Adonidis. 140. Chr. atra, thoracis margine flavo: puncto nigro, elytris flavis: futura vittaque nigris. *Gallit.* 1. *p.* 463. *n.* 29. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 117. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 12. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 56. *n.* 39. *t.* 23. *f.* 17.
Habitat in Tibiriæ *adonide* & Austria.

dor-

dorsalis. 141. Chr. atra, thoracis margine testaceo: puncto nigro, elytris testaceis: sutura abbreviata atra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 117. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 13.
Habitat in Austria.

clavata. 142. Chr. capite thoraceque ferrugineis, elytris nigris: vitta flavescente. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 14.
Habitat - - - *nigra, mediæ magnitudinis.*

bifasciata. 143. Chr. testacea, elytris æneis nitidis: punctis duobus fasciisque duabus flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 68. *n.* 15.
Habitat in Cayenna, *magna.*

suturalis. 144. Chr. ænea, elytris flavis: sutura vittaque æneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 117. *n.* 1. 2. *mant. inf.* 1. *p.* 68. *n.* 16.
Habitat in America *boreali.*

barbarica. 46. Chr. viridi-ænea, elytris lineis quinque rubris, alis sanguineis.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 16.
Habitat in Barbaria, *inter coccos officinarum lecta, ex cæruleo virescens, subtus ex piceo ænea.*

Lineola. 47. Chr. flava, coleoptris punctis undecim lineisque duabus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 126. *n.* 58. *mant. inf. p.* 72. *n.* 76.
Habitat in America, *pulicis magnitudine, capite & thorace pallidis, oculis nigris.* Brunniche.

æstuans. 48. Chr. ferruginea, elytris maculis quatuor flavicantibus difformibus. *Gron. zooph.* 565.
Habitat in America, *coccinellæ maximæ magnitudine, elytris glabris obsolete punctato-striatis.*

sacra. 49. Chr. supra rufa, thoracis linea, punctis duobus, elytrorumque sutura nigris. *Mus. Lud. Ulr.* 40. * *Fabr. Sp. ins.* 1. *p.* 126. *n.* 59. *mant. ins.* 1. *p.* 72. *n.* 77.
Habitat in Palæstina, *alis sanguineis.*

14-punctata. 94. Chr. testacea, coleoptris flavis: punctis septem nigris; duobus communibus. *Fabr. Sp. ins.* 1. *p.* 117. *n.* 13. *mant. ins.* 1. *p.* 68. *n.* 17.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 599. Chrysomela cylindrica, femoribus posticis incrassatis dentatis, thorace rufo, coleoptris flavis punctis XIV nigris.
Habitat in India, *bipunctatæ similis, at major.*

obscura. 96. Chr. nigra, thorace rotundato angustiori, pedibus posterioribus elongatis. *Fabr. Sp. ins.* 1. *p.* 127. *n.* 63. *mant. ins.* 1. *p.* 73. *n.* 81.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 599. *Fn. suec.* 561. * Chrysomela subcylindrica, thorace pedibusque nigris.
Degeer ins. 5. *p.* 336. *n.* 40. Chrysomela nigro-quadrata.
Habitat in Europæ *plantis, thorace gibbo, elytris angustiore.*

violacea. 145. Chr. violacea, elytris lineis quatuor virescentibus. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 270.
Schaeff. ic. t. 21. *f.* 10.
Habitat æstate gregaria in Europæ *salicibus, chr. alni major, ceterum cerceali similis.*

olivacea. 146. Chr. æneo olivacea, thoracis marginibus lateralibus crassis, elytris punctato-striatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 272.
Habitat in Germaniæ *plantis, staphyleæ statura & magnitudine nitida, punctorum excavatorum in elytris seriebus* 9.

ster-

sternicornis. 147. Chr. violacea, sterno porrecto. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 274. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in India, *scarabæi vernalis magnitudine, punctis plurimis in thorace & elytris excavatis.*

globosa. 148. Chr. elytris nigris, thorace sanguineo, pedibus rufo-fuscis. *Thunb. nov. act. Upsal.* 4. *p.* 11. *n.* 18.
Habitat in Suecia, *pediculo duplo major, globosa, nigra.*

hollandica. 149. Chr. supra ænea, elytris punctatis, subtus nigra, cinereo-tomentosa. *Thunb. nov. act. Upsal.* 4. *p.* 11. *n.* 19.
Habitat in Hollandia Sueciæ, *statura & magnitudine chr. vitellinæ.*

undata. 150. Chr. elytris testaceis: punctis fasciisque duabus nigris, capite thoraceque testaceis. *Thunb. nov. act. Upsal.* 4. *p.* 12. *n.* 20.
Habitat Upsaliæ, *pallidæ statura & magnitudine, subtus testacea.*

bipustulata. 151. Chr. elytris nigris: apicis macula flava, capite thoracisque lateribus flavis. *Thunb. nov. act. Upsal.* 4. *p.* 13. *n.* 21.
Habitat in Suecia, *pediculo duplo major, nigra, glabra, subdepressa.*

gibba. 152. Chr. oblonga, elytris brunneis, capite thoraceque fuscis. *Thunb. nov. act. Upsal.* 4. *p.* 14. *n.* 24.
Habitat Upsaliæ, *magnitudine vulgatissimæ, subdepressa.*

gigas. 153. Chr. tota cyanea, oculis ex luteo fuscis, elytris glaberrimis. *Herbst apud Fuessli arch. ins.* 4. *p.* 51. *n.* 2. *t.* 23. *f.* 2.
Habitat in India.

Chrysomela vi.. 154. Chr. nigra nitida, thoracis fascia duplici & margine nigris, elytris luteis: macula, vitta interrupta, punctisque duobus nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 52. *n.* 4. *t.* 23. *f.* 4. *Habitat - - - ultra dimidium pollicem longa, fascia thoracis priore dentata.*

indica. 155. Chr. nigra, abdomine luteo, elytris subdiaphanis fuscis: fasciis tribus luteis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 52. *n.* 5. *t.* 23. *f.* 5. *Habitat in* India.

lomata. 156. Chr. nigra, capite, thorace, elytrisque cyaneis, his obsolete punctatis margine sanguineis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 1. *p.* 54. *n.* 20. *t.* 23. *f.* 8. *Habitat in* Germania, *marginatæ affinis.*

centaura. 157. Chr. viridi-aurea, thorace elytrisque rubris punctatis, antennis nigris, tarsis fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 56. *n.* 27. *t.* 23. *f.* 15. *Habitat* Berolini, *ultra* 2 *lineas longa.*

taraxaconis. 158. Chr. rubro aurea, subtus viridi-aurea, elytris punctato-striatis, antennis nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 56. *n.* 28. *t.* 23. *f.* 16. *Habitat* Berolini *in taraxacone.*

exilis. 159. Chr. nigra, capite & thorace glaberrimis pedibusque fulvis, elytris punctis fuscis seriatis maculisque duabus nigris confluentibus. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 57. *n.* 31. *t.* 23. *f.* 19. b.

unicolor. 160. Chr. livida, elytris glabris: punctis sparsis excavatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 7. *p.* 161. *n.* 56. *t.* 44. *f.* 1. *Habitat in* America, *maxima.*

gri-

griſea. 161. Chr. ex viresſcente griſea ſubvilloſa, pedibus antennisque flaveſcentibus. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 7. *p.* 161. *t.* 44. *f.* 2. a. b.
Habitat Berolini, *vix lineam ſuperans.*

rubi. 162. Chr. anguſta chalybea, elytris glabris. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 4. *p.* 562. *n.* 59. *t.* 44. *f.* 4. e. f.
Habitat Berolini.

cacaliæ. 163. Chr. virens, elytris ſtria longitudinali ſuturaque cæruleis, alis rubris. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 7. *p.* 162. *n.* 62. *t.* 45. *f.* 2.
Habitat in Auſtria.

bulgarenſis. 164. Chr. atra, elytris nigro-æneis punctatis, unguiculis rubris. *Schranck inſ. auſtr. p.* 70. *n.* 127. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 4. *p.* 55. *n.* 25. *t.* 23. *f.* 13.
Habitat in Auſtria.

binotata. 165. Chr. teſtacea, elytris baſi ferrugineis. *Mull. ſn. fridrichsd. p.* 8. *n.* 73.
Habitat in Dania.

Fridrichsdalenſis. 166. Chr. thorace macula nigra, elytris ſanguineis immaculatis, abdomine nigro. *Mull. ſn. fridr. p.* 8. *n.* 74. *prodr. zool. dan. p.* 81. *n.* 885. *Schaeff. ic. t.* 194. *f.* 4.
Habitat in Europa *boreali.*

ſimilis. 167. Chr. nigro-violacea, thorace lateribus, antennisque baſi rubris. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 81. *n.* 880.
Habitat in Dania.

ori-

Huc referas quoque Chryſomelam bimaculatam. *Schaeff. ic. inſ. t.* 51. *f.* 7. & *lit.* M. *t.* 21. *f.* 1. 2.

orichalcea. 168. Chr. nigra, supra ænea, elytris punctis striatis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 82. *n.* 889. *Habitat in* Dania.

grossa. 169. Chr. atra, subtus violacea, tarsis spongiosis subtus fuscis *Mull. zool. dan. prodr. p.* 81. *n.* 875. *Schaeff. ic. t.* 126. *f.* 1. *Habitat in* Dania.

punctata. 170. Chr. violacea, elytris punctato-striatis, ano rubro. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 81. *n.* 890. *Habitat in* Dania.

obtusa. 181. Chr. violacea, thorace pedibusque rufis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 82. *n.* 895. *Habitat in* Dania.

thoracica. 172. Chr. violacea, thoracis margine laterali dilatato, elytris punctato-striatis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 82. *n.* 898. *Habitat in* Dania.

bilineata. 173. Chr. viridi-aurea, thorace anterius excavato, elytrorum linea duplici cærulea. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 83. *n.* 904. *Act. nidr.* 4. *p.* 8. *t.* 16. *f.* 5. *Habitat in* Scandinavia.

serotina. 174. Chr. nitida rufa, oculis nigris, tibiis posterioribus arcuatis. *Mull. prodr. zool. dan. p.* 83. *n.* 905. *Habitat in* Dania.

cærulea. 175. Chr. cærulea, thorace violaceo. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 259. *n.* 6. *Habitat in* Gallia.

atra-

atrata. 176 Chr. atra, alis sanguineis. *Geoffr. inf. par.* 1. 259. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

decem-striata. 177. Chr. viridis nitida, striis decem cupreis, punctorum serie duplici divisis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 261. *n.* 13.
Habitat in Gallia.

ruficauda. 178. Chr. viridi-ænea obscura nitida, abdominis lateribus, ano alarumque margine rubris. *Degeer inf.* 5. *p.* 305. *n.* 17.
Habitat - - -

viridula. 179. Chr. viridis aurata nitida, thorace anterius æquali, abdomine supra toto nigro. *Fn. suec.* 1. *n.* 421. 2. *n.* 520. B.
Goed. inf. 1. *t.* 45.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 261. *n.* 11.
Degeer inf. 5. *p.* 311. *n.* 19.
Habitat in Europa.

amethystina. 180. Chr. supra ex cæruleo violacea, subtus ex violaceo viridis, punctis excavatis sparsis.
Degeer inf. 5. *p.* 316. *n.* 22.
Habitat - - - *thorace amplo, antennis brevioribus nigris.*

longicornis. 181. Chr. oblonga, thorace teretiusculo, supra ex griseo fusca nitida, subtus nigra capite nigro.
Degeer inf. 5. *p.* 325. *n.* 29. *t.* 9. *f.* 35.
Habitat in Europa, *antennis longis.*

cruentata. 182. Chr. nigra, elytris glabris: fasciis transversis undulatis maculisque rubris.
Degeer inf. 5. *p.* 350. *n.* 2. *t.* 16. *f.* 9.
Habitat in America *australi.*

hæ-

hæmoſtata. 183. Chr. capite thoraceque viridi-æneis obſcuris, elytris nigris: maculis plurimis rubris punctisque excavatis.
Degeer inſ. 5. p. 350. n. 3. t. 16. f. 10.
Habitat in America *auſtrali.*

fuliginoſa. 184. Chr. fuſca depreſſa, thorace elytrisque griſeo-fuſcis, antennis nigris.
Degeer inſ. 5. p. 354. n. 8. t. 16. f. 15.
Habitat Surinami.

aſclepiada. 185. Chr. obſcure cærulea nitida, antennis nigris, thoracis punctis ſparſis, elytrorum lineatis. *Pall. it.* II. *app. n.* 69.
Habitat ad Volgam & Irtin Sibiriæ *in Aſclepiada.*

ſapphirina. 186. Chr. cyanea nitida, ore oculisque rubris, antennis nigris. *Forſt. nov. inſ. gen. p.* 19. *n.* 19.
Habitat - - - ſanguinolenta triplo major, thorace elytrisque punctis minutiſſimis conſperſis.

anglica. 187. Chr. atro-cærulea, elytris nigro-æneis ſtriato-punctatis, alis rubris. *Forſt. nov. inſ. gen. p.* 20. *n.* 20.
Habitat in Angliæ *hypericone perforato, faſtuoſæ magnitudine.*

rhois. 188. Chr. ferruginea, capite, thorace & ſtriis aliquot elytrorum pallidis. *Forſt. nov. inſ. gen. p.* 21. *n.* 21.
Habitat in Americæ *ſeptentrionalis rhoe glabro, politæ magnitudine.*

novebo-racenſis. 189. Chr. thorace rufo: diſco punctis nigris, elytris rufis: ſutura, punctis lineolisque nigris.
Forſt. nov. inſ. gen. p. 22. *n.* 22.
Habitat in Noveboraco, *habitu chr. populi, magnitudine fere politæ.*

ver-

vernalis. 190. Chr. nigra, capite, thorace, elytris pedibusque olivaceis, elytris stria longitudinali & futura nigra. *Forst. nov. inf. gen. p.* 23. *n.* 23.
Habitat in Anglia, *primo vere in arena conspicua, magnitudine & habitu chr. vitellinæ.*

frontalis. 191. Chr. nigra, capite antennarum basi, elytrorum margine & pedibus ferrugineis. *Forst. nov. inf. gen. p.* 24. *n.* 24.
Habitat in America *septentrionali, mediæ magnitudinis.*

sisymbrii. 192. Chr. capite atro, thoracis elytrorumque marginibus undique sanguineis. *Lepechin it.* I. *p.* 10. *t.* 4. *f.* 16.
Habitat in Russiæ *Sisymbrio Sophia.*

Lepechini. 193. Chr. capite cæruleo, thorace elytrisque rubris: fasciis duabus cæruleis. *Lepech. it.* I. *p.* 29. *t.* 4. *f.* 7.
Habitat in Russia *australi.*

rubicunda. 194. Chr. atra, thorace elytrisque rubicundis, incisuris abdominis albis. *Lepech. it.* I. *p.* 311. *t.* 20. *f.* 3.
Habitat in Russiæ *australis polygono frutescente.*

distincta. 195. Chr. obscure viridis, thoracis elytrorumque limbo interrupto flavescente. *Lepech. it.* I. *p.* 312. *t.* 20. *f.* 6.
Habitat in Russia *australi.*

quadripunctata. 196. Chr. capite nigro, thorace nigro, margine rubro, elytris miniatis: punctis quatuor nigris. *Lepech. it.* II. *p.* 208. *t.* 11. *f.* 20.
Habitat in Sibiria.

menthæ. 197. Chr. nigro-ænea nitida. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.* 63. §. 5.

Ha-

Habitat in mentha aquatica ; *an propria species ?*

pruni. 198. Chr. nigra, capite, thorace, elytrorumque apicibus rufis. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.* 63. §. 6.
Habitat in pruno.

cognata. 199. Chr. cærulea, pedibus nigris, ano supra, primisque antennarum articulis fulvis. *Herbst apud Fuesslii arch. inf.* 4. *p.* 58. *n.* 37.
Habitat Berolini, *statura & magnitudine chr. vitellinæ, ceterum hæmorrhoidali affinis.*

erythropus. 200. Chr. viridis nitens granulata : elytris obtuse mucronatis, antennis fulvis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 59. *n.* 38.
Habitat Berolini *in salicibus, statura & magnitudine chr. vitellinæ.*

raphani. 201. Chr. viridis nitens, elytris granulatis, antennarum ultimis articulis tarsisque nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 59. *n.* 42. *t.* 23. *f.* 21.
Habitat Berolini *in armoracia.*

æroſa. 202. Chr. nigra cærulescenti irrorata, subtus fusca, antennis pedibusque nigris, punctorum elytris seriebus septem. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 60. *n.* 43. *t.* 23. *f.* 22.
Habitat in Pomerania.

melanopus. 203. Chr. cærulea subtus fusca, antennis pedibusque nigris, elytrorum punctis sparsis. *Herbst apud Faessli arch. inf.* 4. *p.* 60. *n.* 44.
Habitat Berolini, *æroſæ affinis.*

japonica. 248. Chr. testacea, thorace livido : margine posteriori punctisque 5 nigris, elytris nigro cærulcis. *Hornstedt Schrift. der berl. Naturf.* 8. 1. *t.* 1. *f.* 1.
Ha-

Habitat in Japonia, *chr. alni magnitudine.*

malaccensis. 249. Chr. capite, thorace pedibusque ferrugineis, elytris nigro-æneis: margine interiore ferrugineo. *Hornst. Schrift. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 2. *t.* 1. *f.* 9.
Habitat in Malacca, Sumatra & Java, *marginatæ magnitudine.*

crassipes. 263. Chr. testacea, oculis nigris, elytris vix punctatis, femoribus crassis. *Mus. Lesk. p.* 14. *n.* 277.
Habitat in Europa.

janthina. 264. Chr. oblonga, fusco ænea, elytris violaceis: punctorum ordinibus novem, tibiis compressis rubis. *Mus. Lesk. p.* 14. *n.* 286.
Habitat in Europa.

bimaculata. 265. Chr. oblonga rufa, elytris testaceis, punctato-striatis: maculis, duabus oblongis obsolete fuscis. *Mus. Lesk. p.* 15. *n.* 287.

** *saltatoriæ, femoribus posterioribus incrassatis*: Alticæ.

flava. 204. Chr. flava, thorace nigro punctato, elytris violaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 131. *n.* 87. *mant. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 113.
Fabr. syst. ent. app. p. 821. Altica thoracica.

caroliniana. 205. Chr. flavescens, thorace punctis duobus, coleoptris vittis quinque flavis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 75. *n.* 114.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 156. *n.* 38. Crioceris caroliniana.
Habitat in America *boreali.*

ole-

olera-cea. 51. Chr. viresceuti-cærulea. *Fn. ſuec.* 524. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 94. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 126.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 245. *a.* 1. *Scop. ent. carn.* 212. Altica oleracea.
Degeer inſ. 5. *p.* 344. *n.* 49.
Habitat in Europæ *plantarum, præſertim tetradynamarum, cotyledonibus, quas miſere deſtruit, niſi forte ante ſeminationem immerſis ſeminibus, cinneribus herbarum, potiſſimum tabaci, pellenda.*

albi-collis. 206. Chr. thorace pallido, elytris æneis: maculis duabus faſciaque aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 95. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 127.
Habitat in nova Hollandia.

fulvi-collis. 207. Chr. thorace rufeſcente, elytris pallidis: ſutura maculisque duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 96. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 128.
Habitat - - - *mediæ magnitudinis, palleata, capite pedumque geniculis nigris.*

bicolor. 52. Chr. rufa, elytris femoribusque poſterioribus cæruleis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 192. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 124.
Degeer inſ. 5. *p.* 357. *n.* 12. *t.* 16. *f.* 20.
Habitat in America.
Corpus *colore & magnitudine chr. polygoni.*

fame-lica. 208. Chr. flaveſcens, elytris viridibus: margine pallida. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 123.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 132. *n.* 91. Chryſomela marginata.

leuco-picta. 209. Chr. nigra, thorace albo, elytris obſcure violaceis: punctis quatuor albis; interiori lineari. *Fabr. mant.* 1. *p.* 76. *n.* 122.
Habitat in Cayenna, *mediæ magnitudinis.*

qua-

quadri-fasciata. 210. Chr. ferruginea, elytris ſtrigis quatuor albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 121.
Habitat in Cayenna, *magna.*

cincta. 211. Chr. nigra, elytris viridi-æneis: margine punctisque duobus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 90. *mant. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 119.
Habitat in Luſitania, *magna.*

equeſtris. 212. Chr. thorace elytrisque albis: margine baſeos faſciaque media ferrugineis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 76. *n.* 118.
Habitat in America, *magna.*

quadri-guttata. 213. Chr. ferruginea, thorace albo, elytris atris: punctis quatuor albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 89. *mant. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 117.
Habitat in Cayenna, *biguttatæ affinis.*

biguttata. 214. Chr. ferruginea, thorace elytrorumque maculis duabus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 88. *mant. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 116.
Habitat in America.

glabrata. 215. Chr. thorace pallido: punctis tribus nigris, elytris nigris: vittis duabus albis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 76. *n.* 115.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 156. *n.* 39. Criocceris glabrata.

nobilitata. 216. Chr. ferruginea, elytrorum margine faſciaque albis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 76. *n.* 120.
Habitat in Cayenna, *magna.*

chryſocephala. 53. Chr. atro-cærulea, capite pedibusque quatuor anterioribus luteis. *Fn. ſuec.* 535. *Scop. ent. carn.* 213.
Habitat in Suecia.

hy-

hyoſcyami. 54. Chr. virescenti cærulea, pedibus teſtaceis, femoribus posterioribus violaceis. *Fn. ſuec.* 536.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 97. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 129.
Fn. ſuec. 540. Mordella ovata cærulea nitida, tibiis ferrugineis.
Degeer inſ. 5. *p.* 345. *n.* 51. Chryſomela ovata ſaltatoria, &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 248. 11. Altica cærulea, &c.
Raj. inſ. 98. 9. Capricornus exiguus ſaltatorius.
Habitat in Europæ *hyoſcyamo*, *braſſica*.

quadripuſtulata. 217. Chr. nigra, coleoptris punctis quatuor rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 107. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 139.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 250. *n.* 15.
Habitat in Angliæ, Galliæ *hortis*.

anglicana. 218. Chr. atra, elytris tibiisque pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 106. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 138.
Habitat in Angliæ *plantis*.

dorſalis. 219. Chr. nigra, thorace elytrorumque margine pallidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 135. *n.* 105. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 137.
Habitat in Anglia, *ſtatura atricillæ*, *an varietas?*

atricilla. 55. Chr. nigra, thorace, elytris tibiisque teſtaceis. *Fn. ſuec.* 537. *
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 135. *n.* 104. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 136. Chryſomela ſaltatoria nigra, thorace elytrisque cinereis.
β) Chryſomela melanocephala. *Degeer inſ.* 5. *p.* 348. *n.* 57.
Geoffr. inſ. par. p. 1. 251. *n.* 19.
Habitat in Europæ *plantis*.

erythrocephala. 56. Chr. atro-cærulea, capite geniculisque pedum

dum rufis. *Fn. ſuec.* 538. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 103. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 135. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 246. *n.* 4. Altica nigro-ænea, &c.
Habitat in Europæ *plantis.*

Modeeri. 57. Chr. ænea nitida, elytris apice flavis, pedibus anterioribus tibiisque poſterioribus luteis. *Fn. ſuec.* 539.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 134. *n.* 102. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 134. Chryſomela ſaltatoria viridi-ænea, elytris macula poſtica pedibusque anticis flavis.
Habitat in Europæ *plantis.*

helxines. 58. Chr. viridi-ænea, antennis fuſcis, pedibus teſtaceis. *Fn. ſuec.* 543. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 100. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 132.
Fn. ſuec. 539. Mordella atro-ænea ſubrotunda.
Degeer inſ. 5. *p.* 345. *n.* 52. Chryſomela viridi-aurata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 209. *n.* 14. Altica aurea, pedibus flavis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 12.
Habitat in polygono fagopyro *aliisque.*

exoleta. 59. Chr. ferruginea, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 18. *n.* 143. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 594. *Fn. ſuec.* 541. * Chryſomela ſaltatoria livida, elytris teſtaceis, abdomine capiteque fuſco.
Fn. ſuec. 533. Mordella flava.
Degeer inſ. 5. *p.* 338. *n.* 42.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 250. *n.* 16.
Herbſt apud Fuesslı arch. inſ. 7. *p.* 163. *n.* 63. *t.* 44. *f.* 7. l. m.
Habitat in Europæ *echii floribus, quos conſumit.*

nitidula. 60. Chr. viridis nitens, capite thoraceque aureis, pe-

pedibus ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 134. *n.* 99. *mant. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 131.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 594. *Fn. suec.* 542. * Chrysomela saltatoria, elytris cæruleis, capite thoraceque aureo, pedibus ferrugineis.
Degeer inf. 5. *p.* 346. *n.* 54.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 249. *n.* 13.
Schaeff. ic. t. 87. *f.* 5.
Habitat in Europæ *salice.*

trifasciata. 61. Chr. supra albida, fasciis tribus fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 134. *n.* 101. *mant. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 132.
Habitat in Europæ *plantis, mediæ magnitudinis.* Capitis *fascia una, elytrorum duæ.*

nigripes. 220. Chr. viridi-ænea, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 133. *n.* 98. *mant. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 130.
Habitat in Anglia.

tabida. 221. Chr. pallida oculis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 136. *n.* 113. *mant. inf.* 1. *p.* 78. *n.* 145.
Habitat in Angliæ *plantis.*

brassicæ. 222. Chr. atra, elytris pallide testaceis: margine omni fasciaque media atris. *Fabr. mant.* 1. *p.* 78. *n.* 146.
Habitat in Germaniæ *oleribus, parva.*

nemorum. 62. Chr. elytris flavis: margine omni nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 136. *n.* 114. *mant. inf.* 1. *p.* 78. *n.* 147.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 595. *Fn. suec.* 543. * *Scop. ent. carn.* 215. Chrysomela saltatoria, elytris linea flava, pedibus pallidis.
Fn. suec. 542. Mordella oblonga atra, elytris longitudinaliter in medio flavescentibus.
Degeer inf. 5. *p.* 347. *n.* 55. Chrysomela fasciata. *Geoffr.*

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 247. *n.* 9.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 11.
Habitat in pulmonaria, dentaria, cardamine, *polyphaga.*

atra. 223. Chr. atra nitida, antennarum basi plantisque piceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 137. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 78. *n.* 148.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 247. *n.* 8.
Habitat Hafniæ.

ruſtica. 63. Chr. atra, antennis, pedibus elytrorumque apicibus teſtaceis.
Habitat in Europa, *elytris ſubtiliſſime punctatis.*

pulicaria. 64. Chr. nigra, elytris poſterius macula ferruginea.
Habitat in Europa, *pulicis magnitudine.*

ruſipes. 65. Chr. cærulea obovata, capite, thorace, pedibus antennisque ruſis. *Fn. ſuec.* 545.* *Scop. ent. carn.* 212. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 135. *n.* 108. *mant. inf. p.* 77. *n.* 140.
Degeer inſ. 5. *p.* 343. *n.* 47. *t.* 10. *f.* 11.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 245. *n.* 2.
Shaeff. ic. t. 166. *f.* 5.
β) Chryſomela africana. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 135.
Habitat in Europæ *plantis*, *præſertim malva parviflora* β) *major in* Africa *æquinoctiali.*

fuſcipes. 224. Chr. violacea, capite thoraceque ruſis, pedibus nigris. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 135. *n.* 109. *mant. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 141.
Habitat in Angliæ *plantis*, *an varietas ruſipedis?*

teſtacea. 225. Chr. teſtacea gibba, elytris lævissimis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 136. *n.* 110. *mant. inf.* 1. *p.* 77. *n.* 142.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 250. *n.* 17.
Habitat in Angliæ *plantis.*

faſci-cornis. 66. Chr. cærulea obovata, capite, thorace pedibusque rufis, antennis fuſcis. *Hornſt. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 8. *n.* 9. *t.* 1. *f.* 10.
Habitat in Germania, & Java, *ad rufipedem proxime accedens, at paulo major.*

holſatica. 67. Chr. nigra nitida, elytris apice puncto rubro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 112. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 144.
Habitat in Holſatia *frequens, olera devaſtans.*

hemiſphæ-rica. 68. Chr. ſubborbiculata depreſſa nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 116. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 149. *Degeer inſ.* 5. *p.* 348. *n.* 8.
Habitat in Saxoniæ *corylo.*

ſurinamenſis. 69. Chr. flaveſcens, elytris margine faſciaque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 117. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 150.
Degeer inſ. 5. *p.* 355. *n.* 10. *t.* 16. *f.* 17.
Habitat Surinami.

S. littera. 70. Chr. pallida, elytris nigris: linea longitudinali flexuoſa alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 118. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 151.
Degeer inſ. 5. *p.* 357. *n.* 13. *t.* 16. *f.* 21.
Habitat Surinami.

æquinoctialis. 71. Chr. thorace rubro, elytris violaceis: maculis quatuor albis alternis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 93. *mant. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 115.

De-

Chryſomelæ *ſaltatoriæ plantarum cotyledonibus & tenellis foliis inſidiæ: an inſpectat Chryſomela maculata, Medic. hiſt. nat. Chil. p.* 183. *nitida, interdum cærulcis, in umbellis viſnagæ in provincia* Chilenſi Maulo *habitans, magnitudine?*

Degeer inf. 5. *p.* 356. *n.* 11. *t.* 16. *f.* 19.
Habitat in America *meridionali.*

Lens. 226. Chr. tota caeruleo-nigra, elytris punctatis.
Thunberg nov. act. Upf. 4. *p.* 13. *n.* 22.
Habitat Upfaliæ *glabra, lentis magnitudine.*

exclamationis. 227. Chr. thorace nigro, elytris nigris: maculis quatuor flavis. *Thunb. nov. act. Upf.* 4. *p.* 14. *n.* 23.
Habitat Upfaliæ, *pulice fere minor.*

flavipes. 228. Chr. chalybea, elytris obfolete granulatis, pedibus antennarumque articulis primis luteis.
Herbft apud Fuesslı arch. inf. 4. *p.* 61. *n.* 53.
Habitat Berolini.

pedicularia. 229. Chr. viridi-aurea, granulata fubtus nigra, pedibus antennisque fufcefcentibus: articulis extremis nigris. *Herbft apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 61. *n.* 54.
Habitat Berolini, *vix pediculi magnitudine.*

minima. 230. Chr. ex atro virens, elytris tenerrime punctatis, antennis exortum fufcis, verfus finem nigris. *Herbft apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 61. *n.* 55.
Habitat Berolini, *pulice dimidio minor.*

tamaricis. 231. Chr. capite nigro, thorace flavo: difcis macula nigra, elytris glaberrimis ex fufcefcente nigris. *Herbft apud Fuessli arch. inf.* 7. *p.* 163. *n.* 64. *t.* 45. *f.* 6. g. h.
Habitat in Auftria.

fimbriata. 232. Chr. oblonga, capite, thorace quadripunctato, elytrisque pallide teftaceis linea nigra cinctis, femoribus rufis. *Forft. nov. inf. gen. p.* 25. *n.* 25.

Habitat in America *ſeptentrionali, magnitudine & ſtatura cryptocephali capreæ.*

hudſonia. 233. Chr. atra oblongiuſcula, antennarum baſi ferruginea. *Forſt. nov. inſ. ſp. p.* 26. *n.* 26.
Habitat in America *ſeptentrionali, nitens, magnitudine cryptocephali cyanotæ.*

quadrinotata. 234. Chr. nigra, antennarum baſi flaveſcente, elytrorum maculis quatuor teſtaceis. *Pontoppid. Naturg. Daennem. p.* 204. *t.* 16.
Habitat in Dania.

puſilla. 235. Chr. nigra, antennis pedibusque pallidis. *Mull. prodr. zool. dan. p.* 84. *n.* 923.
Habitat in Dania.

luteola. 236. Chr. lutea, oculis, pectore antenarumque apice nigris. *Mull. prodr. zool. dan. p.* 84. *n.* 924.
Habitat in Dania.

flaveola. 237. Chr. nigra, thorace capiteque ruſo, elytris, antennis pedibusque luteis. *Mull. prodr. zool. dan. p.* 84. *n.* 925.
Habitat in Dania.

latiuſcula. 238. Chr. ex nigro fuſca, tibiis tarſisque ſubluteis. *Mull. prodr. zool. dan. p.* 84. *n.* 926.
Habitat in Dania.

cæruleſcens. 239. Chr. viridi-cærulea nitidiſſima, thorace læviori, antennis pedibusque rufis, femoribus poſterioribus nigris. *Degeer inſ.* 5. *p.* 346. *n.* 53.
Habitat in Europa.

cyanopicta. 240. Chr. thorace punctato vireſcenti-cæruleo, elytris violaceis punctato-ſtriatis, pedibus rufis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 344. *n.* 50.
Habitat in Europa.

ſtria-

striata. 241. Chr. cærulea, capite, thorace, antennis pedibusque rufis, elytris striatis. *Degeer ins.* 5. *p.* 343. *n.* 48.
Habitat in Europa.

ferruginea. 242. Chr. ferruginea, oculis nigris. *Scop. ent. carn. n.* 216.
β) Chrysomela (lurida) fusco-rufa, abdomine oculisque nigris. *Scop. ent. carn. n.* 219.

truncata. 243. Chr. nigra, elytris truncatis apice ferrugineis, pedibus antennisque rufis. *Scop. ent. carn. n.* 218.
Habitat in Carniola.

versicolor. 244. Chr. nigra, elytris nigro-æneis striatis, thorace rubro. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 245. *n.* 3. *t.* 4. *f.* 4. Altica bicolor.
Habitat in Gallia.

ovalis. 245. Chr. nigro-ænea, pedibus nigris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 246. *n.* 5.
Habitat in Gallia.

crucifera-rum. 246. Chr. nigro-ænea oblonga, pedibus nigris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 246. *n.* 6.
Habitat in Galliæ *tetradynamis.*

ochropus. 201. Chr. nigra, pedibus rufis, elytris non striatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 246. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

denigrata. 248. Chr. nigra, thorace elytrisque flavis: oris nigris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 248. *n.* 10.
Habitat in Gallia.

lævigata. 247. Chr. cærulea, elytris punctis sparsis, tibiis ferrugineis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 249. *n.* 12.

pi-

picipes. 266. Chr. viridi-ænea punctata, pedibus piceis; elytris ſpadiceis futuram verſus nigris. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 324.
Habitat in Europa.

concolor. 267. Chr. fuſco-ænea, elytris ſtriatis, antennis pedibusque rufis, femoribus poſterioribus fuſco-æneis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 325.
Habitat in Europa.

crenata. 268. Chr. nigra, elytris æneis: ſtriis crenatis antennarum baſi tibiisque piceis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 331.
Habitat in Europa.

diſcolor. 269. Chr. capite thoraceque nigro, elytris teſtaceo-fuſcis glabris, pedibus quatuor anterioribus tibiisque poſterioribus ſubteſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 332.
Habitat in Europa.

annulata. 270. Chr. fuſco-ænea, elytris ſtriis crenatis, antennarum baſi tibiisque quatuor anterioribus rufis: annulo fuſco-æneo. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 333.
Habitat in Europa.

CRYPTOCEPHALUS. *Antennæ* filiformes.
Palpi quatuor.
Thorax, nec elytra, marginatus.
Corpus ſubcylindricum.

* *palpis æqualibus filiformibus.*
† *maxilla unidentata.*
† *labio integro, cylindrici.*

longipes. 1. Cr. niger obſcurus, elytris pallidis: maculis tribus nigris, pedibus anterioribus elongatis. *Fa-*

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 137. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 1.
Laicharт. inſ. tir. 1. *p.* 166. *n.* 1. Clytra longipes.
Schaeff. ic. t. 6. *f.* 3.
Habitat in Germaniæ, Calabriæ *corylo, ſalice.*

ſexmaculatus. 2. Cr. niger, thorace rubro immaculato, elytris rubris: punctis tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. 138 *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 2.
Habitat in Italia, *quadripunctato paulo major.*

quadripunctatus. 3. Cr. niger, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis brevibus ſerratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1 *p.* 138. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 78. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 79. *Fn. ſuec.* 432.
Degeer inſ. 5. *p.* 32. *t.* 10. *f.* 7. Chryſomela quadripunctata.
Scop. ent. carn. 206. Bupreſtis quadripunctata.
Laicharт. inſ. tir. 1. *p.* 167, *n.* 2. Clytra quadripunctata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 195. *t.* 3. *f.* 4. Melolontha coleoptris rubris, &c.
Schaeff. elem. t. 83. *f.* 1.
ic. t. 6. *f.* 1. 2. 3.
Habitat in Europæ *corylo frequens.*
Larva *ſaccata: ſacco ovato ſcabro anterius oblique truncato.*

quadrinotatus. 4. Cr. cyaneo-niger, elytris rubris: maculis duabus cyaneis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 4.
Habitat in Barbaria, *ſtatura quadripunctati, at quadruplo minor.*

atraphaxidis. 5. Cr. niger, thorace rubro trimaculato, elytris teſtaceis: maculis tribus nigris, tibiis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 5.

Pall.

Pall. it. II. *p.* 725. *n.* 68. Chryſomela atraphaxidis.

Habitat in Sibiriæ *atraphaxide, magnitudine quadripunctati.*

lunulatus. 6. Cr. ater nitidus, elytris flavis: lunula, faſciis punctoque apicis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 138. *n.* 5. *mant. inſ.* I. *p.* 79. *n.* 6.

Habitat - - - *quadripunctato paulo minor.*

12-maculatus. 7. Cr. niger, thorace elytrisque rubris: punctis quatuor nigris. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 139. *n.* 6. *mant. inſ.* I. *p.* 79. *n.* 7.

Habitat ad Caput bonæ ſpei, *lunulati ſtatura & magnitudine.*

obſitus. 8. Cr. teſtaceus, antennis elytrorumque margine nigris. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 139. *n.* 7. *mant. inſ.* I. *p.* 79. *n.* 8.

Habitat in America *meridionali.*

tridentatus. 9. Cr. cæruleſcens, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 139. *n.* 8. *mant. inſ.* I. *p.* 79. *n.* 9.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 73. *Fn. ſuec.* 546. Chryſomela tridentata.

Degeer inſ. 5. *p.* 333. *n.* 36. *t.* 10. *f.* 10. Chryſomela cærulea nitida, &c.

Geoffr. inſ. par. I. *p.* 196. *n.* 3. Melolontha nigro-viridis, &c.

Schaff. ic. t. 77. *f.* 5.

Habitat in corylo, Lonicera xyloſteo, *etiam in* Calabria.

Feminæ *pedes anteriores elongati.*

lineatus. 10. Cr. rufeſcens, thorace maculis, elytris lineis duabus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* I. *p.* 139. *n.* 9. *mant. inſ.* I. *p.* 79. *n.* 10.

Habitat in Braſilia.

ve-

venustus. 11. Cr. griseo-fuscus, thorace, margine maculisque duabus flavis, elytris flavis: vittis duabus nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 79. *n.* 11.
Habitat in America, *mediæ magnitudinis.*

Gorteriæ. 12. Cr. ater glaber, thorace elytrisque punctis quatuor flavescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 139. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 79. *n.* 12.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 74. *Amœn. acad.* 6. *p.* 394. *n.* 16. Chrysomela Gorteriæ.
Habitat in Capitis bonæ spei *Gorteriis.*

octopunctatus. 13. Cr. niger, thorace rufo, elytris testaceis: punctis quatuor nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 79. *n.* 13.
Habitat in Barbariæ *plantis, statura & magnitudine cr. Gorteriæ.*

maxillosus. 14. Cr. capite thoraceque fulvis, elytris flavis: puncto baseos scutelloque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 139. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 80. *n.* 14.
Habitat ad Caput bonæ spei, *mediæ magnitudinis, antennis serratis.*

auritus. 15. Cr. ater, thorace utrinque macula lutea, tibiis flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 139. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 80. *n.* 15.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 75. Chrysomela aurita.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. *p.* 163. *n.* 19. *t.* 44. *f.* 5. g. h.
Habitat in Saxoniæ *coryto*, *in* Calabria.

didymus. 16. Cr. rufus, elytris maculis tribus nigris, anteriore posterius didyma. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 140. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 80. *n.* 16.
Habitat in nova Hollandia.

qua-

quadri-maculatus. 17. Cr. rufus, capitis basi elytrorumque maculis duabus cyaneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 140. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 80. *n.* 17.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 77. *Fn. suec.* 547. Chrysomela quadrimaculata.
Fn. suec. 432. Chrysomela oblonga nigra, coleoptris rubris: maculis quatuor nigris.
Scop. ent. carn. 206. Buprestis quadripunctata.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 195. *t.* 3. *f.* 4.
Pontopp. atl. dan. 1. *t.* 29.
Schaeff. ic. t. 6. *f.* 6. 7.
Habitat in Germania, Calabria, *abdomine cinereo.*

flavicollis. 18. Cr. niger, thorace fulvo: punctis sex nigris; elytris pallidis: punctis duobus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 140. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 80. *n.* 18.
Habitat in Sibiria, *quadrimaculato proxime affinis.*

longimanus. 19. Cr. obscure æneus, elytris testaceis: puncto baseos nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 140. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 80. *n.* 19.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 599. *n.* 95. *Fn. suec.* 562. *Pall. it.* II. *app. n.* 67? Chrysomela longimana.
Habitat in Europæ *borealis trifolio montano, euphorbia cyparissia, tridentato affinis, sed minor, pedibus anterioribus in altero sexu longissimis.*
Larva *saccata.*

Lar. 20. Cr. rufus, elytris fuscis cyaneo-nitidis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 80. *n.* 20.
Habitat in America *meridionali, mediæ magnitudinis.*

marginatus. 21. Cr. nigro-æneus, elytris flavis: margine nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 140. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 80. *n.* 21.

Schal-

Schaller Abh. der hall. Nat. Ges. 1. *p.* 276. Chrysomela phalerata.
Habitat in Germania, *longimano affinis.*

hirsutus. 22. Cr. thorace elytrisque obscure æneis pubescentibus *Fabr sp. inf.* 1. *p.* 141. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 80. *n.* 22.
Habitat in America *boreali.*

bipunctatus 23. Cr. niger nitidus, elytris rubris: punctis duobus nigris, antennis longitudine corporis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 141. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 80. *n.* 23.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 234. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 3. Cryptocephalus niger, &c.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 537. *n.* 78. *Fn. suec.* 548. Chrysomela bipunctata.
Uddm. diss. 22. Chrysomela atra, elytris rubris, punctis 4 nigris.
Petiv. gaz. t. 31. *f.* 4.
Degeer inf. 5. *p.* 332. *n.* 35.
β) *Uddm. diss.* 21. Chrysomela nigra, elytris rubris, macula nigra longitudinali.
Gadd. diss. 25. Cassida nigra, elytris flavis nitidis, maculis quatuor nigris, &c.
Habitat in Europæ *borealis corylo.*

bimaculatus. 24. Cr. niger obscurus, thorace fulvo, elytris testaceis: punctis duobus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 141. *n.* 120. *mant. inf.* 1. *p.* 80. *n.* 24.
Schaller Abh. der hall. Nat. Ges. 1. *p.* 274. Chrysomela melanocephala.
Habitat in Italia & Saxonia.

cordiger. 25. Cr. thorace variegato, elytris rubris: punctis duobus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 141. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 80. *n.* 25.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 235. *n.* 7. Cryptocephalus niger.

Syst.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 91. *Fn. ſuec.* 558. Chryſomela cordigera.
Uddm. diſſ. 23. Chryſomela nigra, elytris ſubflavis, punctis quatuor nigris.
Degeer inſ. 5. *p.* 330. *n.* 33.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 1.
Habitat in Europæ *corylo*, *ſalice*, *thoracis macula media interdum cordata.*

bothnicus. 26. Cr. ater, thorace linea longitudinali rubra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 80. *n.* 26.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 90. *Fn. ſuec.* 557. Chryſomela bothnica.
Degeer inſ. 5. *p.* 335. *n.* 39. Chryſomela cylindrica nigra, &c.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 7. *p.* 164. *n.* 21. *t.* 44. *f.* 8. n. o.
Habitat in Suecia, *cum decempunctato copula interdum connexus.*

vitis. 27. Cr. niger glaber, elytris rufis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 233. *n.* 2. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 27.
Habitat in Europæ *magis auſtralis vite vinifera, quam miſere aliquando devaſtat.*

coryli. 28. Cr. niger, thorace elytrisque teſtaceis immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 28.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 88. *Fn. ſuec.* 555. Chryſomela coryli.
Habitat in Europæ *corylo.*

pallens. 29. Cr. niger, thorace, elytris tibiisque pallidis *Fabr. mant.* 1. *p.* 81. *n.* 29.
Habitat in Sina, *Cr. coryli proxime affinis.*

va-

variegatus. 30. Cr. niger, thorace linea dorsali abbreviata marginibusque rubris, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.*497. *mant. inf.* 1. *p.* 81. *n.*31.
Habitat in Italia, *statura cr. coryli.*

trifasciatus. 31. Cr. supra testaceus, thoracis fascia, elytris tribus atris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 31.
Habitat in Sina, *statura & magnitudine cr. coryli.*

ruficollis. 32. Cr. niger, thorace rufo, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 142. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 32.
Habitat in insula S. Helenæ.

nigripes. 33. Cr. capite thoraceque rufis, elytris pallidis, pedibus apice nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 142. *n.*26. *mant. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 33.
Habitat in America *boreali.*

sexpunctatus. 34. Cr. niger, thorace variegato, elytris rubris: maculis tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 142. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 34.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 599. *n.* 92. *Fn. suec.* 559. * Chrysomela sexpunctata.
Degeer inf. 5. *p.* 321. *n.* 34. *t.* 10. *f.* 9. Chrysomela rubra, &c.
Scop. ent. carn. 208. Buprestis sexpunctata.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 18.
Schaeff. ic. t. 90. *f.* 1-3.
Habitat in Europæ *boreali corylo, etiam in* Calabria.

cæruleus. 35. Cr. cyaneus nitidus, antennis fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 35.
Habitat in Africa *æquinoctiali, oblongus.*

cupreus. 36. Cr. rubro-cupreus nitidus subtus cyaneus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 36.
Habitat in Cayenna, *calcarati statura & magnitudine.*

rii-

rubrifrons. 37. Cr. cyaneus nitidus, fronte, thoracis fascia, femoribusque rubris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 81. *n.* 37.
Habitat - - - *statura calcarati.* Leske.

calcaratus. 38. Cr. violaceus, capite, thorace femoribusque dentatis rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 82. *n.* 38.
Habitat in Sierra Leon Africæ.

sapphirinus. 39. Cr. cyaneus, thorace pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 82. *n.* 39.
Geoff. inf. par. 1. *p.* 197. *n.* 4. Melolontha cærulea, thorace pedibusque ferrugineis.
Habitat in Gallia.

cinctus. 40. Cr. capite thoraceque rufis, elytris nigris: margine rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 82. *n.* 40.
Habitat in America *meridionali*, *sapphirini statura, sed triplo minor.*

bucephalus. 41. Cr. cyaneus, ore, thoracis marginibus pedibusque rubris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 82. *n.* 41.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. *p.* 270. Chrysomela bucephala.
Habitat in Saxoniæ *anthyllide vulneraria.*

collaris. 42. Cr. cyaneus nitidus, thoracis lateribus, elytrorum apicibus femoribusque rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 82. *n.* 42.
Habitat in Sibiria, *fericeo major.*

fericeus. 43. Cr. viridi-cæruleus antennis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 32. *mant. inf.* 1. *p.* 82. *n.* 43.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 233. *n.* 3. Cryptocephalus viridi-auratus fericeus.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 86. *Fn. suec.* 554. Chrysomela fericea. *De-*

Degeer inſ. 5. *p.* 334. *n.* 37.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 13.
Habitat in Europæ *ſalicibus*, *rarius tota ænea.*

nitens. 44. Cr. viridis nitens, ore pedibusque teſtaceis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 144. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 44.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 84. *Fn. ſuec.* 551. Chryſomela nitens.
Degeer inſ. 5. *p.* 334. *n.* 38.
Habitat in Europæ *ſalice.*

glabratus. 45. Cr. violaceus, thorace elytrisque æneis, antennis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 45.
Habitat in Braſilia.

levadrum. 46. Cr. ater, elytris flavis: vitta media abbreviata atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 46.
Habitat in Germania.

vittatus. 47. Cr. niger, elytris margine ſtriaque abbreviata flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 47.
Geoffr. inſ. tom. 1. *p.* 233. *n.* 4.
Herbſt apud Fueſsli arch. inſ. 4. *p.* 62. *n.* 10. *t.* 23. *f.* 23.
Habitat in Europæ *magis auſtralis graminoſis.*

limbatus. 48. Cr. ferrugineus, thorace rufo, elytrorum ſuturis cyaneo-nitidis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 498. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 48.
Habitat in Cayenna, *mediæ magnitudinis.*

Moræi. 49. Cr. ater, elytris maculis duabus flavis marginalibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 49.

Geoffr.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 234. *n.* 5. Cryptocephalus niger, &c.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 597. *n.* 82. *Fn. ſuec.* 550. Chryſomela Moræi.
Scop. ent. carn. 202. Bupreſtis Moræi.
Uddm. diſſ. 28. Caſſida nigra nitida, clypeo caput fere integrum tegente, macula ad apicem & baſin elytrorum lutea.
Schaeff. ic. t. 30. *f.* 5.
Habitat in Europæ *hypericonibus.*

octogut-tatus. 50. Cr. ater, elytris maculis quatuor flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 50.
Habitat in Saxoniæ *fraxino*, *magnitudine cr. Moræi.*

15-gut-tatus. 51. Cr. rufus, thorace maculis tribus, elytris ſex flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 144. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 51.
Habitat in Braſilia.

decem-punctatus. 52. Cr. capite thoraceque variegatis, coleoptris flavis: punctis decem nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 53. *Herbſt apud Fuesſli arch. inſ.* 7. *t.* 45. *f.* 4. a. b.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 599. *n.* 93. *Fn. ſuec.* 561. Chryſomela decemmaculata.
Herbſt apud Fuesſli arch. inſ. 7. *p.* 64. *n.* 18. *t.* 43. *f.* 26. c. Cryptocephalus hieroglyphicus?
Habitat in Europa.

bipuſtulatus. 53. Cr. ater, elytris macula apicis rufa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 53. *Laichart. inſ. tir.* 1. *p.* 197. *n.* 7. Cryptocephalus Podæ.
Schaeff. ic. t. 77. *f.* 7.
Habitat in Europæ *chryſanthemo coronario.*

bifa-

bifasciatus. 54. Cr. rufus: thorace maculis duabus, elytris fasciis duabus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 145. *n.* 41. *mant. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 54.
Habitat in Africa *æquinoctiali.*

quadripustulatus. 55. Cr. niger, elytris lævibus rufo bimaculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 145. *n.* 43. *mant. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 55.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 597. *n.* 80. *Fn. suec.* 549.* Chrysomela quadripustulata.
Habitat in Sueciæ *nemoribus.*

notatus. 56. Cr. niger, elytris punctato-striatis: fascia punctoque apicis testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 56.
Habitat in America, *parva, immaculata.*

Histrio. 57. Cr. niger, thorace elytrisque ferrugineo-variegatis, pedibus ferrugineis: geniculis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 145. *n.* 43. *mant. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 57.
Habitat in Italia, *magnitudine cr. Scopolii.*

Scopolii. 58. Cr. niger, thorace rufo, elytris rufis: fasciis duabus cyaneis, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 145. *n.* 44. *mant. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 58.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 597. *n.* 81. Chrysomela Scopolina.
Habitat in Europa *australi* & America, *mediæ magnitudinis.*

Koenigii. 59. Cr. rufus, elytris punctis duobus cæruleſcentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 45. *mant. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 59.
Habitat Tranquebariæ, *ad cr. Scopolii proxime accedens.*

Paracenthesis. 60. Cr. elytris flavis: lineola punctisque tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 46. *mant. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 60.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 1066. *n.* 1. Chrysomela Paracenthesis.
Habitat in Europæ *salice*, *betula*, *supra flavus*; *thorace nigro variegato.*

hordei. 61. Cr. æneus nitidus, fronte cuprea. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 61.
Habitat in Barbariæ *hordeo marino*, *parvus*, *antennis serratis.*

pini. 62. Cr. testaceus, elytris pallidis, antennis fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 47. *mant. inf.* 1. *p.* 84. *n.* 62.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 89. *Fn. suec.* 556. Chrysomela pini.
Habitat in Sueciæ *pino.*

reticulatus. 63. Cr. thorace elytrisque albis, testaceo reticulatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 84. *n.* 63.
Habitat in Cayenna, *parvus.*

pusilus. 64. Cr. thorace fulvo, elytris testaceis nigro-maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 48. *mant. inf.* 1. *p.* 84. *n.* 64.
Habitat Hamburgii.

nitidulus. 65. Cr. thorace æneo nitido, elytris cyaneis, capite, antennarum basi pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 84. *n.* 65.
Habitat in Russia *meridionali*, *labiato major.*

labiatus. 66. Cr. ater nitidus, ore, pedibus basi antennarum lutescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 146. *n.* 49. *mant. inf.* 1. *p.* 84. *n.* 65.

Syst.

Syst. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 87. *Fn. suec.* 553. * Chrysomela labiata.
Habitat in Europæ *rosis.*

flavilabris. 67. Cr. obscure æneus nitidus, ore lutescente, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. ins.* 1. *p.* 84. *n.* 67.
Mull. prodr. zool. dan. n. 519.
Geoffr. ins. par. 1. *n.* 8.
Habitat in Saxoniæ *betula*, *labiato affinis*, *at elytræ striato-punctata.*
Larva *saccata.*

flavipes. 68. Cr. ater nitidus, capite pedibusque luteis.
Fabr. sp. ins. 1. *p.* 146. *n.* 50. *mant. ins.* 1. *p.* 84. *n.* 68.
Habitat in Italia, *labiato affinis*, *at quadruplo major.*

cyaneus. 69. Cr. ex fusco cyaneus, thorace lævi margineto, antennis nigris.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 596. *n.* 72. Chrysomela cyanea.
Habitat in America, *magnitudine chrysomelæ graminis.*

bilineatus. 70. Cr. niger, elytris lineis duabus flavescentibus, pedibus ferrugineis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 597. *n.* 83. Chrysomela bilineata.
Habitat in Europa, *minutus.*

Barbareæ. 71. Cr. antennis basi oreque ferrugineis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 598. *n.* 85. *Fn. suec.* 552. * Chrysomela barbareæ.
Habitat in Eryfimi barbareæ *floribus*; *an varietas labiati?*

glauco-cepha-lus. 72. Cr. niger nitidus, capite pedibusque flavis, thorace elytrisque anterius albo-marginatis.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. *p.* 277. Chrysomela glaucocephala.
Habitat Halæ, *rarior in betula, statura & magnitudine, cr.* Moræi.

biguttatus. 73. Cr. niger, capite, apicibus elytrorum pedibusque flavis. *Schranck enum. inf. auſtr. n.* 169?
Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. *p.* 278. Chrysomela biguttata.
Herbſt apud Fuessli arch. inf. 4. *p.* 163. *n.* 20. *t.* 44. *f.* 6. i. k?
Habitat rarior Halæ Saxonum, *magnitudine chrysomelæ nemorum.*

Martinius. 75. Cr. cæruleis nitidus, elytris rubris.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. *p.* 278. Chrysomela Martinia.
Habitat in Malabar, *statura & magnitudine ad quadripunctatum accedens.*

caſſimilis. 75. Cr. ex cæruleo niger, capitis maculis duabus, pedibus anterioribus antennisque flavis. *Herbſt apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 63. *n.* 13.
Habitat Berolini, *labiato ſimilis, ſed major.*

ornatus. 76. Cr. niger, capitis macula biloba fulva, thoracis linea & margine flavis. *Herbſt apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 63. *n.* 15. *t.* 23. *f.* 24.
Habitat - - - labiato ſimilis, at major.

peregrinus. 77. Cr. niger glaberrimus, capite, thorace elytrisque cæruleis. *Herbſt apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 63. *n.* 16. *t.* 23. *f.* 25.
Habitat in India, 5 *lineas longus.*

laticlavius. 78. Cr. niger, capite, thorace elytrisque rufis, ſu-

futura & margine elytrorum nigris, antennis ferratis.
Forst. nov. inf. spec. p. 27. *n.* 27. Chrysomela laticlavia.
Habitat in America *septentrionali, fericei magnitudine.*

viridans. 79. Cr. viridis, elytris marginatis.
Lepech. it. I. *p.* 312. *t.* 20. *f.* 6. Chrysomela obscure viridis.
Habitat in Russia *australi.*

octonotatus. 80. Cr. thorace elytrisque flavis: singulis punctis quatuor nigris.
Lepech it. II. *p.* 207. *t.* 11. *f.* 19. Chrysomela octopunctata.
Habitat in Russia *australi.*

sexnotatus. 81. Cr. niger, thoracis margine rufo, elytrorum punctis duobus maculisque quatuor nigris.
Lepech. it. II. *p.* 207. *t.* 10. *f.* 14. Chrysomela sexpunctata.
Habitat in Russia *australi.*

Mulleri. 82. Cr. niger villosus, elytris punctis duobus rubris.
Mull. zool. dan. prodr. p. 58. *n.* 511. Chrysomela bimaculata.
Habitat in Dania.

musciformis. 83. Cr. viridi-caeruleus, thorace rubro: macula caerulea, tibiis ferrugineis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 197. *n.* 5.
Habitat in Gallia.

Vibex. 84. Cr. niger, elytris rubris striatis: maculis quatuor limboque nigris.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 234. *n.* 6. *t.* 4. *f.* 3.
Habitat in Gallia.

li-

livens. 85. Cr. ex cæruleo violaceus punctato-ſtriatus, antennarum baſi maculaque oris pallida.
Mull. zool. dan. prodr. p. 58. *n.* 519. Cryptocephalus parvulus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 235. *n.* 8.
Habitat in Europa.

puncta- tus. 86. Cr. cæruleus ſparſim punctatus, tibiis anterioribus ferrugineis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 236. *n.* 9.
Habitat in Gallia.

pariſi- nus. 87. Cr. niger ſtriatus, pedibus rufis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 236. *n.* 10.
Habitat in Gallia.

rufipes. 88. Cr. niger ſtriatus, thorace pedibusque rufis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 236. *n.* 11.
Habitat in Gallia.

fulvus. 89. Cr. capite thoraceque fulvo, elytris pallidis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 237. *n.* 12.
Habitat in Gallia.

ferrugi- noſus. 90. Cr. niger nitidus, antennis corpore duplo longioribus, elytris apice macula lutea.
Schranck Beytr. 2. *Naturg. p.* 64. §. 7. Chryſomela ferrugata.
Poda muſ. Græc. p. 38. *ſp.* 9.
Habitat in Germania *ſuperiore.*

multi- color. 246. Cr. elytris flavis: faſciis duabus coccineis.
Hornſt. Schr. berl. Naturf. 8. 1. *p.* 3. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 6. Chryſomela bifaſciata.
Habitat in Java, *magnitudine chryſomelæ vulgatiſſimæ, thorace rubro, abdominis apice nigro.*

ſuma- tranus. 247. Cr. elytris luteis: macula in medio caſtanea.
Hor-

Hornſt. Schr. berl. Naturf. 8. 1. *p.* 4. *n.* 4. *t.* 1. *f.* 4. Chryſomela bimaculata.
Habitat in Sumatra, *rarior in* Java, *magnitudine chryſomelæ vulgatiſſimæ.*

coffeæ. 248. Cr. thoracis ſulco tranſverſo, abdomine viridi, elytris flaveſcentibus. *Hornſt. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 5. *n.* 5. *t.* 1. *f.* 7.
Habitat in Bantam *in hortis, in quibus coffea colitur, hujus orillos magnitudine, facie, colore referens.*

orientalis. 249. Cr. flavus, thorace rufo: ſulco tranſverſo, elytris nigro-cæruleis. *Hornſt. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 5. *n.* 6. *t.* 1. *f.* 3.
Habitat in Malacca, Java, *aliisque* oceani indici *inſulis, cr. phaliandrii magnitudine.*

batavienſis. 250. Cr. capite, thorace, elytris pedibusque lividis. *Hornſt. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 6. *n.* 7. *t.* 1. *f.* 12.
Habitat in Java, *magnitudine chr. nymphææ; an hujus generis & tribus?*

javanus. 251. Cr. ater, thorace elytrisque rubris nigro-maculatis, antennis nigris baſi rufeſcentibus. *Hornſt. Schr. berl. Naturf.* 8. 1. *p.* 7. *n.* 8. *t.* 1. *f.* 2. 5. 8. 11. Chryſomela cryptocephala.
Habitat in Java, 4-*punctati magnitudine & facie; an idem cum* 10-*maculato?*

cyanocephalus. 252. Cr. capite, thoracis margine, elytris femorum baſi & apice violaceis, vertice & thorace coccineis. *Muſ. Lesk. p.* 15. *n.* 298. b.
Habitat extra Europam.

flavifrons. 253. Cr. ater nitidus, fronte, ore, pedibus, antennarum baſi elytrorumque margine luteſcentibus.

bus. *Muſ. Lesk. p.* 15. *n.* 306.
Habitat in Europa.

fuſcatus. 254. Cr. fuſcus, capite, thorace elytrisque violaceis: his profunde punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 15. *n.* 310.
Habitat in Europa.

ochrocephalus. 255. Cr. niger, capite anterius, elytrisque flavis: his guttis quatuor punctoque apicis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 15. *n.* 312.
Habitat in Europa, *thorace flavo, maculis utrinque 2 connatis.*

futuralis. 256. Cr. ater glaber, elytris flavis: ſutura vittaque atra apice connata. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 314.
Habitat in Europa.

chryſopus. 257. Cr. ater glaber, elytris punctato-ſtriatis, capite, elytrorum apicibus pedibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 315.
Habitat in Europa.

†† *labio bifido, oblongi*, Ciſtelæ.

Gigas. 91. Cr. villoſus fuſcus, elytris, abdomine femoribusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 84. *n.* 1.
Habitat in Gallia *magis auſtrali, prægrandis.*

cervinus. 92. Cr. lividus, pedibus fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 115. *Fn. ſuec.* 575. Chryſomela cervina.
Habitat in Europa *boreali, etiam in* Calabria.

cinereus. 93. Cr. lividus, elytris pedibusque fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 3. *Ha-*

Habitat in Italia, *cervino proxime affinis, an varietas?*

lividus. 94. Cr. lividus, antennis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 4.
Habitat in terra del fuego, *cinereo affinis, at duplo minor.*

ceramboides. 95. Cr. ater, thorace anterius anguſtato, elytris ſtriatis teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 5.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 17. *Fn. ſuec.* 576. Chryſomela ceramboides.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 354. *n.* 3. Mordella nigra, &c.
Herbſt apud Fuesslii arch. inſ. 4. *p.* 64. *n.* 1. *t.* 23. *f.* 27.
Habitat in Europa *boreali*, & Calabria, *thorace rarius teſtaceo.*

ruſitarſis. 96. Cr. ater, thorace quadrato, elytris ſtriatis teſtaceis.
Habitat in Europæ *magis auſtralis ſpicis ſecalinis, ceramboidi affinis.*

teſtaceus. 97. Cr. niger, thorace, elytris & abdomine teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 7.
Habitat in chryſanthemo, ſambuco, aliisque Barbariæ *plantis, polyphaga.*

ſulphureus. 98. Cr. flavus, elytris ſulphureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 8.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 114. Chryſomela ſulphurea.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 351. *n.* 11. Tenebrio luteus.
Herbſt apud Fuesslii arch. inſ. 4. *p.* 64. *n.* 2. *t.* 23. *f.* 28.

Ha-

Habitat in Europæ *umbellatarum floribus.*

rubricollis. 99. Cr. ater, thorace ferrugineo, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 9.
Habitat in Europæ *ſantolina, ſtatura & magnitudine ſulphureæ.*

cæruleſcens. 100. Cr. ater, elytris ſtriatis cæruleſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 10.
Habitat in Barbariæ *plantis, rubricollis ſtatura & magnitudine.*

analis. 101. Cr. rufeſcens, antennis, macula elytrorum anoque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 11.
Habitat Tranquebariæ, *macula elytrorum interdum duplici.*

varians. 102. Cr. teſtaceus, oculis nigris, elytris ſubſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 12.
Habitat Halæ Saxonum, *murinæ proxime affinis, at paulo major, antennis pedibusque interdum teſtaceis.*

murinus. 103. Cr. niger, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 13. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 602. *n.* 118. *Fn. ſuec.* 577. Chryſomela murina.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 355. *n.* 4. Mordella nigra, &c.
Herbſt apud Fuesſli arch. inſ. 4. *p.* 64. *n.* 3. *t.* 23. *f.* 29.
Habitat in Europa *boreali.*

humeralis. 104. Cr. niger, elytris puncto baſeos ferrugineo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 85. *n.* 141.
Habitat Halæ Saxonum, *parvus.*

Mo-

Morio. 105. Cr. niger obſcurus, pedibus teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 15.
Habitat in Suecia, *parvus, oblongus, anguſtus, villoſus.*

angu-ſtatus. 106. Cr. thorace elytrisque obſcure rufis medio nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 16.
Habitat in Anglia, *murini ſtatura, ſed anguſtior.*

palli-dus. 107. Cr. pallidus, capite elytrorumque apicibus fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 17.
Habitat in Anglia.

ar-gi-neus. 108. Cr. flavus, capite pectoreque nigris, elytris viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 18.
Habitat in Africæ *plantis.*

feſtivus. 109. Cr. ferrugineus, elytris cyaneo-viridibus: margine ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 19.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *parvus.*

aulicus. 110. Cr. ater, thorace rufo, elytris cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 20.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

innu-bus. 111. Cr. niger, thorace rufo, elytris nigris: margine vittaque luteis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 21.
Habitat in America.

ameri-canus. 112. Cr. thorace flavo, elytris pallidis: vitta media nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 22.
Habitat in America *ſeptentrionali.*

quin-

quinquevittatus. 113. Cr. teſtaceus, elytrorumque marginibus vittaque media nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 23.
Habitat in America *boreali.*

hirtus. 114. Cr. hirtus, capite thoraceque rufis, elytris cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 24.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ad lagrias accedens.*

fexlineatus. 115. Cr. ferrugineus, elytris flavis: lineolis tribus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 25.
Habitat - - -

minutus. 116. Cr. niger, elytris pubeſcentibus pedibusque griſeis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 86. *n.* 26.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 593. *n.* 50. *Fn. ſuec.* 533. Chryſomela minuta.
Habitat in Europæ *plantis aquaticis, dytici facie.*

lepturoides. 117. Cr. obſcure æneus, antennis plantisque ferrugineis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 30. *n.* 30.
Habitat in Noveboraco, *leptura melanura major.*

alpinus. 118. Cr. niger nitens, elytris caſtaneis rugoſis: ſutura nigra. *v. Moll. naturh. Br. ub. Oeſtr. &c. vol.* 1. *p.* 49.
Habitat in alpibus Salzburgicis.

Luperus. 219. Cr. niger, elytris virenti nitentibus, pedibus antennarumque longarum articulo 1 imo fulvis, ultimo palporum prægrandi cordato. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 4. *p.* 65. *n.* 4. *t.* [illegible] *f.* 30.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 15.
Schaeff. elem. t. 80.
Habitat in Germania, *an hujus tribus?*

be-

betulæ. 120. Cr. niger, thorace ſuborbiculato piloſo, elytris fuſcescentibus obſolete ſtriatis. *Herbſt. apud Fuesslı arch. inſ.* 4. *p.* 65. *n.* 5. *t.* 23. *f.* 31.
Habitat Berolini, 5 *fere lineas longus.*

reppensis. 121. Cr. niger, thorace anterius anguſtato, poſterius dilatato, elytris lævibus pedibusque fuſcis.
Herbſt apud Fuesslı arch. inſ. 4. *p.* 65. *n.* 6. *t.* 23. *f.* 32.
Habitat rarior in Marchia, 2 *circiter lineas longus.*

ſtrigoſus. 122. Cr. rubeſcens, abdomine nigro, fronte duabus, thorace tribus, elytrisque quatuor faſciis nigris.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 16.
Habitat - - - *an hujus tribus?*

Forſteri. 240. Cr. ſubvilloſus fuſcus, faſciis longitudinalibus nigricantibus interruptis.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 12. *n.* 12. Ciſtela faſciata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 116. *t.* 1. *f.* 8.
Schaeff. ic. t. 95. *f.* 3.
Habitat in Europæ *arena*, *obovatus*, *chryſomelæ politæ magnitudine.*

puſtulatus. 241. Cr. niger ovatus, macula elytrorum rufa undata. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 116. *n.* 2.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 13. *n.* 13.
Habitat in Europæ *arena*, *magnitudine chryſomelæ faſtuoſæ.*

denigratus. 242. Cr. totus niger nitens glaber.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 14. *n.* 14. Ciſtela nigra.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 117. *n.* 3.
Habitat in Europæ *arena*, *puſtulato minor.*

quadrifaſciatus. 243. Cr. obovatus niger, elytris ſtriatis.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 15. *n.* 15. Ciſtela ſtriata.

Ha-

Habitat in Angliæ *arena*, *ſtatura & magnitudine cr.* Forſteri.

holoſericeus. 244. Cr. ovatus, fuſco-viridis, elytrorum faſciis longitudinalibus interruptis. *Forſt. nov. inſ. ſt.* 1. *p.* 16. *n.* 16.
Habitat in Europæ *arena*, *magnitudine denigrati.*

capucinus. 258. Cr. ferrugineus, capite, thorace elytriſque fuſcis: his crenato-ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 335.
Habitat in Europa.

conſperſus. 259. Cr. ſupra poline luteo, ſubtus argenteo conſperſus, antennis fuſcis, pedibus fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 16. *n.* 337.
Habitat in Europa, *curculionis facie.*

ſulphuratus. 260. Cr. fuſcus, antennis elytris pedibusque ſulphureis, plantis fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 338.
Habitat in Europa, *ſtatura ſulphurei*, *an varietas?*

truncatus. 261. Cr. fuſcus, elytris lævibus, antennis pedibusque flavo-rufeſcentibus, thorace poſterius truncato. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 339.
Habitat in Europa.

brunneus. 262. Cr. brunneus, abdomine fuſco, elytris lævibus. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 340.
Habitat in Europa.

ruſitarſis. 268. Cr. oblongus, corpore, capite, antennis pedibusque nigro-æneis piloſis, elytris teſtaceis punctatis, tarſis rufis. *Lesk. it. p.* 15. *t.* A. *f.* 4.
Habitat in Luſitaniæ monte Keulenberg.

†† *ma-*

†† *maxillæ bifidæ, oblongi*, Criocerides.

trilobus. 123. Cr. capite thoraceque flavescentibus nigro-maculatis, elytris griseis, corpore nigro. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 86. *n.* 1.
Habitat ad Caput bonæ spei, *magnus niger.*

Lineola. 124. Cr. griseus, thorace linea dorsali, elytris puncto baseos nigris. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 86. *n.* 2.
Habitat in Italia, *statura cr. nymphææ.*

nymphææ. 125. Cr. fuscus, elytrorum margine prominulo flavescente. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 150. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 86. *n.* 3.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 600. *n.* 99. *Fn. suec.* 565. Chrysomela nymphææ.
Degeer inf. 5. *p.* 326. *n.* 31. *t.* 20. *f.* 1. 2. Chrysomela ovata nigro-fusca.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 254. *n.* 4. Galleruca pallida, &c.
Habitat in Europæ *nymphæis, tardus.*

capreæ. 126. Cr. thorace nigro-maculato elytrisque griseis, antennis nigris. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 150. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 86. *n.* 4.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 600. *n.* 100. *Fn. suec.* 516. Chrysomela capreæ.
Degeer inf. 5. *p.* 325. *n.* 30. Chrysomela grisea alni.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 254. *n.* 5. Galleruca nigra, &c.
Fn. suec. 1. *n.* 424. Chrysomela nigra, thorace elytrisque griseis.
Habitat in Europæ *salicibus.*

atratus. 127. Cr. pallidus, elytrorum omni margine atro. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 150. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 86. *n.* 5.

Ha-

Habitat Tranquebariæ.

pallia- tus. 128. Cr. luteus, elytris nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 6.
Schall. Abh. hall. Nat. Geſ. 1. *p.* 279. Chryſomela oblonga lutea, oculis elytrisque nigris.
Habitat Tranquebariæ.

calma- rienſis. 129. Cr. ovatus cinereus, elytris vitta lineolaque baſeos nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 7.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 600. *n.* 101. Chryſomela calmarienſis.
Geoff. inſ. par. 1. *p.* 253. *n.* 3. Galleruca pallida, &c.
Habitat in Europæ *ſalice*, *alno*.

abdo- minalis. 130. Cr. flavus, antennis abdomineque fuſcis, ano flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 8.
Habitat in India, *& ad* Caput bonæ ſpei.

capen- ſis. 131. Cr. niger, pedibus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 9.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *minor*, *opacus*.

ſangui- neus. 132. Cr. ovatus rufus, antennis oculisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 10.
Habitat Halæ Saxonum, *pedibus ut plurimum cinereis*.

tenel- lus. 133. Cr. ferrugineus, thorace elytrorumque margine flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 11.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 600. *n.* 102. *Fn. ſuec.* 564. Chryſomela tenella.
Habitat in Europæ *ſalice*.

pi-

pictus. 134. Cr. fuscus, capite thoraceque flavis nigro-maculatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 87. *n.* 12.
Habitat in India, *tenelli statura.*

halensis. 135. Cr. flavescens, capitis basi elytrisque æneis, antennis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 151. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 87. *n.* 13.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 589. *n.* 20. Chrysomela halensis.
Herbst apud Faessli arch. inf. 7. *p.* 164. *n.* 15. *t.* 45. *f.* 5.
Habitat in Germania, *chrysomela polygoni major.*

bituberculatus. 136. Cr. fulvus, elytris pallidis: margine omni fulvo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 151. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 87. *n.* 14.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *statura melanocephali.*

bidentatus. 137. Cr. flavus, elytris nigris apice flavescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 151. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 87. *n.* 15.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *statura bituberculati.*

melanocephalus. 138. Cr. rufus, capite nigro, elytris violaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 87. *n.* 16.
Habitat in nova Hollandia.

cantharoides. 139. Cr. violaceus, capite, thorace pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 87. *n.* 17.
Habitat in Anglia, *statura cr. nymphææ.*

melanogaster. 140. Cr. pallidus, elytrorum maculis duabus abdomineque atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 87. *n.* 18.

Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 4. *p.* 66. *n.* 6. *t.* 23. *f.* 33. Crioceris quadrimacula.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *&* *in* Germania.

pygmæus. 141. Cr. rufus, capite abdomineque atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 19.
Habitat in Cayenna, *minutus.*

indicus. 142. Cr. niger, capite, thorace, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 87. *n.* 20.
Habitat in India, *mediæ magnitudinis.*

exilis. 143. Cr. niger, thorace elytrisque pallidis immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 20.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

erythrocephalus. 144. Cr. niger, capite thoraceque ferrugineis, elytris viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 15. *mant. inſ* 1. *p.* 88. *n.* 22.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura exilis.*

ſiamenſis. 145. Cr. niger, elytris maculis duabus teſtaceis, thorace cylindrico. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 23.
Habitat in Siam, *ſtatura merdigeri, at duplo major.*

impreſſus. 146. Cr. ater elytris rubris, thorace cylindrico utrinque ſubimpreſſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 24.
Habitat in Siam, *ſtatura merdigeri, at paulo major.*

merdiger. 147. Cr. ſupra ruber, thorace cylindrico utrinque impreſſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 88. *n.* 25.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 599. *n.* 97. *Fn. ſuec.* 563. Chryſomela merdigera.
Degeer inſ. 5. *p.* 338. *n.* 43. Chryſomela rubra liliorum. *Geoffr.*

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 239. *n.* 1. Crioceris rubra.
Scop. ent. carn. 112. Attelabus lilii.
Blank. inf. 91. *t.* 11. *f.* 1.
Valisn. nat. 1. *p.* 265. *t.* 32.
Merian. inf. cur. 3. *t.* 21.
Reaum. inf. 3. *t.* 17. *f.* 12.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 14.
Schaeff. elem. t. 52. *f.* 1.
icon. t. 4. *f.* 4.
Habitat in convallaria majali, liliis, *etiam* Calabriæ.

12-punctatus. 148. Cr. ruber, thorace cylindrico, elytris punctis sex nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 135. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 88. *n.* 26.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 110. *Fn. suec.* 568. Chrysomela 12-punctata.
Scop. ent. carn. 114. Attelabus 12-punctatus.
Geoff. inf. par. 1. *p.* 241. *n.* 2. *t.* 4. *f.* 5. Crioceris rubra, *punctis* 13 nigris.
Frisch inf. 13. *t.* 28.
Schaeff. ic. t. 4, *f.* 5.
Habitat in asparago, *frequens.*

14-punctatus. 149. Cr. thorace cylindrico fusco: punctis quinque nigris, elytris flavis: punctis septem. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 88. *n.* 27.
Scop. ent. carn. 116. Attelabus 14-punctatus.
Habitat in Germania *magis australi.*

cayennensis. 150. Cr. thorace cylindrico rufo, elytris flavis: fasciis duabus nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 88. *n.* 28.
Habitat in Cayenna, *mediæ magnitudinis.*

fucatus. 245. Cr. cyaneus, elytris flavis: maculis duabus cyaneis. *Fabr. mant. inf.* 2. *app. p.* 381.
Habitat in insula S. Bartholomæi.

quinquenotatus. 151. Cr. niger, thorace rufo, coleoptris flavescentibus: maculis quinque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 88. *n.* 29.
Habitat in Germania *superiori*, *statura cayennensis.*

ebræus. 152. Cr. flavescens, thorace rufo, elytris albis: maculis quinque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 89. *n.* 30.
Habitat in Cayenna, *pedibus albis.*

australis. 153. Cr. rufus, thorace cylindrico, elytris fasciis duabus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 89. *n.* 31.
Habitat in nova Hollandia.

unifasciatus. 154. Cr. rufus, thorace cylindrico, elytris fascia atra. *Fabr. sp. inf.* 1. 153. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 89. *n.* 32.
Habitat in nova Hollandia, *an varietas australis?*

novæ Hollandiæ. 155. Cr. flavus, thorace cylindrico, antennis, pectore pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 89. *n.* 33.
Habitat in nova Hollandia.

griseus. 156. Cr. pallidus, capite femoribusque ferrugineis, antennis tibiisque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 154. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 89. *n.* 34.
Habitat ad Caput bonæ spei, *mediæ magnitudinis.*

oculatus. 157. Cr. flavus, thorace cylindrico, elytris basi nigris: puncto flavo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 154. *n.* 26. *mant. inf.* 1. *p.* 89. *n.* 35.
Habitat in nova Hollandia.

biocu-latus. 158. Cr. testaceus, thorace immaculato, elytris maculis duabus ocellaribus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 154. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 89. *n.* 36.
Ha-

Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura oculati.*

nigricornis. 159. Cr. pallidus, thorace ſubcylindrico, antennis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 154. *n.*28. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 37.
Habitat - - - *oculato paulo minor.*

nitidus. 160. Cr. viridi-æneus nitidus, elytris teſtaceis: maculis duabus cyaneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*154. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 38.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

Cyanella. 161. Cr. cæruleus, thorace cylindrico: lateribus gibbis. *Fabr. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 39.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 600. *n.* 104. *Fn. ſuec.* 572. Chryſomela cyanella.
Degeer inſ. 5. *p.* 340. *n.* 44. Chryſomela cæruleo-violacea.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 243. *n.* 5. Crioceris tota cæruleo-viridis.
Herbſt apud Fuesslı arch. inſ. 4. *p.* 67. *n.*10. *t.*23. *f.* 34.
Habitat in Europæ *plantis.*

melanopus. 162. Cr. cæruleus, thorace pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 89. *n.* 40.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 105. *Fn. ſuec.* 573. Chryſomela melanopa.
Degeer inſ. 5. *p.* 342. *n.* 46.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 19.
Habitat in Europa, *in* Calabriæ *quercu.*

ochropus. 163. Cr. niger, thorace pedibusque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*155. *n.*32. *mant. inſ.* 1. *p.*89. *n.*41. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.*601. *n.*106. Chryſomela flavipes.
Habitat in Germania, *frequens, melanopodi affinis.*

ſub-

subspinosus. 164. Cr. niger, capite, thorace subspinoso, pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 33. *mant. inf.* 1. *p.* 89. *n.* 42.
Habitat in Anglia, *statura ochropodis.*

saxonicus. 165. Cr. ater nitidus, antennarum basi pedibusque rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 89. *n.* 43.
Habitat in Saxoniæ *fruticibus*, *melanopode paulo major.*

cyanocephalus. 166. Cr. cyaneus, thorace rufo, antennis pedibusque fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.* 90. *n.* 44.
Habitat in nova Hollandia.

asparagi. 167. Cr. thorace rubro: punctis duobus nigris, coleoptris flavis: cruce punctisque quatuor nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 35. *mant. inf.* 1. *p.* 90. *n.* 45.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 112. *Fn. suec.* 567. Chrysomela asparagi.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 241. *n.* 3. Crioceris thorace rubro, &c.
Scop. ent. carn. 113. Attelabus asparagi.
Frisch inf. 1. *p.* 27. *t.* 6.
Roes. inf. 2. *scar.* 3. *t.* 4.
Schaeff. ic. t. 52. *f.* 9. 10.
β) Cr. elytrorum maculis duabus basi connatis.
γ) Cr. elytrorum fasciis duabus angustis rubris.
Habitat in Europa, *asparagos depascens*, β) *in* Italia, γ) *in* Gallia.

phellandrii. 168. Cr. niger, thoracis margine, elytrorumque lineis duabus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 36. *mant. inf.* 1. *p.* 90. *n.* 46.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 14. *Fn. suec.* 569. Chrysomela phellandrii.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 266. *n.* 20. Chrysomela oblonga nigra.

De-

Degeer inf. 5. *p.* 324. *n.* 28. *t.* 9. *f.* 34. Chrysomela oblonga nigro-ænea.
Habitat ad phellandrii aquatici *radices.*

campestris. 169. Cr. nigro-cæruleſcens, thoracis limbo nigro, elytris punctis tribus poſterius margine flavo connexis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 47.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 113. Chryſomela campeſtris.
Valiſn. op. 1. *t.* 7. Cancarella aſparagi.
Habitat in Europa *magis auſtrali, ſtatura & magnitudine. cr. aſparagi.*

longus. 170. Cr. elongatus niger, elytris vitta flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 48.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magis elongatus, quam reliqui hujus tribus.*

trilineatus. 171. Cr. pallidus, thorace maculis tribus, elytris ſtriis abbreviatis tribus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 49.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

equeſtris. 172. Cr. capite thoraceque teſtaceis, elytris brunneis: margine, lineola baſeos faſciaque media flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 50.
Habitat in Cayenna, *parvus.*

ſtolatus. 173. Cr. thorace rufo, elytris flavis: vitta nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 90. *n.* 51.
Habitat in Carolina, *pedibus flaveſcentibus: geniculis nigris.*

cratægi. 174. Cr. ruber, elytrorum linea longitudinali punctoque nigris. *Forſt. nov. inſ. ſp. cent.* 1. *p.* 28. *n.* 28.

Ha-

Habitat in Angliæ *cratægo oxyacantha, ſubtus niger, ſtatura & magnitudine cr. nymphææ.*

trifuſcatus. 175. Cr. niger, thorace elytrisque pallidis, elytris margine & ſutura, furca tridente, punctisque octo nigris. *Forſt. nov. inſ. ſp. cent.* 1. *p.* 29. *n.* 29.
Habitat in America *ſeptentrionali, magnitudine & habitu ochropodis.*

parvus. 176. Cr. fuſcus, capite bimaculato, antennarum baſi fulva. *Herbſt apud Fuesslii arch. inſ.*4. *p.*66. *n.* 4.
Habitat Berolinii, *cupreo dimidio minor.*

palleſcens. 177. Cr. pallidus, capite nigro, antennis flaveſcentibus. *Herbſt apud Fuesslii arch. inſ.*4. *p.*66. *n.* 5.
Habitat Berolini, *cr. nymphææ paulo major.*

erythropus. 178. Cr. totus ruber, femoribus ſolis ad finem nigris. *Herbſt apud Fuesslii arch.inſ.*4. *p.*67.*n.*6.
Habitat Berolini, *merdigero proxime affinis.*

beroliniſis. 199. Cr. capite & thorace coccineis glaberrimis, elytris granulatis oculisque nigris, pedibus fulvis. *Herbſt apud Fuesslii arch inſ.* 4. *p.*67. *n.*12.
Habitat Berolini, *melanopode duplo minor.*

ochraceus. 180. Cr. ochraceus, thoracis puncto & abdomine nigris, ano fulvo. *Herbſt apud Fuesslii arch. inſ.* 7. *p.* 165. *n.* 16. *t.* 44. *f.* 9. p. q.
Habitat in India, 3 *lineas longus.*

fulvipes. 181. Cr. ater nitens, antennarum baſi pedibusque ſupra fulvis. *Herbſt apud Fuesslii arch. inſ.* 7. *p.* 165. *n.* 17.
Habitat in Auſtria, 2 *lineas longus.*

tri-

triſtis. 182. Cr. niger, elytris cæruleis punctato-ſtriatis, pedibus fulvis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 7. p. 165. n. 18.*
Habitat in Auſtria, *cyanellæ ſimilis, ſed minor, ſeſquilineam longus.*

nigricans. 183. Cr. niger, thorace pedibusque rubris. *Geoffr. inſ. par. 1. p. 231. n. 1. t. 4. f. 2.* Luperus niger.
Habitat in Gallia.

erytromelas. 184. Cr. niger, pedibus rufis. *Geoffr. inſ. par. 1. p. 231. n. 2.* Luperus rufipes.
Habitat in Gallia.

æruginoſus. 185. Cr. pallidus, capite & pectore nigris, elytris viridibus politis.
Mull. zool. dan. prodr. p. 84. n. 913. Luperus æruginoſus.
Habitat in Dania.

aquaticus. 186. niger, thorace maculato, elytrorum margine ſuturaque lata, pedibusque flavis.
Mull. zool. dan. prodr. p. 83. n. 908.
Habitat in Daniæ *aquis; an hujus tribus?*

veris. 187. Cr. niger, thorace cupreo, elytris viridibus, pedibus rufis.
Mull. zool. dan. prodr. p. 83. n. 910. Galleruca veris.

ſtriatus. 188. Cr. ater, capite ſupra, elytris & abdomine apice albidis.
Mull. zool. dan. prodr. p. 85. n. 940. Crioceris ſtriata.
Geoffr. inſ. par. 1. p. 307. n. 3. t. 5. f. 2. Authribus, &c.
Schaeff. ic. t. 89. f. 6.
Habitat in Europa.

ruf-

rufficus. 189. Cr. viridis, elytris flavis, pedibus anterioribus longioribus.
Lepech. it. I. *p.* 312. *t.* 16. *f.* 10. Chryſomela longipes.
Habitat in Ruſſia *auſtrali.*

luſitanicus. 190. Cr. teſtaceus, capite, pectore pedibusque nigris.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 1066. *n.* 2. Chryſomela luſitanica.
Habitat in Luſitania, *habitu tridentati.*

tricolor. 263. Cr. nigra, thorace cylindrico ad latera gibbo, capite elytrorum ſutura marginibusque ferrugineis, elytris teſtaceis, pedibus antennis palpisque flavo-rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 354.
Habitat in Europa.

melanophthalmus. 264. Cr. thorace cylindrico ad latera gibbo luteo-rufeſcente, capite rufo, poſterius nigro, elytris polline rufo, abdomine argenteo conſpersis. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 3. 55.
Habitat in Europa.

gibbus. 265. Cr. thorace cylindrico ad latera gibbo, capite, thorace pedibusque flavo-rufeſcentibus, elytris nigris profunde punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 356.
Habitat in Europa.

fuliginoſus. 266. Cr. niger, thorace pedibusque rufis, elytris lævissime punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 357.
Habitat in Europa.

ochropus. 267. Cr. niger, elytris fuſcis, thorace antennarum baſi pedibusque flavis, femoribus baſi fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 17. *n.* 358.
Habitat in Europa.

** *pal-*

** *palpis inæqualibus, anterioribus securiformibus.*

† *labio corneo*, Erotyli.

gigan-teus. 191. Cr. ovatus niger, coleoptris punctis fulvis numerosissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 157. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 91. *n.* 1.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 586. *n.* 1. Chrysomela gigantea.
Degeer inf. 5. *p.* 349. *t.* 16. *f.* 8. Chrysomela oblonga nigra, &c.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 8. & *f.* 15. Coccinella gigantea.
Habitat in India.

cancellatus. 192. Cr. ater, elytris flavis nigro-reticulatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 91. *n.* 2.
Habitat in Brasilia, *magnus, fere globosus.*

Histrio. 193. Cr. ater, elytris nigro flavoque fasciatis, macula baseos apicisque coccinea. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 91. *n.* 3.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

lugubris. 194. Cr. testaceus, antennis tibiisque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 157. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 91. *n.* 4.
Habitat in America.

gibbosus. 195. Cr. niger, elytris flavescentibus nigro-punctatis: fascia media & posteriore nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 157. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 91. *n.* 5. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 586. *n.* 2. *Amæn. ac.* 6. *p.* 393. *n.* 13.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 117. *n.* 8 ? *mant. inf.* 1. *p.* 67. *n.* 10 ? Chrysomela gibbosa.
Gron. zooph. 606. *t.* 14. *f.* 5. Coccinella.
Habitat in America *meridionali.*

po-

pustulatus. 196. Cr. ater elytris fasciis quinque punctorum fulvorum. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 498. *mant. inf.* 1. *p.* 91. *n.* 6.
Habitat - - - *giganteo affinis, sed non gibbosus.*

concatenatus. 197. Cr. ater, elytris flavo nigroque reticulatis: fasciis duabus atris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 91. *n.* 7.
Habitat - - - *magnus.*

quinque-punctatus. 198. Cr. ovatus, elytris nigris: punctis quinque rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 157. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 91. *n.* 8.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 586. *n.* 3. Chrysomela quinque-punctata.
Gron. zooph. 613. *t.* 16. *f.* 7. Coccinella coleoptris nigris punctato-impressis: maculis decem rubris.
Habitat in America.

punctatissimus. 199. Cr. niger, elytris flavis: punctis numerosissimis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 157. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 91. *n.* 9.
Habitat in America.

varius. 200. Cr. ater, elytris punctatis medio fulvo maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 157. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 10.
Habitat Surinami, *statura punctatissimi, at minor, thorace atro, punctis quasi cicatricibus notato.*

macrocheiros. 201. Cr. ater, elytris fasciis atris flavisque undatis alternis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 11.
Habitat in India, *variegato affinis, at paulo major.*

fasciatus. 202. Cr. ater, elytris fasciis tribus flavescentibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 12.
Ha-

Habitat - - - *mediæ magnitudinis.*

Zebra. 203. Cr. flavescens, capite, thoracis basi, fasciis tribus elytrorum pedibusque atris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 13.
Habitat in Cayenna, *reliquis hujus tribus minor, capite atro.*

imma-culatus. 204. Cr. ater immaculatus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 14.
Habitat in nova Hollandia.

vene-reus. 205. Cr. ater, thorace elytrisque cupreis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 15.
Habitat in nova Hollandia.

nebulo-sus. 206. Cr. ater, thorace elytrisque ferrugineo variis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 16.
Habitat in insulis, Americæ *meridionali oppositis, mediæ magnitudinis.*

dilata-tus. 207. Cr. ater, thorace elytrisque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 17.
Habitat ad Caput bonæ spei.

smara-gdulus. 208. Cr. ater, elytris striatis viridibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 18.
Habitat in nova Hollandia.

ame-thysti-nus. 209. Cr. ater, thorace elytrisque cyaneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 19.
Habitat in nova Hollandia.

bicolor. 210. Cr. ater, supra æneus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 92. *n.* 20.
Habitat in nova Hollandia.

ki-

kilonienſis. 211. Cr. niger, pedibus piceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 21.
Habitat Kilonii.

jamaicenſis. 212. Cr. viridis nitidus punctatus, antennis pedibusque flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 92. *n.* 22.
Habitat in Jamaica, *antennis elongatis, ore piceo.*

cichorei. 213. Cr. ore porrecto, roſtro depreſſo elongato oblongo. *Hoffelq. it. p.* 449. *n.* 101.
Habitat in Orientis *cichoreo, medius quaſi inter cryptocephalos, dermeſtes, curculiones, cantharides; an ex hac tribu?*

†† *labio membranaceo*, Lagriæ.

æneus. 214. Cr. obſcure æneus immaculatus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 1.
Habitat in Americæ *meridionali oppoſitis inſulis.*

tahitienſis. 215. Cr. lividus, oculis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 2.
Habitat in inſula Tahiti.

pacificus. 216. Cr. lividus, thorace lineis, elytris vitta fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 3.
Habitat in nova Seelandia.

fuſcicornis. 217. Cr. cyaneus, antennis fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 4.
Habitat in nova Hollandia.

meridionalis. 218. Cr. rufus, elytris fuſcis: marginibus lineaque media rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 5.
Habitat in America *meridionali, eleganti affinis, at duplo major.*

clo-

elegans. 219. Cr. rufus, elytris vitta abdomineque apice fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 6.
Habitat in America *meridionali.*

rufifrons. 220. Cr. cyaneus, capite thoraceque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 7.
Habitat in America *boreali.*

elongatus. 221. Cr. ater, thorace rufo villoso. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 8. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 603. *n.* 122. Chrysomela elongata.
Habitat in Europa, *præsertim* Anglia.

ambulans. 222. Cr. glaber ater, elytris punctatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 9.
Habitat in Germania, *elongato proxime affinis, at thorax ater.*

tuberculatus. 223. Cr. ovatus glaber ater, elytris tuberculatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 10.
Habitat in Cayenna, *villoso major.*

villosus. 224. Cr. villosus ater, thorace elytrisque viridibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 11.
Habitat ad Caput bonæ spei, *hirto proxime affinis.*

pubescens. 225. Cr. niger, thorace marginato villoso, elytris glabris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 93. *n.* 12. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 603. *n.* 120. Chrysomela pubescens.
Habitat in Germania, *hirto affinis.*

hirtus. 226. Cr. villosus niger, thorace tereti, elytris testa-

ſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*160. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 93. *n.* 13.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 119. *Fn. ſuec.* 578.* Chryſomela hirta.
Degeer inſ. 5. *p.* 446. *t.* 2. *f.* 23. 24. Tenebrio alatus villoſus niger, &c.
Habitat in Europæ *ſaponariis.*

indus. 227. Cr. cyaneus, pedibus longitudine corporis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 603. *n.* 121. Chryſomela inda.
Habitat in India, *magnitudine ſcarabæi ſtercorarii.*

ventralis. 228. Cr. villoſus cyaneus, elytris lineis elevatis tribus, abdomine rufo. *Fabr. mant. inſ.*1.*p.*93. *n.* 14.
Habitat in India, *tomentoſo affinis.*

tomentoſus. 229. Cr. villoſus cyaneus, abdomine femoribusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 15.
Habitat in nova Hollandia, *elytris rarius fuſcis.*

glabratus. 230. Cr. glaber, thorace rufeſcente, elytris flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 16.
Habitat in Anglia.

ſcutellaris. 231. Cr. niger, cinereo-hirtus, ſcutello albo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 17.
Habitat in Hiſpania, *ſtatura & magnitudine tritici.*

niger. 232. Cr. piloſus niger, elytris lævi-ſculis ſerratis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 94. *n.* 19.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 564. *n.* 28. *Fn. ſuec.* 439. Dermeſtes niger.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 71. *n.* 5. Anobium nigrum.
Scop. ent. carn. 131. Cantharis biloſa. bar-

barbarus. 233. Cr. antennis ferratis, hirtus, obscure æneus.
Fab. mant. inf. 1. *p.* 94. *n.* 23.
Habitat in Barbariæ *floribus compositis, dermesti hirto affinis.*

antherinus. 234. Cr. niger, elytris fascis duabus ferrugineis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 160. *n.*14. *mant. inf.* 1.*p.*94. *n.* 24.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 681. *n.* 16. *Fn. suec.* 829. Meloe antherinus.
Syst. nat. X. *p.* 418. *n.* 7. Tenebrio pedicularius.
Habitat frequens in floribus, agilis, cursitans, vix pediculo major.

floralis. 235. Cr. niger, thorace ferrugineo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 25.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 681. *n.* 15. *Fn. suec.* 829 ? Meloe floralis.
Habitat in Europæ *plantis.*

Marchiæ. 236. Cr. niger villosus, thorace cylindrico capitisque margine posteriore rubris, elytris striatopunctatis.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. *p.* 68. *n.* 2. *t.* 23. *f.* 35.
Habitat Berolini, 4 *lineas longus.*

++ *dubiæ species.*

caraboides. 237. Cr. niger, elytris subcæruleis, plantis ferrugineis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 602. *n.* 115. *Fn. suec.* 574. Chrysomela caraboides.
Habitat in Europa.

punctulatus. 238. Cr. viridi-æneus punctatissimus, pedibus ferrugineis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 108.

Amæn. ac. 6. *p.* 394. *n.* 18. Chrysomela punctatissima.
Habitat Surinami.

lampyroides. 239. Cr. elytris subtomentosis nigris : linea longitudinali margineque pallidis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 601. *n.* 107. Chrysomela tomentosa.
Habitat in Carolina, *cr. capreæ affinis, facie lampyridis, lividus.*

200. HISPA. *Antennæ* cylindricæ, basi approximatæ, inter oculos sitæ.
Palpi fusiformes.
Thorax & *elytra* sæpius aculeata.

atra. 1. H. corpore toto atro. *Schr. der berl. Naturf. Ges.* 4. *t.* 7. *f.* 6.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 83. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 47. *n.* 9. Hispa antennis fusiformibus, thorace elytrisque spinosis, corpore atro.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 243. *n.* 7. Crioceris atra spinis horrida.
Habitat in Europa *australi* & Africa *boreali ad radices graminum.*

testacea. 2. H. corpore testaceo, antennis aculeisque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 83. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 47. *n.* 10.
Habitat in Barbaria, *atræ magnitudine*; *thorace spina sextuplici armato.*

bihamata. 3. H. inermis nigra, rubro-maculata, elytris truncatis hamatis.
Habitat in India, *oblonga, depressa, cr. capreæ magnitudine.*

mutica. 4. H. inermis, antennis pilosis.

Hab.

Fn. ſuec. 413. Dermeſtes (clavicornis) niger, antennis clavatis piloſis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 83. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.*7. Hiſpa antennis piloſis, nigra, elytris ſtriatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 47. *t.* 3. *f.* 1. Tenebrio hirticornis.
Habitat in Europæ *quiſquiliis*, *muſeis.*

sanguinicollis. 5. H. inermis atra, thorace ſanguineo. *Mant.*530. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 83. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.*11. Hiſpa antennis fuſiformibus, thorace elytrorumque baſi ſanguineis, elytris ſerratis.
Habitat in America *meridionali.*

ſerrata. 6. H. antennis fuſiformibus, nigra, elytris ruſcſcentibus apice ſerratis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 48. *n.* 12.
Habitat Surinami, *ſtatura ſanguinicollis.*

picipes. 7. H. antennis fuſiformibus, atra, elytris pedibusque piceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 8.
Habitat Halæ Saxonum, *congeneribus longior.*

cornuta. 8. H. tota atra, thorace anterius poſteriusque ſpinoſo, elytris porcatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 15. *n.* 25. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat in Suecia, *opatri ſabuloſi magnitudine, ſed anguſtior.*

ſcabra. 9. H. tota nigra, thorace alato elytrisque margine ſerrato-ciliatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 15. *n.* 26. *t.* 1. *f.* 6.
Habitat in Suecia, *ſilphæ ferrugineæ magnitudine.*
Huic & cornutæ, & ſcabræ antennæ fuſiformes.

capenſis. 10. H. picea hiſpida, thoracis ſpina palmata. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 66. *f.* 76.

Habitat ad Caput bonæ ſpei, *pediculi majoris magnitudine, colore nigro & piceo varians.*

angulata. 11. H. antennis fuſiformibus, flava, capite, thoracis linea dorſali elytrorumque margine ſinuato nigris. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 379.
Habitat in Cayenna.

dentata. 12. H. antennis filiformibus, nigra, thoracis margine, elytrorum ſerratorum macula baſeos faſciaque media flavis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 378.
Habitat in Cayenna.

cærulea. 13. H. antennis ſubſerratis cærulea hirta. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 7.
Habitat in Germania.

bipuſtulata. 14. H. antennis ſerratis, atra hirta, elytris macula baſeos rufa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 6.
Habitat in Italia, *dermeſte hirto minor.*

cornigera. 15. H. antennis ſerratis, thorace rufo, elytris cæruleis, capite bicorni. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 5.
Habitat in Anglia, *an proprii generis?*

ferraticornis, 16. H. fuſca, antennis ſerratis, elytris ſtriatis. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 5. *n.* 8. Ptinus ſerraticornis.
Habitat Upſaliæ, *ptini mollis magnitudine.*

pectinicornis. 17. H. fuſca, antennis pectinatis, pedibus luteis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 565. *n.* 1. Ptinus pectinicornis.

Fa-

Fn. ſuec. 412. Dermeſtes pectinicornis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 65. *n.* 2. Ptinus atro-fuſcus, &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 6.
Habitat in Europæ *quiſquiliis*, *coryli foliis*.

bicornis. 18. H. antennis pectinatis, thorace elytrisque viridi-æneis, capite bicorni. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 82. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 4.
Habitat in America *boreali*, *an hujus generis?*

flabellicornis. 19. H. nigra, antennis pectinatis, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 2.
Schaeff. ic. t. 215. *f.* 3?
Habitat in Anglia.

myſtacina. 20. H. antennis pectinatis, elytris ſtriatis albo punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 81. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 47. *n.* 1.
Drury inſ. 3. *t.* 48. *f.* 7.
Habitat in nova Hollandia, *prægrandis*.

201. BRUCHUS. *Antennæ* filiformes.
Palpi æquales, filiformes.
Labium acuminatum.

piſi. 1. Br. elytris nigris albo-maculatis, podice albo: punctis binis nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 35. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 74. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 41. *n.* 4. *Syſt. nat.* X. *p.* 356. Dermeſtes piſorum.
Amœn. ac. 3. *p.* 347. Curculio piſorum.
Kalm. it. II. *p.* 294. Bruchus Americæ ſeptentrionalis.
Degeer inſ. 5. *p.* 278. *n.* 1. *t.* 16. *f.* 3. 4. Bruchus nigro-fuſcus, &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 267. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 9. Mylabris fuſca cinereo-nebuloſa, &c.

Scop.

Scop. ent. carn. 63. Laria salicis.
Ledermull. micr. 195. *t.* 100.
Gron. zooph. 569. *
Habitat in America *septentrionali*, *nuperius quoque in* Europa *australi*, *pisorum agros devastans*, *pomonæ etiam floribus infestus*, *devoratur a graculo quiscula.*

umbellatarum. 8. Br. squamosus supra griseus, subtus cinereus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 3.
Habitat in Barbariæ *ambulatis*, *magnus.*

Robiniæ. 9. Br. griseo-nitidulus, elytris vix abdomine brevioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 5.
Habitat in Robiniæ Pseudacaciæ *ex* America *allatis seminibus*, *magnus.*

gibbosus. 10. Br. thorace gibboso cupreo, elytris nigris tuberculato-spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 6.
Habitat in America *boreali.*

scabrosus. 11. Br. niger, elytris rufis elevato-striatis: punctis nigris sparsis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 7.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. *p.* 28. *n.* 1. *t.* 20. *f.* 15.
Habitat in Europæ *potissimum æsculo.*

clathratus. 12. Br. totus niger, thorace albido-cancellato, elytrorum striis ex nigro & griseo variis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 7. *p.* 158. *n.* 5.
Habitat Berolini, *scabrosi statura & magnitudine.*

Cacao. 13. Br. corpore fusco griseo-maculato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 8.
Habitat in Theobromatis *seminibus.*

un-

undatus. 14. Br. niger, elytris fuscis: strigis undatis albis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 9.
Habitat in Africæ *floribus, mediæ magnitudinis.*

Theobromatis. 2. Br. elytris griseis nigro-maculatis, pedibus rufis, scutello albo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 10.
Habitat in Theobromatis *seminibus, indicus, ex nigro canescens, br. pisi dimidio minor.*

marginalis. 15. Br. niger, elytris cinereis: maculis tribus nigris margine connexis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 11.
Habitat in Germania.

canalis. 16. Br. subferrugineus, elytris apice atris, ano atro: linea media alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 12.
Habitat in India, *parvus.*

bipunctatus. 17. Br. cinereus, elytris fuscis: puncto baseos ocellari atro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 75. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 13.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* 2.
Habitat in Helvetiæ *plantis.*

varius. 18. Br. elytris nigris: punctis albis nigrisque alternis striatis, femoribus muticis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 14.
Habitat in Sueciæ *pinetis, statura bipunctati.*

Gleditschiæ. 3. Br. elytris striatis longitudine abdominis, corpore piceo, antennis nigris.
Amœn. ac. 6. *p.* 392. *n.* 5. Dermestes Gleditsiæ.
Habitat in Americæ *septentrionalis Gleditschiæ seminibus.*
Femora *mutica.*

spi-

spinosus. 19. Br. griseus, thorace elytrisque spinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 74. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 1.
Habitat in Jamaica.

Baetris. 4. Br. cinereus, elytris sublævibus, femoribus posterioribus ovatis, tibiis incurvis. *Amœn. ac.* 6. *p.* 392. *n.* 6. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 41. *n.* 2.
Jacq. hist. stirp. amer. t. 170.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. *p.* 28. *n.* 3. *t.* 20. *f.* 16.
Habitat in Baetris, *palmæ americanæ, nucleis.*

rufipes. 20. Br. niger, elytris albo-punctatis, pedibus anterioribus rufis, posterioribus nigris unidentatis.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. *p.* 29. *n.* 4.
Habitat in Pomerania, *granario proxime affinis, at minor, an varietas?*

granarius. 5. Br. elytris nigris: atomis albis, femoribus posterioribus unidentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 76. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 15.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 605. *n.* 5. Bruchus elytris nigris: atomis albis, pedibus anticis rufis, posticis dentatis.
Fn. suec. 628. Curculio atomarius. *
Habitat in Europæ *plantarum seminibus.*

cisti. 21. Br. ater immaculatus, femoribus muticis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 76. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 16.
Habitat in cisti helianthemi *floribus frequens.*

abdominalis. 22. Br. niger, abdomine cinereo immaculato, pedibus anterioribus testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 76. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 17.
Habitat in India, *parvus.*

feminarius. 6. Br. ater, antennarum basi pedibusque anterioribus

ribus teſtaceis, femoribus muticis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 79. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 18. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 268. *n.* 3. Mylabris nigra, abdomine albo ſericeo.
Habitat in Europæ *floribus*, *pediculi magnitudine.*

maculatus. 23. Br. elytris punctatis teſtaceis nigro-maculatis, podice griſeo: punctis binis nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 14. 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 19.
Habitat in Americæ *ſeminibus.*

mimoſæ. 24. Br. teſtaceus immaculatus, elytris ſubſtriatis femoribus poſterioribus acute dentatis. *Fabr ſp. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 20.
Habitat in mimoſæ Americæ *meridionalis ſeminibus, ſeminario paulo major.*

ſerraticornis. 25. Br. antennis pectinatis corpore longioribus, corpore griſeo fuſco maculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 21.
Habitat in Oriente.

pectinicornis. 7. Br. antennis pectinatis corpore ferrugineo, longioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 77. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 42. *n.* 22.
Syſt. nat. X. *p.* 386. *n.* 79. Curculio chinenſis.
Degeer inſ. 5. *p.* 201. *n.* 2. Bruchus rufus.
Schaeff. elem. t. 86. *f.* 1.
Habitat in ſeminibus e Sina *allatis.*

PAUSUS. *Antennæ* biarticulatæ, clavatæ; clava ſolida, uncinata.

microcephalus. 1. P. *Dahl. diſſ. big. inſect. ſiſt. Upſ.* 1775. *Fuesslı Arch. Inſ.* 3. *p.* 1. *t.* 13.
Habitat in America *ſeptentrionali, totus niger, magnitudine dermeſtidis lardarii, capite minutiſſimo, thorace anguſto: anterius margine tranſverſo ele-*

va-

vato, elytris abdomine posterius fere truncato paulo longioribus truncatis.

ZYGIA. *Antennæ* moniliformes.
Palpi inæquales, filiformes.
Labium elongatum, membranaceum.
Maxilla unidentata.

oblonga. 1. Z. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 94. *n.* 1.
Habitat in Oriente, *oblonga, rufa, capite elytrisque obscure cyaneis.*

ZONITIS. *Antennæ* setaceæ.
Palpi quatuor filiformes, maxilla integra breviores.
Labium emarginatum.

chrysomelina. 1. Z. flavia, elytris puncto medio apiceque nigris. *Fabr. sp. inf. p.* 161. *n.* 1. *mant. inf.* 1, *p.* 95. *n.* 1.
Habitat in Oriente, Ægypto, *subtus atra, ano rufescente.*

flava. 2. Z. rufescens, elytris flavis apice nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 95. *n.* 2.
Habitat in Oriente.

APALUS. *Antennæ* filiformes.
Palpi æquales, filiformes.
Maxilla cornea, unidentata.
Labium membranaceum, truncatum, integrum.

bimaculatus. 1. Ap. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 95. *n.* 1. *Syst. nat.* 2. *p.* 680. *n.* 9. *Fn. suec.* 828.

828. *Uddm. diff.* 82. Meloe (bimaculatus) alatus niger, elytris luteis, macula nigra postica.
Degeer inf. 5. *t.* 1. *f.* 18. Pyrochroa bimaculata.
Habitat primo vere in Suecia *arenosis.*

BRENTUS. *Antennæ* moniliformes, ultra medium rostri exsertæ.
Os rostro porrecto, recto, cylindrico.

* *femoribus simplicibus.*

barbicornis. 1. Br. cylindricus, rostro longissimo subtus barbato, elytris elongato-elevatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 95. *n.* 1.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 171. *n.* 59. Curculio barbicornis.
Habitat in nova Seelandia.

affimilis. 2. Br. cylindricus, rostro apice glabro atro, elytris ferrugineo-subfasciatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 95. *n.* 2.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 171. *n.* 60. Curculio affimilis.
Habitat in nova Seelandia.

monilis. 3. Br. cylindricus ater, elytris acuminatis unistriatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 95. *n.* 3.
Habitat in nova Hollandia, *statura barbicornis, at minor.*

semipunctatus. 4. Br. cylindricus, thorace lineis, elytris punctis albis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 96. *n.* 4.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 171. *n.* 61. Curculio semipunctatus.
Habitat in nova Hollandia.

** *femoribus dentatis.*

Druryanus. 5. Br. æneus, thorace tereti, antennis rostro longio-

gioribus, elytris apice ſpinula mucronatis flavo-maculatis. *Pall. inſ. ruſſ.* 1. *p.* 16. *n.* 3.
Drury inſ. t. 42. *f.* 37.
Habitat - - -

Ancho-rago. 6. Br. linearis, elytris flavo-ſtriatis, thorace elongato. *Fabr. mant.* 1. *p.* 96. *n.* 5.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 182. *n.* 118.
Sulz. nat. XII. 2. *p.* 613. *n.* 56. *Muſ. Lud. Ulr.* 52. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 118. Curculio anchorago.
Degeer inſ. 5. *p.* 273. *n.* 8. *t.* 15. *f.* 28. Curculio longicollis.
Gron. zooph. 583. *t.* 15. *f.* 4.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 6.
Habitat in America *auſtrali &* India.

haſtile. 7. Br. aterrimus roſtro tenuiſſimo longo ad apicem ſubarcuato, thorace medio coarctato, elytris ſubſulcatis, apice ſubacuminatis. *Pall. inſ. ruſſ.* 1. *p.* 25. *n.* 2.
Habitat - - - *ſeſquipollicem longus, craſſitie vix libellæ puellæ.*

naſutus. 8. Br. femoribus omnibus tibiisque anterioribus dentatis, thorace elongato æneo, elytris acuminatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 96. *n.* 6.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 182. *n.* 119. Curculio naſutus.
Habitat in Jamaica, *anchoragini affinis, at paulo major.*

diſpar. 9. Br. linearis niger, elytris rubro ſtriatis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 96. *n.* 7.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 613. *n.* 55. *Muſ. Lud. Ulr.* 50. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 120. Curculio diſpar.
Pall. inſ. ruſſ. 1. *p.* 24. *t.* B. *f.* 4. Curculio anomaloceps.
Habitat in America. cy-

cylindricornis. 10. Br. thorace rotundato nigro-æneo, elytris ferrugineis flavo substriatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 96. *n.* 8.
Habitat in nova Seelandia, *statura & magnitudine disparis.*

bifrons. 11. Br. niger, elytris striatis: maculis glabris flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 96. *n.* 9.
Habitat in Cayenna, *statura anchoraginis.*

202. CURCULIO. *Antennæ* clavatæ insidentes rostro corneo, prominenti.
Palpi quatuor filiformes.

* *Longirostres.*
† *femoribus simplicibus.*

Gigas. 55. C. thorace elytrisque scabris, antennis apice albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 97. *n.* 1.
Habitat in Japonia.

palmarum. 1. C. ater, thorace supra plano, elytris abbreviatis striatis. *Mus. Lud. Ulr.* 42. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 162. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 97. *n.* 2.
Degeer inf. 5. *p.* 269. *n.* 4. *t.* 15. *f.* 26. Curculio longirostris, antennis fractis, &c.
Rumpf. amb. 1. *p.* 79. *t.* 17. *f.* g. Cossus saguarius.
Petiv. gazoph. t. 35. *f.* 5.
Scop. ann. hist. nat. 5. *p.* 89. *n.* 40.
Gron. zooph. 578. *t.* 16. *f.* 4.
Merian. surin. t. 48. *f.* 3.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 20.
Habitat in Indiæ *palmis.*
Larva *assata in deliciis. Jacq. Stirp. am.* 278.

cru-

cruentatus. 56. C. ater, thorace lineis, elytrisque punctis duobus sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 162. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 97. *n.* 3.
Habitat in Carolina, *c. palmarum minor.*

longipes. 96. C. nigricans, elytris ferrugineis, rostro emarginato, pedibus anterioribus longioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 162. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 97. *n.* 4. *Drury inf.* 2. *t.* 33. *f.* 3.
Habitat ad caput bonæ spei.

zaniæ. 550. C. ruber, thoracis linea nigra, rostro setaceo longissimo. *Thunb. nov. act. Upf* 4. *p.* 29. *t.* 1. *f.* 7.
Habitat ad caput bonæ spei, *in cycade caffra, larva hexapus, setis albidis obsessa intra squamas strobili feminei, nucibus rubraque carne hanc obvelante vicitans.*

exoticus. 554 C. griseus, thorace basi impresso, dorsi ruga brevi, elytris posterius gibbis: punctorum albo-rum ordinibus decem; interstitiis, profunde nigro punctatis. *Mus. Lesk. p.* 18. *n.* 368.
Habitat extra Europam.

brachypteros. 555. C. ater, thorace plano punctato: linea media parum elevata, elytris abbreviatis subistriatis: interstitiis punctatis. *Mus. Lesk. p.* 18. *n.* 374.
Habitat in Europa.

undatus. 556. C. niger, elytris ordine punctatis: fasciis undulatis interruptis albis. *Mus. Lesk. p.* 18. *n.* 379.
Habitat in Europa.

atomarius. 557. C. fuscus, elytris striatis: interstitiis lævissime punctatis atomis griseis pilosis adspersis, tibiis rufis. *Mus. Lesk. p.* 18. *n.* 380.
Habitat in Europa.

coc-

coccineus. 558. C. coccineus, elytris punctatis: punctorum ordinibus decem. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 381.
Habitat in Europa.

futuralis. 559. C. griſeus, elytris ſtriatis: futura albida nigro punctata, macula communi oblonga verſus apicem marginumque exteriorum poſteriorum punctis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 384.
Habitat in Europa.

indus. 2. C. ater, thorace ſubovato excavato punctato, elytris rugoſo-ſulcatis, tibiis ſpinoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 43. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 5.
Degeer inſ. 5. *p.* 265. *n.* 1. *t.* 15. *f.* 22.
Habitat in India.

paganus. 97. C. griſeus, thoraceis dorſo fuſco: arcubus cinereis, roſtro biſulcato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 6.
Habitat in America *auſtrali* & India.

Elephas. 98. C. fuſcus, thorace elytrisque varioloſis, elytris poſterius ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 7.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *magnus*.

hemipterus. 3. C. obſcure purpuraſcens, elytris abbreviatis, femoribus mediis ciliatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 44. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 8.
Degeer inſ. 5. *p.* 271. *n.* 5. *t.* 15. *f.* 25. Curculio rufo-faſciatus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 5.
Habitat in India.

va-

Curculionum longiroſtrium larvæ plurima fructus & ſemina, breviroſtrium vero folia conſumunt: ulvæ etiam caules conſumunt.

variegatus. 99. C. rufo nigroque varius, roſtro apice nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 9.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

alliariæ. 4. C. violaceus totus. *Fn. ſuec.* 580.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 53.
Fn. ſucc. 468. Curculio nigro-cæruleſcens.
Degeer inſ. 5. *p.* 251. *n.* 39. Curculio cæruleus.
Friſch inſ. 9. 35. *t.* 18.
Habitat in eryſimi alliariæ *caulibus, quos perforat.*

eryſimi. 100. C. niger, thorace bituberculato vireſcente, elytris cyaneis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 54.
Habitat Kilonii, *cyaneo proxime affinis, at magis gibbus.*

cyaneus. 5. C. ater, elytris violaceis ſcutello albo. *Fn. ſuec.* 581.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 55.
Degeer inſ. 5. *p.* 252. *n.* 41. Curculio longiroſtris, antennis rectis, &c.
Herbſt apud Fuesſli arch. inſ. 4. *p.* 70. *n.* 11. *t.* 24. *f.* 5. c.
Habitat in Europæ *borealis petiſſimum ſalicibus.*

craccæ. 6. C. gibbus ſupra ater, ſubtus cinereus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 56.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 606. *n.* 6. Curculio longiroſtris niger ovatus, roſtro ſubulato, abdomine pallido.
Degeer inſ. 5. *t.* 6. *f.* 31. 32? Curculio viciæ.
Habitat in Europæ *viciarum ſeminibus, pediculi magnitudine.*

malvæ. 101. C. griſeus, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 57.

Ha-

Habitat in Angliæ *malvis.*
Roſtrum & *abdomen atra.*

campanulæ. 7. C. niger ovatus elytris ſtriatis obtuſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 31. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 40. *Lesk. it. p.* 16. *t.* A. *f.* 5.
Degeer inſ. 5. *p.* 226. *n.* 23. Curculio longiroſtris, antennis fractis fuſcis, &c.
Habitat in campanulæ rotundifoliæ *pericarpiis incraſſatis.*

fuſciroſtris. 102. C. griſeus, pedibus rufis, roſtro femoribusque baſi nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 41.
Habitat in Germaniæ *plantis.*

roboris. 103. C. roſtro thoraceque rufis, elytris violaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 42.
Habitat in Saxoniæ *quercu, ſtatura & magnitudine fuſciroſtris.*

cupriroſtris. 104. C. oblongus viridi-æneus, elytris ſtriatis, roſtro cupreo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 43.
Habitat Dreſdæ, *in betula, parvus.*

nigriroſtris. 105. C. viridis roſtro atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 44.
Herbſt apud Fuesslii arch. inſ. 4. *p.* 69. *n.* 8. *t.* 24. *f.* 3.
Habitat in Angliæ *arvis.*

variabilis. 106. C. ſubteſtaceus, thorace viridi lineato, roſtro apice fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 45.
Habitat Hamburgii.

rufirostris. 107. C. niger, rostro dimidiato pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 167. *n.* 35. *mant. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 46.
Habitat in Anglia.

piciro-stris. 108. C. oblongus niger argenteo-holosericeus, rostro dimidiato pedibusque piceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 47.
Habitat Hafniæ, *rufirostri affinis, at major.*

salicariæ. 109. C. niger, antennarum basi, coleoptrorum disco tibiisque tellaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 167. *n.* 36. *mant. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 48.
Habitat in Angliæ *lythro salicaria, parvus.*

badensis. 8. C. niger, pedibus piceis.
Habitat in Germania, *magnitudine c. cerasi, thorace lævisculo ovato, elytris obsolete striatis, femoribus clavatis.* Dr. Blom.

æquatus. 9. C. æneus elytris rubris, rostro nigro elongato.
Habitat in Germania, *statura c. nucum, sed dimidio minor.*

cerasi. 12. C. ater, antennis ferrugineis, thorace bituberculato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 167. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 138.
Habitat in foliis pruni cerasi.

quadrituberculatus. 110. C. thorace quadrituberculato nigro, elytris striatis cinereo variegatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 39.
Habitat Kilonii, *parvus.*

acridulus. 13. C. piceus, abdomine ovato. *Fn. suec.* 584. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 46. *mant. inf.* 1. *p.* 102. *n.* 62.

Geoffr.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 91. Curculio pyriformis nigro-cæruleſcens.
Degeer inf. 5. *p.* 225. *n.* 22. Curculio longiroſtris antennis fractis fuſcis, &c.
Ins. Austr. Faesst arch. inf. 4. *t.* 24. *f.* 12.
Frauenf. Icones in Europæ *borealis* & Calabriæ *floribus tetradynamis.*

flavipes. 111. C. ater, femoribus luteis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 47. *mant. inf.* 1. *p.* 102. *n.* 63.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 272. *n.* 8. Rhinomacer ſubglobuſus, &c.
Habitat frequens primo vere in Europæ *locis apricis caſtais.*

purpureus. 14. C. purpureus nitens, roſtro longiſſimo. *Fn. ſuec.* 585. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 48. *mant. inf.* 1. *p.* 102. *n.* 64.
Degeer inf. 5. *p.* 250. *n.* 38. Curculio roſtro longiſſimo, &c.
Petiv. gaz. t. 22. *f.* 5.
Liſt. loc. 294.
Berg ſtr. vorvenel. 1. 16. 12. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat in Europæ *plantis, frumentario proxime affinis.*

frumentarius. 15. C. ſanguineus. *Fn. ſuec.* 586. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 49. *mant. inf.* 1. *p.* 102. *n.* 65.
Degeer inf. 5. *p.* 251. *n.* 40.
Act. Stockh. 1750. *p.* 186. *n.* 1.
Act. nidroſ. 3. *p.* 391.
Leeuwenh. arc. nat. 168. *augm.* 6. *p.* 83. *f.* 3.
Habitat in Europæ frumento *diutius aſſervato, peſſimus.*

bituberculatus. 112. C. ferrugineus, thorace longitudine elytrorum punctisque duobus dorſalibus elevatis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 58. *mant. inf.* 1. *p.* 103. *n.* 76.

Habitat in nova Seelandia, *granario proxime affinis.*

oryzæ. 113. C. piceus, thorace punctato longitudine elytrorum, elytris punctis duobus rufis. *Fabr. Sp. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 57. *mant. inf.* 1. *p.* 103. *n.* 75. *Amæn. acad.* 6. *p.* 395. *n.* 19. Curculio (oryzæ) longirostris oblongus niger, elytris maculis quatuor ferrugineis, femoribus muticis.
Habitat in oryza, *diutius observata.*

granarius. 16. C. piceus, thorace punctato longitudine elytrorum. *Fn. suec.* 587. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 56. *mant. inf.* 1. *p.* 103. *n.* 74. *Scop. ent. carn.* 89.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 285. *n.* 18. Curculio rufotestaceus, &c.
Degeer inf. 5. *p.* 239. *n.* 25. Curculio longirostris, antennis fractis, &c.
Raj. inf. 88. Scarabæus parvus fordide fulvus. &c.
Joblot obs. microscop. 1754. *t.* 7. *f.* 1.
Wilcke act. Stockh. 37. *tr.* 4. *nr.* 2.
Habitat in frumento *diutius in granariis asservato, pessimus; isatide, hyoscyamo, sambuco, thlaspidi pelli dicitur.*

dorsalis. 17. C. elytris rubris: futura nigra. *Fn. suec.* 588. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 50. *mant. inf.* 1. *p.* 102. *n.* 66.
Fn. suec. 1. *n.* 475. Curculio niger elytris in medio rufescentibus.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. *t.* 44. *f.* 10. *r. f.*
Habitat in Europæ *borealis ranunculo ficaria.*

melanocardius. 18. C. cinereus, coleoptris macula communi cordata fusca. *Mus. Lud. Ulr.* 18. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 163. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 97. *n.* 10.
Sulz. hist. inf. 40. *t.* 4. *f.* 11.
Habitat in India.

cru-

cruciatus. 114. C. niger, thorace ſubſpinoſo: lineis, elytris poſterius cruce albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 11.
Habitat in nova Hollandia.

ſtriatulus. 115. C. niger, elytris holoſericeo-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 12.
Habitat in inſula terræ novæ.

Rubetra. 116. C. ater lævis immaculatus, femoribus ſulcatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 13.
Habitat in Cayenna, *magnitudine c pini.*

pini. 19. C. elytris teſtaceis: faſciis nebuloſis. *Fn. ſuec.* 589.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 97. *n.* 14.
Degeer inſ. 5. *p.* 222. *n.* 15. Curculio longiroſtris, antenis fractis, &c.
Friſch inſ. 11. *t.* 23. *f.* 5.
Habitat in pinus ſylveſtris *cortice, cum c. abietis aliquando copula junctus.*

onopordi. 117. C. niger cinereo-villoſus, roſtro atro: utrinque ſulco abbreviato baſeos. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 15.
Habitat in Africæ *onopordis, vittato affinis, at major.*

ſtolatus. 118. C. ferrugineo fuſcus albo-lineatus, roſtro nigro: utrinque ſulco abbreviato baſeos. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 16.
Habitat in Italia, *majuſculus.*

jaceæ. 119. C. niger cinereo irroratus, elytris puncto baſeos diſtincto. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 98. *n.* 17.
Habitat in Centauria Jacea, *adultior magis glaber.*

pun-

punctu-latus. 120. C. flavo fuscoque varius, abdomine cinereo nigro punctato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 98. *n.* 18. *Habitat in* America, *statura c. jaceæ, at paulo minor.*

cynaræ. 121. C. niger virescenti irroratus, rostro nigro subcarinato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 98. *n.* 19. *Habitat in* Africæ *floribus cynaræ, c. jaceæ affinis, at duplo fere major.*

Colon. 122. C. griseus, elytris puncto albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 164. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 98. *n.* 20. *Mant. p.* 131. Curculio longirostris canescens, femoribus anticis subdentatis, thorace utrinque linea, elytrisque puncto albo.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 280. *n.* 6. Curculio oblongus fuscus. *Scop. ent. carn.* 104. Curculio paludstris.
Schaeff. ic. t. 155. *f.* 2.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. *p.* 68. *n.* 3. *t.* 24. *f.* 1.
β) Curculio (semicolon) nigricans. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 69. *n.* 4.
Habitat in Germania.

bimaculatus. 123. C. fuscus, elytris puncto cinereo, rostro pedibusque atris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 98. *n.* 21. *Habitat* Halæ Saxonum, *statura c. Colon, at paulo minor.*

biguttatus. 124. C. niger, elytris puncto elevato, abdomine pedibusque posterioribus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 164. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 22. *Habitat in* Germania.

bilineatus. 125. C. fuscus, elytris lineis duabus punctorum albornm. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 164. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 23.

Ha-

Habitat in Germania, *mediæ magnitudinis.*

tessellatus. 126. C. cinereus, elytris apice striis albis nigro punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 165. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 24.
Habitat in Germania, *mediæ magnitudinis.*

decurtatus. 127. C. ater, thorace plano punctato, elytris abbreviatis subtriatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 25.
Habitat Halæ saxonum, *statura fere c. palmarum, at quadruplo minor.*

equiseti. 128. C. thorace lævi, elytris muricatis nigris: punctis duobus apiceque albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 165. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 26.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. *p.* 69. *n.* 5. *t.* 24. *f.* 2.
Habitat in Angliæ *equiseto arvensi.*

Bufo. 129. C. fuscus, elytris subreticulatis: fascia media alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 165. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 27.
Habitat in Sibiria.

atrirostris. 130. C. cinereus, rostro arcuato atro. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 499. *mant. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 28.
Habitat Lipsiæ, *magnitudine & statura c. equiseti.*

cupreus. 21. C. obscure æneus subtus obscurior. *Fn. suec.* 593. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 166. *n.* 26. *mant. inf.* 1. *p.* 608. *n.* 21.
Habitat in Europa.

Tragiæ. 131. C. æneus, rostro pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 166. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 100. *n.* 35.
Habitat in Tragiæ volubilis *seminibus c* Brasilia *allatis.*

æne-

æneus. 132. C. niger, elytris æneis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 36.
Habitat in Angliæ *nemoribus.*

curvi-roſtris. 133. C. ater nitidus, roſtro arcuato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 100. *n.* 37.
Habitat in nova Hollandia, *parvus.*

ſcaber. 22. C. cinereus, pedibus rufis, elytris ſcabris. *Fn. ſuec.* 592. *
Habitat in Europæ *urticis.*

T. album. 23. C. ater, abdomine ad latera & poſterius albo. *Fn. ſuec.* 594. *
Habitat in Weſterbothnia.

ruficollis. 24. C. ferrugineus, elytris capitisque baſi atro-cæruleis. *Fn. ſuec.* 595. *
Habitat in Europa.

Dryados. 134. C. cinereus, thoracis dorſo fuſco, elytris teſtaceis cinereo-undatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 67.
Habitat in Sueciæ *quercu, parvus.*

futuralis. 135. C. ovatus fuſcus, linea longitudinali alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 68.
Habitat in Germaniæ *ſalice.*

crux. 136. C. ater, thorace punctis duobus baſeos, elytris futura punctisque ſparſis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 69.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 4. *p.* 70. *n.* 14. *t.* 24. *f.* b. d.
Habitat Hamburgi.

exclamationis. 137. C. ater, elytris puncto lineolaque apicis albis.

bis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 70.
Habitat in nova Hollandia.

venuſtus. 138. C. fuſcus, thorace elytrisque albo lineatis, pedibus teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 170. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 71.
Habitat in Anglia, *parvus.*

plantaginis. 139. C. elytris cinereis: macula media fuſca. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 103. *n.* 72.
Habitat Halæ Saxonum, *ſtatura c. rumicis.*

viſcariæ. 27. C. ſubrotundus cinereus, thorace elytrisque cinereo-virentibus. *Fn. ſuec.* 598. *
Habitat in lychnidis viſcariæ *fructificationibus.*

bipunctatus. 28. C. cinereus elytris macula nigra, tibiis flavescentibus. *Fn. ſuec.* 599. *
Habitat in Europa.

quadrimaculatus. 29. C. nigricans, coleoptris maculis quatuor albidis. *Fn. ſuec.* 600. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 58. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 287. *n.* 22. Curculio cinereus, &c.
Habitat in Europa.

unifaſciatus. 140. C. ſupra fuſcus, faſcia media cinerea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 101. *n.* 59.
Habitat Halæ Saxonum, *mediæ magnitudinis.*

bifaſciatus. 141. C. niger, elytris faſciis duabus cinereis: baſeos majore undata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 102. *n.* 60.
Habitat in Kilonii *plantis.*

lythri. 142. C. ater, elytris faſcia media abbreviata puncto-

ctoque posteriore albis, pedibus flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 102. *n.* 61.
Habitat in Uplandiæ *floribus lythri*, *parvus*.

quinquemaculatus. 30. C. griseus, coleoptris maculis quinque albis. *Fn. suec.* 601. *
Habitat in Europa.

pericarpius. 31. C. subglobosus nebulosus elytrorum sutura basi alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 167. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 101, *n.* 49.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 609. *n.* 31. *Fn. suec.* 602. * Curculio longirostris subglobosus, nebulosus, coleoptris macula cordata alba.
Habitat in scrophulariæ *pericarpiis*.

fisymbrii. 143. C. albo fuscoque varius, elytris puncto basi seos elevato atro, rostro nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 168. *n.* 38. *mant. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 50.
Habitat Kilonii, *in fisymbrio amphibio*.

capreæ. 144. C. coleoptris fasciis duabus abbreviatis undatis albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 168. *n.* 39. *mant. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 51.
Habitat in Angliæ *salice caprea*, *parvus*.

Rana. 145. C. thorace fusco: limbo testaceo, elytris testaceis: fasciis tribus undatis cinereis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 101. *n.* 52.
Habitat Kilonii, *parvus*, *gibbus*.

paraplecticus. 34. C. cylindricus subcinereus, elytris mucronatis. *Fn. suec.* 604. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 62. *mant. inf.* 1. *p.* 103. *n.* 77.
Fn. suec. 445. *It. scan.* 184. Curculio fuscus oblongus, elytris rectis acuminatis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 279. Curculio oblongus, &c.
Degeer inf. 5. *p.* 224. *n.* 18. *t.* 7. *f.* 8. Curculio pheilandrii.

Schre-

Schreber Samml. II. *p.* 336. *t.* 4.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* 7.
Schæff. ic. t. 44. *f.* 1.
Habitat in Europæ & Sibiriæ *umbellatis aquaticis, præsertim pi eriandrio, larva intra caulem, sæpe sub aqua latente, & paraplegiæ, ut fertur, apud equos causa, suis fiercore antidoto.*

variel- 146. C. thorace nigro cinereo lineato, elytris mu-
latus. cronatis griseis. *Fabr. mant. inf.* I, *p.*103. *n.*78.
Habitat in Barbariæ *umbellatis, statura fere paraplectici, at duplo fere minor.*

filiformis. 147. C. cylindricus subcinereus, thorace lineis tribus fuscis. *Fabr. sp. inf.* I. *p.* 172. *n.* 63. *mant. inf.* I. *p.* 103. *n.* 79.
Habitat in Italia, *statura paraplectici, at quadrupio minor.*

cylindricus. 148. C. cylindricus supra niger, elytris acuminatis: fascia pallida. *Fabr. sp. inf.* I. *p.*172. *n.*64. *mant. inf.* I. *p.* 103. *n.* 80.
Habitat in Sibiria, *statura paraplectici, sed minor.*

notatus. 149. C. thorace fusco: punctis quatuor albis, elytris fuscis: fascia sesquialtera testacea. *Fabr. mant. inf.* I. *p.* 103. *n.* 81.
Habitat in Barbariæ *plantis, cylindricus.*

barbirostris. 150. C. niger, rostro barbato, tibiis anterioribus tridentatis. *Fabr. sp. inf.* I. *p.* 172. *n.* 65. *mant. inf.* I. *p.* 104. *n.* 82.
Sch. mus. 4. *t.* 95. *f.* 5.
Habitat in America *australi*, & India.

angustatus. 151. C. cylindricus ater, elytris obtusis punctatis. *Fabr. sp. inf.* I. *p.* 172. *n.* 66. *mant. inf.* I. *p.* 104. *n.* 83.

Herbst

Herbſt apud Fuessli Arch. Inſ. 4. *p.* 71. *n.* 18. *t.* 24. *f.* 7.
Habitat rarior in Anglia.

bardanæ. 152. C. cylindricus griſeo-tomentoſus, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 84.
Habitat Dreſdæ *in arctio lappa, ſtatura & magnitudine paraplectici.*

anguinus. 35. C. cylindricus canus, fuſco lineatus.
Habitat in Germania, *ſtatura paraplectici, ſubtus pedibusque canus nigro punctatus; roſtro magis arcuato, elytris longitudinaliter duplici ſerie punctorum excavatorum minutiſſimorum ornatis, apice mucronatis.*

Aſcanii. 36. C. cylindricus ater, lateribus ſubcæruleſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 67. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 85.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 4. *p.* 71. *n.* 19. *t.* 24. *f.* 8.
β) Curculio cylindricus. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 4. *p.* 71. *n.* 20.
Habitat in Europa *auſtrali, ſtatura paraplectici, ſubtus caneſcens, elytris acutis.* Aſcanius.

lineola. 153. C. cylindricus niger, elytris vitta teſtacea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 68. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 86.
Habitat in nova Hollandia.

linearis. 154. C. elongatus niger, antennis pedibusque piceis, roſtro baſi attenuato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 69. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 87.
Habitat Argentorati, *rarior totus ferrugineus.* Hermann.

craſ-

crassipes. 155. C. femoribus anterioribus subclavatis, corpore atro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 70. *mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 88.
Habitat Argentorati. Hermann.

atriplicis. 156. elongatus ater, thorace nitido, elytris striatis obtusis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 71. *mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 89.
Habitat in littoris Kilonienſis & Norwegici *atriplice littorali.*

Bacchus. 38. C. cupreus, roſtro plantisque nigris. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 165. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 29. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 270. *n.* 4. Rhinomacer niger, &c.
Sulz. hiſt. inf. t. 4. *f.* 4.
Schaeff. ic. t. 37. *f.* 13.
Habitat in Europæ *magis auſtralis vite, corylo, ſupra ſubvillojus.*

betulæ. 39. C. corpore viridi-aurato, ſubtus concolore. *Fn. ſuec.* 605. * *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 165. *mant. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 30.
Degeer inf. 5. *p.* 248. *n.* 5. *t.* 7. *f.* 25. Curculio longiroſtris, antennis rectis nigris, &c.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 270. *n.* 2. Rhinomacer totus viridi-cæruleus.
Friſch inf. 12. 17. *t.* 8. *f.* 2.
Sulz. hiſt. inf. t. 4. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 6. *f.* 4.
Habitat in betula alba, *& frequentiſſimus in* vite, *folia contorquens, aliquando totus cæruleus, alterius ſexus thorace antrorſum ſpinoſo.*

populi. 40. C. corpore viridi-ignito, ſubtus atro-cærulescente. *Fn. ſuec.* 606. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 166. *n.* 24. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 31.
Degeer inf. 5. *p.* 249. *n.* 37. Curculio longiroſtris, antennis rectis nigris, &c. *Geoffr.*

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 270. *n.* 3. Rhinomacer viridi-auratus, subtus nigro-violaceus.
Habitat in betula, populo, *alterius sexus thorace antrorsum spinoso.*

bicolor. 157. C. niger, thorace elytrisque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 166. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 32.
Habitat in America.

cæruleocephalus. 158. C. violaceus nitens, thorace elytrisque tessaceis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 282. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 99. *n.* 33.
Habitat in Saxoniæ *cratægo, fratura bicoloris.*

fturnus. 159. C. ovatus niger flavo irroratus. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 280.
Habitat Halæ Saxonum *gregarius in urticis, c. jaceæ affinis, c. pini magis ovatus.*

parisinus. 160. C. elytris thoraceque viridibus, roſtro pedibusque nigris. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 16. *n.* 27.
Habitat Lutetiis Pariſiorum, *pediculo duplo major, oblongo-cylindricus.*

cylindroides. 161. C. elongatus flavo irroratus, elytris punctato-ſtriatis apice obtuſiuſculis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. *p.* 38. *n.* 1.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *paraplectico affinis.*

porifer. 162. C. thorace ſubgloboſo: ſpinulis brevioribus trifariis apice pertuſis, elytrisque nigricantibus albo lineatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. *p.* 38. *n.* 2.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſubtus cinereo-pubeſcens.*

caffer. 163. C. ater, thorace ſcabro, antennis utrinque

que cicatrice notato, elytris punctato-striatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. *p.* 39. *n.* 3.
Habitat ad Caput bonæ spei, *subtus grisco-pubescens, antennarum cava fericeo-argentea.*

armillatus. 164. C. thorace utrinque subspinoso, femoribus ad apicem cingulo griseo notatis, tibiis fere omnibus dentatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. *p.* 40. *n.* 10.
α) Curculio totus ex fusco cinereus.
β) Curculio elytris cinereo-nebulosis: maculis utrinque obliquis oblongis cinereis.
Habitat ad Caput bonæ spei.

ulicis. 165. C. cinereus, abdomine ovato, antennis, tarsis, tibiis omnibus & femoribus primi paris rufis. *Forst. nov. inf. sp.* 1. *p.* 31. *n.* 31.
Habitat in Anglia, *in floribus ulicis europæi, primo vere conspicuus, vix pediculi magnitudine.*

latus. 166. C. ater depressus flavo irroratus thorace granulato: linea media elevata transversa, elytris sulcatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 71. *n.* 21. *t.* 24. *f.* 9.
Habitat in Hungaria, *c. Ascanii affinis.*

rumicis. 60. C. griseus nigro-nebulosus, antennis fuscis. *Fn. suec.* 590. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 55. *mant. inf.* 1. *p.* 103. *n.* 73.
Degeer inf. 5. *p.* 231. *n.* 20. *t.* 7. *f.* 10. 11.
Raj. inf. 85. *n.* 36.
Habitat in Europæ *rumice.*

ungaricus. 167. C. niger, thorace elytrisque purpureis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 4. *p.* 71. *n.* 22. *t.* 24. *f.* 10.
Habitat in Hungaria, *statura & magnitudine bacchi.*

cya-

cyanocephalus. 168. C. niger villosus, capite chalybeo, thorace rubro, elytris subspadiceis punctato-striatis, femoribus virescentibus. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 72. n. 23. t. 24. f. 11.*
Habitat frequens in Marchiæ *betula, 2 lineis longus.*

striatus. 169. C. cinereo-pubescens, thoracis striis tribus albidis, elytrorum totidem nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 4. p. 72. n. 25. t. 24. f. 13.*
Habitat Berolini, *rarior, 3 circiter lineas longus, c. polygoni proxime affinis.*

canus. 170. C. subglobosus cinereo-pubescens, elytris abbreviatis.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 73. n. 26. t. 24. f. 14. e.
Habitat Berolini.

cruciger. 171. C. nigerrimus, antennarum basi tarsisque fuscis, elytris abbreviatis striatis albo maculatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 73. n. 27. t. 24. f. 15.*
Habitat Berolini, *2 circiter lineas longus.*

Grus. 172. C. niger, subtus cinereus, thorace elytrisque punctato-striatis scabris, femoribus clavatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 73. n. 28.*
Habitat in Pomerania, *vix sesquilineam longus.*

alauda. 173. C. cinereus, subglobosus thoraceis dorso fascia transversa maculisque nigris: pedibus fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 74. n. 29. t. 24. f. 16. f.*
Habitat in Pomerania.

urticarius. 174. C. fuscus: fasciis villosis albidis undulatis, pedibus fulvis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 74. n. 30.*

Ha-

Habitat in Pomerania, *vix pulicis magnitudine.*

Punctum album. 175. C. nigerrimus, subtus & ad latera ochroleuco irroratus, antennis fulvis, elytrorum sutura puncto medio albo. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 74. n. 31. t. 24. f. 17.*
Habitat in nymphææ luteæ *floribus, magnitudine & structura c. scrophulariæ.*

albovittatus. 176. C. flavo-cinereus, elytris vitta utrinque alba, rostro nigro. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 74. n. 32.*
Habitat in Marchia.

Lineola alba. 177. C. convexus piceus, elytris striatis albo villosis: suturæ linea alba abbreviata. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 74. n. 33.*
Habitat in Marchia, *pulicis magnitudine.*

versicolor. 178. C. piceus albido-pubescens, rostro nigro. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 75. n. 34.*
Habitat in Marchia, *statura & magnitudine granari.*

melas. 179. C. angustus nigerrimus, tenuissime punctatus. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 166. n. 94.*
Habitat in Austria, *vix sesquilineam longus.*

rosarum. 180. C. subgloboſus niger albido-pubescens, elytris striatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 167. n. 97.*
Habitat Berolini, *sesquilineam longus.*

quadripunctatus. 181. C. griseus, thorace lineis duabus, elytris punctis quatuor albis. *Lepechin it. II. p. 204. t. 11. f. 23.*
Habitat in Russia *australi.*

varius. 182. C. albo nigroque varius, elytris apice acumi-

minatis. *Lepech. it.* II. *p.* 204. *t.* 11. *f.* 33. *Habitat in* Ruſſia *auſtrali.*

piceus. 183. C. piceus, elytris abdomen æquantibus. *Pall. it.* I. *app. n.* 34. *inſ. muſ.* 1. *p.* 23. *t.* B. *f.* 3. *Habitat in muria lacus* Inderienſis, *c. palmarum affinis, at quadruplo minor.*

nomas. 184. C. oblongus, ſubtus albo-tomentoſus, elytris caneſcentibus: ſtriis punctato-ſulcatis. *Pall. it.* I. *app. n.* 31. *Habitat in* Sibiria.

picatus. 185. C. oblongus ex nigro piceus, antennis fuſcis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 221. *n.* 14. *Habitat* - - - $4\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

gibboſus. 186. C. ovatus niger, elytris tuberculatis, poſterius cinereis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 224. *n.* 17. *Habitat* - - - - $2\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

caſtaneus. 187. C. oblongus caſtaneus, ſubtus niger, elytris ſtriato-punctatis gibboſis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 231. *n.* 19. *Habitat* - - - $3\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

faſciatus. 188. C. cinereus oblongus, faſciis longitudinalibus dilutioribus. *Fn. ſuec. ed.* 2. *n.* 2274. *Degeer inſ.* 5. *p.* 234. *n.* 21. *Habitat* - - - -

nævius. 189. C. ovatus griſeus, thorace faſciis, elytris macula magna punctisque fuſcis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 237. *n.* 24. *t.* 7. *f.* 17. 18.

Ha-

An ſpecies a Schaffero ic. t. 56. *f.* 4. *& t.* 95. *f.* 6. 7. *depictæ, teſtaceus & Schaefferi hujus ordinis?*

Habitat in plantagine, *Julii fine frequens.*

roſtratus. 190. C. oblongus rufus, capite elytrisque viridi-cæruleis nitidis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 252. *n.* 42. *t.* 7. *f.* 27. 28.
Habitat in Succiæ *hortis.*

melanocephalus. 191. C. ſubgloboſus fuſcus, capite roſtroque nigris, elytris gibbis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 272. *n.* 6. *t.* 15. *f.* 27.
Habitat Surinami, 4. *lineas longus.*

frugilegus. 192. C. oblongus caſtaneus coleoptris thoracem æquantibus: maculis quatuor rufis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 273. *n.* 7.
Habitat Surinami *& in* Oriente, *parvus, fruges conſumens.*

pulverulentus. 193. C. fuſcus, thorace granulato, elytris tranſverſim rugoſis. *Scop. ent. carn. n.* 75.
Habitat in Carniola.

centaureæ. 194. C. ovatus fuſcus ſubrufo-villoſus, roſtro deflexo marginato: linea ad apicem elevata media. *Scop. ent. carn. n.* 76.
Habitat in centaureis.

auratus. 195. C. viridi-auratus, antennis roſtrique apice dilatato nigris. *Scop. ent. carn. n.* 77.
Habitat in Carniola.

icoſandriæ. 196. C. atro-cæruleus, roſtro porrecto, elytris octo ſtriatis. *Scop. ent. carn. n.* 87.
Habitat in plantis icoſandris.

oleraceus. 197. C. globoſus nigricans, elytris puncto lunulaque apicis albis. *Scop. ent. carn. n.* 88.
Habitat in Carniola.

pellucens. 198. C. flavicans, oculis roſtique apice nigris. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 90. *n.* 41.
Habitat circa Schemniz Hungariæ, *vix* 2 *lineas longus.*

gibbus. 199. C. ovatus niger, elytris violaceis ſulcatis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 90. *n.* 1014.
Habitat in Dania.

ſimilis. 200. C. ater, elytris ovatis punctato-ſtriatis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 90. *n.* 1015.
Habitat in Dania.

nemoralis. 201. C. niger, oculis fuſcis, elytris punctato-ſtriatis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 90. *n.* 1016.
Habitat in Daniæ *nemoribus.*

politus. 202. C. niger, elytris cyaneis ſtriatis nitidis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 90. *n.* 1017.
Habitat in Dania.

ochropus. 203. C. niger ovatus, femoribus ex flavo rufis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 90. *n.* 1018.
Act. Nidroſ. 4. 15.
Habitat in Scandinavia.

griſeus. 204. C. oblongus cinereus, antennis rufis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 88. *n.* 974.
Habitat in Dania.

nitens. 205. C. oblongus ex nigro violaceus, thorace elytrisque ex nigro virentibus. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 88. *n.* 975.
Habitat in Dania.

arvenſis. 206. C. griſeus, thorace trilineato, elytris rufis obſcure teſſellatis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 88. *n.* 978.
Habitat in Dania.

tu-

tuberculatus. 207. C. niger, thorace rugoso, elytris lineis tuberculisque muricatis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 88. *n.* 989.
Habitat in Dania.

glaucus. 208. C. niger, thorace utrinque linea pallida, tibiis rufis. *Mull. prodr. zool. dan. p.* 88. *n.* 989.
Habitat in Dania.

trifolii. 209. C. niger, femoribus pallidis, abdomine albo. *Syst. nat.* XII. 3. *add. p.* 224.
Habitat in trifolii montani *spicis, intra quas declaratur, pulicis magnitudine.*

longus. 210. C. angustus elongatus niger, thorace fasciis quatuor albicantibus. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 269. *n.* 1.
Habitat in Gallia.

fuliginosus. 211. C. ex atro fuscus glaber punctato-striatus. *Geoffr. inf. par.* I. *p.* 271. *n.* 6.
Habitat in Gallia.

teres. 212. C. ex nigro virideſcens oblongus striatus. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 272. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

Pulex. 213. C. subglobosus villosus niger, pedibus elytrisque rufis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 272. *n.* 9.
Habitat in Gallia.

rugosus. 214. C. totus fuscus rugosus. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 278. *n.* 2.
Habitat in Gallia.

fulcatus. 215. C. fusco-nebulosus, thorace sulcato, elytris striatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 278. *n.* 3.
Habitat in Gallia.

car-

cardue-lis. 216. C. niger ſtriatus, maculis villoſo-fuſcis nebuloſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 281. *n.* 8.
Habitat in Galliæ *carduis.*

napobraſſicæ. 217. C. ex atro cinereus, capite globoſo, roſtro elytriſque nigris, antennis fuſcis. *Bierkander nov. act. Stockh.* 1780. 3. *n.* 4. *p.* 185.
Habitat in napobraſſicæ *caulibus, quos exedit, lineam longus, an hujus ordinis?*

erythropus. 560. C. griſeus, elytris ſtriatis, roſtro pedibusque nigris, tibiis apice incurvis plantisque rubris. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 385.
Habitat in Europa.

chalybeus. 561. C. glaber nigro-cæruleſcens, roſtro arcuato, thorace punctato, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 18. *n.* 388.
Habitat in Europa.

crenulatus. 562. C. niger glaber, roſtro longitudine corporis, elytris ſtriatis: ſtriis profunde crenatis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 390.
Habitat - - -

foveolatus. 563. C. viridi-aureus, roſtro pedibusque nigris, abdomine violaceo elytris profunde punctatis; antennas inter oculosque fovea oblonga. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 391.
Habitat in Europa.

virens. 564. C. cylindricus viridis nitens, roſtro pedibusque cupreis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 392.
Habitat in Europa.

craſſicornis. 565. C. niger, roſtro compreſſo, antennis non fractis apice craſſioribus, thorace elytrisque leviſſime punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 393.
Habitat in Europa.

gla-

glabratus. 566. C. niger glaber, elytris nigro-æneis ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 398.
Habitat in Europa, *ſtatura c. alliarii.*

atomarius. 567. C. fuſcus, elytris ſtriatis: atomis griſeis piloſis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 399.
Habitat in Europa.

ſtriatulus. 568. C. niger, elytris ſulcatis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 400.
Habitat in Europa, *ſtatura aterrimi.*

rugoſus. 569. C. fuſcus, elytris rugoſis, tibiis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 405.
Habitat in Europa.

crinitus. 570. C. niger globoſus griſeo piloſus, roſtro glabro incurvo, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 407.
Habitat in Europa.

hæruatopus. 571. C. niger, thorace punctato, elytris ſtriis crenatis, antennis tibiisque ſanguineis. *Muſ. Lesk. p.* 19. *n.* 417.
Habitat in Europa.

†† *femoribus poſterioribus incraſſatis*, ſaltatorii.

quercus. 25. C. pallide flavus, oculis nigris. *Fn. ſuec.* 596.* *Uddm. diſſ.* 25.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 184. *n.* 126. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 155. Curculio (viminalis) longiroſtris, femoribus ſaltatoriis, corpore teſtaceo.
Degeer inſ. 5. *p.* 260. *n.* 48. *t.* 8. *f.* 5. Curculio ulmi.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 286. *n.* 19. Curculio rufus.
Reaumur inſ. 3. 31. *t.* 3. *f.* 17. 18.
Habitat in Europæ *ſalicis*, *ulmi*, *quercus foliis*, *inter*

ter venas majores ſubcutaneus, folia maculans, magnitudine pediculi.

multidentatus. 572. C. rufus, oculis nigris, pedibus poſterioribus multidentatis. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n.* 441.

meticuloſus. 218. C. griſeo-fuſcus, ſubtus elytrisque poſterius albidus villoſus, roſtro inflexo nigro. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 40. *n.* 8.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

pudicus. 219. C. pallide griſeus, roſtro inflexo ſanguineo, capite pedibusque rubicundis, elytris ſtriatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 40. *n.* 9.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

ilicis. 220. C. nigricans, elytris ſtriatis cinereo-variis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 156.
Habitat in Uplandiæ *quercu*, *parvus*, *ſtatura e. quercus.*

Iota. 221. C. ater, elytris ſtriatis, ſutura baſi alba. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 157.
Habitat in Uplandia, *parvus.*

alni. 42. C. niger, elytris teſtaceis: maculis duabus obſcuris. *Fn. ſuec.* 608. * *Fabr ſp. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 123. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 151.
Fn. ſuec. 1. *n.* 473. Curculio lividus, colcoptris maculis quatuor obſcuris.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 286. *n.* 20. Curculio rufus.
Degeer inſ. 5. *p.* 262. *n.* 49. Curculio alni ſaltator.
Habitat in Europæ *alno.*

piloſus. 222. C. niger, cinereo variegatus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 124. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 152.
Habitat in Anglia, *parvus.*

Cal-

Calcar. 223. C. niger, femoribus unidentatis, antennis plantisque testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 110. *n.* 153.
Habitat Kilonii, *parvus.*

salicis. 43. C. elytris atris: fasciis duabus albis. *Fn. suec.* 610.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 183. *n.* 125. *mant. inf.* 1. *p.* 110. *n.* 154.
Degeer inf. 5. *p.* 264, *n.* 51.
Habitat in salicis *floribus.*

fagi. 44. C. corpore atro, femoribus pallidis. *Fn. suec.* 609. *It. scan.* 111. *Scop. ent. carn.* 73. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 184. *n.* 127. *mant. inf.* 1. *p.* 110. *n.* 158.
Habitat in fagi silvaticæ *foliis.*

segetis. 45. C. corpore piceo, elytris oblongis. *Fn. suec.* 611.
Habitat in agris super spicas.

rhei. 279. C. ater opacus, thorace subpunctato, elytris punctato-striatis, subtus albido-pubescentibus. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 78. *n.* 50.
Habitat Berolini, *fine rostro* 3 *lineas longus.*

rhamni. 280. C. ater opacus, rostro nitido, thorace grunulato, elytris subsulcatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 78. *n.* 51.
Habitat in Marchia, *absque rostro* 4. *lineas longus, c. rhei similis.*

curvirostris. 282. C. nigricans albido-pubescens, thorace punctato, elytris striatis, rostro incurvo, antennarum clavis fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 78. *n.* 53.
Habitat in Marchia, $1\frac{1}{2}$ *lineam longus.*

Va-

Vanellus. 283. C. capite thoraceque subvilloso brevibus elytris striatis, pedibus fuscescentibus. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 79. n. 55. t. 24. f. 23.* I.
Habitat Berolini, *vix lineam superans.*

arator. 284. C. subovatus, thorace fusco: lineis tribus pallidis, elytrorum futura nigro dentata, pedibus fuscis. *Mant. p. 531.*
Habitat - - - cimicis magnitudine.

maricatus. 285. C. ex fusco nigricans, elytris verrucoso-striatis, femoribus unidentatis. *Drury inf. 2. t. 34. f. 4.*

varicosus. 454. C. elytris connatis sulcatis supra sextuberculatis, posterius bimucronatis. *Pall. inf. Russ. 1. p. 22. t. B. f. 1.*
Habitat in America *meridionali, inter maximos congenerum, vaginali affinis, ater.*

rhynchoceros. 455. C. elytris connatis tuberculatis mucronatis, rostro basi bicorni. *Pall. inf. Russ. 1 p. 23. t. B. f. 2.*
Habitat in America, *varicoso paulo brevior & latior.*

exesus. 456. C. corpore nigro lutescente irrorato, thorace elytrisque maculis exesis albis. *Pall. inf. Russ. 1. p. 33. t. H. f. B. 15.*
Habitat Surinami, *germano affinis, at major.*

danubialis. 478. C. elytris cervinis: punctis nigris sparsis. *Habitat in insulis* danubialibus Viennensibus *in corticibus arborum, 2 lineas longus.*

††† *femoribus dentatis.*

aterrimus. 10. C. ater, elytris nitidis. *Fn. suec. 582.* Fabr. sp. inf. 1. p. 179. n. 103, mant. inf. 1. p. 108. n. 132.* Ha-

Habitat in Europæ *plantis frequentissimus, statura & magnitudine ocelliariæ.*

cerasi. 11. C. ater, elytris opacis oblongis. *Fn. suec.* 583. *Scop. ent. carn.* 84. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 179. *n.* 104. *mant. inf.* 1. *p.* 108. *n.* 133.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 299. *n.* 48. Curculio niger, thorace utrinque dentato.
Frisch inf. 11. 31. *t.* 23. *f.* 1. 3.
Habitat in cerasi pyrique *foliis, epidermidem exedens, commaculans,* 1750 *in* Suecia *frequentissimus.*

beccabungæ. 41. C. niger, elytris rufis: margine omni nigro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 108. *n.* 130.
Syst. nat XII. 2. *p.* 614. *n.* 41. *Fn. suec.* 607. * Curculio fuscus, elytris subsanguineis: margine anoque fuscis?
Habitat in Suecia *beccabunga, magnitudine & statura c. cerasi.*

Troglodytes. 224. C. thorace linea dorsali cinerea, elytris pedibusque testaceis, pedibus fuscis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 108. *n.* 131.
Habitat Kilonii, *parvus.*

lapathi. 20. C. albo nigroque varius, thorace elytrisque muricatis. *Fn. suec.* 591. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 176. *n.* 86. *mant. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 109. *Degeer inf.* 5. *p.* 223. *n.* 16. *t.* 7. *f.* 1. 2. Curculio albicaudis.
Habitat in Europæ *salicibus & rumicibus, pectoris lateribus elytrisque posterius albidis.*

irroratus. 225. C. albus supra fuscus albo maculatus, femoribus fusco annulatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 110.
Habitat in Cayenna, *statura & magnitudine c. lapathi.*

fex-

sexgut-tatus. 226. C. niger, elytris maculis tribus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 176. *n.* 87. *mant. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 111.
Habitat in America.

luridus. 227. C. ovatus obscure niger, elytris punctato-striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 176. *n.* 88. *mant. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 112.
Habitat in nova Hollandia.

stolidus. 228. C. fuscus, tibiis posterioribus incurvis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 176. *n.* 89. *mant. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 113.
Habitat ad Caput bonæ spei, *mediæ magnitudinis.*

medita-bundus. 229. C. elytris striatis, posterius acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 176. *n.* 90. *mant. inf.* 1. *p.* 106. *n.* 114.
Habitat in nova Hollandia.

stupi-dus. 230. C. niger, thoracis lateribus rotundatis, elytris subspinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 177. *n.* 91. *mant. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 115.
Habitat in nova Hollandia.

mangi-feræ. 231. C. griseus thorace linea punctisque duobus dorsalibus albis. *Fabr. sp. inf.* 177. *n.* 92. *mant. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 116.
Habitat in mangiferæ *nucleis.*

stultus. 232. C. griseus, elytris macula communi lunata cinerea, rostro atro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 117.
Habitat in Coromandel, *c. mangiferæ minor.*

squa-lidus. 233. C. villoso-griseus, rostro testaceo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 177. *n.* 93. *mant. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 118.
Habitat Surinami, *mediæ magnitudinis.*

po-

pomorum. 46. C. femoribus anterioribus dentatis, corpore griseo nebuloso. *Fn. suec.* 612. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 181. *n.* 115. *mant. inf.* 1. *p.* 109. *n.* 145. *Frisch inf.* 1. *p.* 32. *t.* 8. Curculio in floribus arborum.
Habitat in pomonæ *floribus.*

ovalis. 47. C. corpore ovato nigro albo maculato. *Fn. suec.* 613.
Habitat in Europa.

carbonarius. 48. C. corpore nigro oblongo, elytris striatis. *Fn. suec.* 614. *Scop. ent. carn.* 29.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *p.* 27. *n.* 47. *t.* 24. *f.* 21.
Habitat in Europa. Solander.

mucoreus. 49. C. femoribus quatuor anterioribus dentatis, elytris polline flavescentibus, supra apicem gibbosis. *Mus. Lud. Ulr.* 53. * *Gron. mus.* 589. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 74. *mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 92.
Habitat in America *australi &* India.

jamaicensis. 234. C. obscurus scaber, thorace utrinque fasciculato tuberculato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 73. *mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 91.
Habitat in America *meridionali, magnus.*

bidens. 235. C. niger, femoribus posterioribus dentatis, elytris unispinosis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 72. *mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 90.
Habitat in nova Seelandia.

pusio. 50. C. femoribus quatuor posterioribus dentatis, elytris striatis nigris: linea repanda grisea. *Mus. Lud. Ulr.* 46. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 75. *mant. inf.* 1. *p.* 104. *n.* 93.

Ha-

Habitat in America *auſtrali*, & India, *elytrorum linea longitudinali.*

vaginalis. 51. C. elytris ſtriatis: tuberculis ſparſis, juxta apicem mucronatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 47.*
Habitat in America & Sibiria.
Pro roſtro *faſciola in thorace*; elytrorum *ſtriæ ex punctis cavis viliæſis.*

ſpinipes. 236. C. niger, thorace lineis duabus, elytris ſtriis quatuor albis, tibiis anterioribus ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 76. *mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 94.
Habitat in inſulis, Americæ *meridionali oppoſitis*, *magnus.*

Bombina. 237. C. ferrugineo-fuſcus, elytris ſtriatis: tuberculis elevatis atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 104. *n.* 95.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

Scorpio. 238. C. ater, thorace plano baſi cinereo, coleoptris tuberculatis acuminatisque, medio cinereis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 96.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

Scaber. 239. C. thorace carinato, elytris ſulcatis tuberculato-ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 77. *mant. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 97.
Habitat in Cayenna.

trifaſciatus. 240. C. thorace linea laterali, elytris albo punctatis: maculisque duabus brunneis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 98.
Habitat in Cayenna, *teſtaceus c. abietis paulo major.*

cy-

cylindriroſtris. 241. C. thorace ſcabro, elytris poſterius bituberculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 78. *mant. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 99.
Habitat in nova Hollandia.

ſtigma. 52. C. elytris macula magna ferruginea. *Muſ. Lud. Ulr.* 48. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 79. *mant. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 100.
Habitat in America *auſtrali* & India.

hebes. 242. C. femoribus ſubdentatis, thorace ſcabro, elytris ſulcatis tuberculatis, ore barbato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 174. *n.* 80. *mant. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 101.
Habitat ad fluvium Senegal, *mediæ magnitudinis.*

depreſſus. 53. C. thorace depreſſo, lateribus obtuſe angulatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 49. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 114. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 144. *Seb. muſ.* 4. *t.* 95. *f.* 4.
Habitat in America *meridionali*, *griſeus*: *punctis nigris glabris prominulis.*

annulatus. 54. C. pallidus, thorace elytrisque ſtrigis nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 51. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 81. *mant. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 102.
Habitat in America *auſtrali* & India, *thoracis ſtriga una*, *elytrorum duabus.*

caliginoſus. 243. C. elytrorum ſtriis punctatis approximatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 82. *mant. inſ.* 1. *p.* 105. *n.* 103.
Habitat in Anglia, *rarior.*

dubius. 244. C. niger, thorace lævi, elytris ſtriatis ſcabris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 104.
Habitat - - - *magnus.*

ad-

adſperſus. 245. C. fulvo irroratus, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 105.
Habitat in Cayenna, *magnitudine & ſtatura c. cynaræ.*

brunneus. 246. C. brunneus, roſtro fuſco, elytris teſtaceis punctato-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 83. *mant. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 106.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magnus.*

abietis. 57. C. elytris fuſcis: faſciis duabus linearibus interruptis albidis. *Fn. ſuec.* 615. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 84. *mant. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 107.
Io. oel. 26. Curculio ſubfuſcus.
Pet. gazoph. 14. *c.* 8. *f.* 9. Curculio norwegicus.
Degeer inſ. 5. *p.* 205. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 11.
Schaeff. ic. t. 25. *f.* 1.
Habitat in pinis ſylveſtris *cortice & reſina*; *an alter ſexus c. pini?*

reticulatus. 247. C. oblongus piceus, elytris reticulatis: faſciis obliquis pallidis, tibiis anterioribus ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 76. *n.* 85. *mant. inſ.* 1. *p.* 106. *n.* 108.
Habitat Tranquebariæ.

germanus. 58. C. ater, thorace utrinque punctis duobus teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 94. *mant. inſ.* 1. *p.* 107. *n.* 119.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 613. *n.* 58. Curculio longiroſtris, femoribus ſubdentatis, corpore ovato nigro, punctis teſtaceis adſperſo.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 91. *n.* 44.
Sulz. hiſt. inſ. 39. *t.* 4. *f.* 8.
Schaeff. ic. t. 25. *f.* 2.
Friſch inſ. 13. *p.* 28. *t.* 26.
Habitat in Europa, *frequens in* Germania, *inter maximos europæos.*

nu-

nucum. 59. C. corpore grifeo longitudine roſtri. *Fn. ſuec.* 616. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 156. *mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 135.
Uddm. diſſ. 24. Curculio ovatus griſeus, roſtro filiformi longitudine corporis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 295. *n.* 42.
Degeer inſ. 5. *p.* 205. *n.* 2. *t.* 6. *f.* 14-16.
Roeſ. inſ. 3. *t.* 67. *f.* 5. 6.
Scop. ent. carn. 105.
Poda inſ. t. 1. *f.* 3.
Schaeff. el. t. 55. *f.* 1.
ic. t. 50. *f.* 4.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 22.
Habitat in coryli avellanæ *nucibus frequens.*

proboſcideus. 248. C. griſeus, roſtro corpore duplo longiore. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 107. *mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 136.
Habitat in America *boreali, an varietas c. nucum?*

varians. 249. C. grifeo nigroque varius, roſtro pedibusque ruſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 108. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 137.
Habitat in Cayenna.

ceraſorium. 250. C. fuſcus, ſcutello elytrorumque faſciis obſoletis cinereis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 109. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 138.
Habitat in Anglia, *c. nucum triplo minor.*

amœnus. 251. C. ater, thorace punctis duobus, coleoptris quinque niveis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 110. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 139.
Habitat in nova Hollandia.

bicornis. 252. C. femoribus acute dentatis, capite bidentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 111. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 140.

Habitat in nova Seelandia, *ex fusco & cinereo varius.*

tenuirostris. 253. C. niger, elytris albo subfasciatis, antennis rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 180. *n.* 112. *mant. inf.* 1. *p.* 109. *n.* 141.
Habita: in Anglia, *statura c. ceraforum, at minor.*

scrophulariæ. 61. C. coleoptris maculis duabus dorsalibus atris. *Fn. suec.* 603. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 177. *n.* 95. *mant. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 120.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 296. *n.* 44.
Degeer inf 5. *p.* 208. *n.* 3. *t.* 6. *f.* 17-20.
List. scar. angl. p. 395. *n.* 35.
Reaumur inf. 3. *t.* 2. *f.* 12.
Habitat in scrophulariis, *quarum pericarpia exedit larva, folliculos ovatus, operculatos, fuscos substituens.*

verbasci. 254. C. niger, thoracis lateribus flavescentibus, elytris punctis albis nigrisque alternis striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 121.
Habitat in Kilonii, *an varietas c. scrophulariæ?*

gravis. 255. C. niger, elytris ferrugineo-variis, femoribus canaliculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 96. *mant. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 122.
Habitat ad Caput bonæ spei.

druparum. 62. C. elytris testaceis, obsolete fasciatis. *Fn. suec.* 617. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 181. *n.* 113. *mant. inf.* 1. *p.* 109. *n.* 142.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 296. *n.* 43.
Degeer inf. 5. *p.* 214. *n.* 7.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 11.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 21.
Habitat in cerasi padi *nucleis.*

fra-

fraxini. 256. C. fuscus, femoribus ferrugineis, capite dorsoque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 109 *n.* 143. *Habitat in* Succiæ *fraxino*, *magnitudine c. drupa-rum.*

viola-ceus. 63. C. totus violaceus. *Fn. suec.* 579. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 179. *n.* 105. *mant. inf.* 1. *p.* 108. *n.* 134. *Lieger inf.* 5. *p.* 213. *n.* 5. *Berg str. nomencl.* 1. 16. 13. *t.* 2. *f.* 13. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 271. *n.* 5. *Habitat in* Europæ pinetis, *frequens in turionibus.*

quin-que-pun-ctatus. 64. C. elytris futura maculisque duabus albis. *Fn. suec.* 618. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 97. *mant. inf.* 1. *p.* 107. *n.* 123. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 75. *n.* 40. *t.* 24. *f.* 18. g. *Habitat in* Europa *boreali.*

guttula. 957. C. niger, thorace tuberculato, elytris striatis: puncto posteriore albo. *Fabr. mant. inf.* 1. 1. *p.* 107. *n.* 124. *Habitat* Halæ Saxonum, *parvus.*

didy-mus. 258. C. supra fuscus, elytris striatis: macula late-rali transversa alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 98. *mant. inf.* 1. *p.* 108. *n.* 125. *Habitat in* Germania, *parvus.*

hæmor-rhoida-lis. 259. C. thorace fusco: lateribus cinerascentibus, elytrorum futura apice ferruginea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 99. *mant. inf.* 1. *p.* 108. *n.* 126. *Habitat in* nova Hollandia.

trima-cula-tus. 260. C. coleoptris nigris: maculis tribus cinereis; posteriori communi lunata. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 100. *mant. inf.* 1. *p.* 108. *n.* 127. *Habitat in* Alsatia & Suecia. Hermann & Paikal.

Litura. 261. C. albo nigroque varius, roſtro vario. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 101. *mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 128.
Habitat in Europa.

villoſus. 262. C. villoſus griſeus, ſcutello faſciaque elytrorum poſteriore albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 178. *n.* 102. *mant. inſ.* 1. *p.* 108. *n.* 129. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 76. *n.* 41. *t.* 24. *f.* 19.
Habitat in Germania.

hiſpidus. 65. C. corpore ſulcato, adſperſo ſquamis erectis. *Fn. ſuec.* 619. *
Habitat in Europa.

pedicularius. 66. C. corpore rubro, elytris albido ſubfaſciatis. *Fn. ſuec.* 620. *
Habitat in Europa.

Tortrix. 67. C. corpore teſtaceo, pectore fuſco. *Fn. ſuec.* 622. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 116. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 146.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 300. *n.* 51.
Degeer inſ. 5. *p.* 214. *n.* 16.
Habitat in populo tremula, *folia contorquens.*

tremulæ. 263. C. nigricans, elytris ſtriatis griſeo irroratus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 147.
Habitat in Suecia *populo, ſtatura & magnitudine tortricis.*

tæniatus. 264. C. thorace nigro: margine anteriore & poſteriore rufis, elytris pallidis nigro maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 118. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 148.
Habitat in Anglia, *tortrice minor.*

qua-

quadri-pustulatus. 265. C. niger, elytris maculis duabus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 121. *mant. inſ.* 1. *p.* 109. *n.* 149.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura brenti diſparis.*

elongatus. 266. C. thorace elongato, tibiis anterioribus bidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 122. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 150.
Habitat in Jamaica.

byrrhinus. 267. C. thorace elytrisque nigris, margine ferrugineis, pectore utrinque niveo. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 39. *n.* 4.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ater, ovatus.*

ſtrigirostris. 268. C. thorace granulato, elytris punctato-ſtriatis, roſtro longitudinaliter utrinque ſulcato. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 39. *n.* 5.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *nunc totus nigricans, nunc, præter caput & thoracem, ſpadiceus.*

laniger. 269. C. elytris cicatriſato-reticulatis: poſterius maculis duabus albidis lunatis, tibiis anterioribus dentatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 40. *n.* 6.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſupra niger, ſubtus rubicundo-lanuginoſus, thorace granulato: maculis tribus minoribus griſeis.*

tibialis. 270. C. niger cinereo-nebuloſus oblongus, thorace ſubgloboſo, elytris ſtriatis, roſtro inflexo canali pectoris immerſo, tibiis anterioribus intus barbatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 40. *n.* 7.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

glyphicus. 271. C. corpore ovato nigro, elytris lineis albis reticulatis. *Schall. Abh. der. hall. Geſ. Naturf. Fr.* 1. *p.* 282.

Ha-

Habitat Halæ Saxonum, *ſtatura c. nucum, ſed minor.*

capucinus. 272. C. elytris griſeo-nebuloſis, maculis poſterius ad ſuturam oblongis punctisque binis albidis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 283.
Habitat Halæ Saxonum, *magnitudine fere nebulonis, at magis ovatus.*

Forſteri. 273. C. manibus longiſſimis. *Forſt. nov. inſ. ſpec.* 1. *p.* 32. *n.* 32.
Habitat in Anglia, *oblongus, magnitudine c. pomorum, piceus, pilis cinereis tomentoſus, antennis tarſisque rufis, elytris cinereis nigro-punctatis.*

pollinaricus. 274. C. elytris depreſſis planis abbreviatis, ventre, elytrorum margine & pedibus polline aſperſis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 33. *n.* 33.
Habitat in Angliæ *plantis variis, præſertim urtica dioica, ſupra planus fuſcus.*

cinnamomi. 275. C. cinnamomeus, roſtro anterius canaliculato admarginem denticulato: apice erecto mucronato biſurco, poſterius gibbo granulato. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 76. *n.* 46. *t.* 24. *f.* 20. h. i.
Habitat in India, 10 *lineas longus; elytris punctato-ſtriatis: macula punctisque aurantiis; an brenti ſpecies?*

affinis. 276. C. niger, elytris cæruleis punctato-ſtriatis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 77. *n.* 48.
Habitat Berolini, *carbonarii ſtatura & magnitudine.*

glaber. 277. C. ater nitidus, ſubtus punctatus. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 78. *n.* 49.
Habitat Berolini, 2 *fere lineas longus.*

de-

denigratus. 278. C. ater, thorace punctato, elytris punctato-striatis apice subtus rubicundis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 78. n. 52.*
Habitat in Marchia, *sine rostro lineam longus, aterrimo affinis.*

cardui. 281. C. gibbus ex flavicante cinereus, thorace tuberculato, elytris convexis abbreviatis: lineola, puncto scutelloque flavis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 79. n. 54. t. 24. f. 22. k.*
Habitat Berolini *in carduis.*

ireos. 286. C. totus candidus. *Pall. it. II. app. n. 57.*
Habitat in Sibiriæ *iride, c. scrophulariæ triplo major.*

curcifer. 287. C. fuscus, subtus ex flavo cinereus nitenti-tomentosus, elytris ad suturam cruce notatis. *Pall. it. I. app. n. 35.*
Habitat in Sibiria, *c. scrophulariæ magnitudine.*

albicans. 288. C. thorace tuberculis quinque, elytris sex, ano albo *Lepech. it. II. p. 206. t. 10. f. 6.*
Habitat in Russia.

urticæ. 289. C. niger planiusculus, thorace utrinque dentato, elytris striatis posterius bipunctatis. *Mull. zool. dan. prodr. p. 88. n. 983.*
Habitat in urticis.

rufus. 290. C. subglobosus rufus, elytrorum lineis elevatis albo nigroque tessellatis. *Mull. zool. dan. prod. p. 89. n. 998.*
Habitat in Dania, *c. scrophulariæ affinis.*

tuberculosus. 291. C. niger, thorace lateribus albidis, elytris tuberculorum seriebus quatuor. *Scop. ent. carn. n. 80.*
Habitat in Carniola.

ca-

carioſus. 292. C. oblongus, roſtro nitidulo, elytris ſtriatis, femoribus anterioribus craſſioribus majore dente notatis. *Scop. ent. carn. n.* 81.
Habitat in Carniola.

ſyngeneſiæ. 293. C. cervinus, breviſſime villoſus, roſtro nigro apice nitido. *Scop. ent. carn. n.* 82.
Habitat in Carniolæ *ſyngeneſiis.*

fuſcus. 294. C. fuſcus, ſcutello puncto albo, elytris macula rubeſcente notatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 300. *n.* 50.
Habitat in Gallia.

Geerii. 295. C. ſubgloboſus griſeus, coleoptris macula magna fuſca dorſali. *Degeer inſ.* 5. *p.* 212. *n.* 4.
Habitat in fraxino.

ulmi. 296. C. oblongus ex rufo fuſcus, proboſcide nigra, elytris macula nigricante.
Degeer inſ. 5. *p.* 215. *n.* 8. *t.* 6. *f.* 26. 27.
Habitat in ulmo.

pulverulentus. 297. C. oblongus niger, elytris cinereo maculatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 268. *n.* 3. *t.* 15. *f.* 24.
Habitat Surinami.

frigidus. 548. C. fuſcus, elytris ſtriatis ſubtuberculatis ferrugineo variis. *Fabr. mant. inſ.* 2. *app. p.* 381.
Habitat in Amboina, *mediæ magnitudinis.*

bohemus. 552. C. elytris griſeis punctatis, antennis pedibusque rufis. *Mayer Abh. der boehm. Geſ.* 4. *p.* 185.
Habitat in Bohemiæ *pomariis, pulicis magnitudine, celerrime currens.*

reticulatus. 573. C. oblongus niger, elytris profunde punctatis re-

reticulatisque : rugis tranſverſe leviſſime ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n.* 423.
Habitat in Europa.

ſubfaſciatus. 574. C. ferrugineus, elytris fulvo obſolete faſciatis. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n.* 426.
Habitat in Europa.

tricolor. 575. C. teſtaceus, capite, thorace pedibusque rufis, elytris faſciis duabus dentatis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n.* 427.
Habitat in Europa.

dentatus. 576. C. rufus, femoribus dente valido armatis. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n.* 431.
Habitat in Europa.

acutus. 577. C. rufus, elytris ſtriatis, femoribus acute dentatis. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n.* 432.
Habitat in Europa, *an ſatis diſtincta ſpecies?*

cineraſcens. 578. C. niger ſubtus cineraſcens, elytris ſtriatis, roſtro longitudine corporis. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n.* 434.
Habitat in Europa.

muricatus. 579. C. ſubgloboſus niger, elytris ſulcatis piloſis cinereis, poſterius muricatis, tibiis tarſisque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n.* 435.
Habitat in Europa.

cinereus. 580. C. ſubgloboſus cinereus, antennis pedibusque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n.* 436.
Habitat in Europa.

bipunctatus. 581. C. ſubgloboſus cinereus, thorace griſeo : anterius tuberculis quatuor, elytris ſtriatis : ſingulorum diſco punctis duobus griſeis. *Muſ. Lesk. p.* 20. *n.* 439.
Habitat in Europa.

Da-

Davieſii. 601. C. albido griſeus, elytris anterius angulatis: macula magna laterali ferruginea. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 13. *t.* 8. *f.* 5.
Habitat in Noveboraco, *c. nucum duplo fere major.*

zonatus. 602. C. niger, thorace lateribus elytrisque faſciis tribus diſtinctis albidis. *Swederus nov. act. Stockh.* 1787. 8. *n.* 3. 14.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *mediæ magnitudinis, ſubovatus.*

** *Breviroſtres.*
† *femoribus dentatis.*

ſpectabilis. 298. C. corpore viridi nigroque variegato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 208. *mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 269.
Habitat in nova Hollandia.

pinguis. 299. C. gibbus nigricans, femoribus poſterioribus muticis, thorace lineis, elytris ſtrigis duabus lineaque apicis flaveſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 270.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

tridens. 300. C. cinereus, elytris dentibus tribus apiceque emarginatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 271.
Habitat in nova Seelandia, *magnus.*

fuſcomaculatus. 301. C. ater, femoribus ſubdentatis, thorace elytrisque lævibus fuſco maculatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 272.
Habitat in Germania, *magnus, lævis.*

liguſtici. 68. C. abdomine ſubovato murino. *Fn. ſuec.* 621. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 209. *mant. inſ.* 1 *p.* 122. *n.* 273. Curculio breviroſtris femoribus dentatis, corpore obſcuro. *De-*

Degeer inſ. 5. *p.* 218. *n.* 10. Curculio apterus antennis fractis, &c.
Shaeff. ic. t. 2. *f.* 12.
Bonsd. curc. Suec. 2. *f.* 33.
Habitat in liguſtico leviſtico.

nubilus. 302. C. griſeus, elytris punctis obſcurioribus numeroſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 210. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 274.
Habitat Hamburgi.

nigrita. 303. C. niger obſcurus, thorace ſcabro, elytris crenato-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 211. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 275.
Habitat in Italia, *ſtatura & magnitudine ſulcati.*

ſulcatus. 304. C. ater, elytris ſtriatis ferrugineo maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 212. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 276. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 35.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. *p.* 85. *n.* 86. *t.* 24. *f.* 35?
Habitat in Saxoniæ *nemoribus.*

gemmatus. 305. C. ater, elytris punctis viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 213. *mant. inſ.* 1. 122. *n.* 277. *Scop. ent. carn. n.* 90.
Schulze Naturf. 6. *t.* 4.
Habitat in Europa.

picipes. 306. C. griſeus, elytris nebuloſis, femoribus poſterioribus ruſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 214. *mant. inſ.* 1. *p.* 122. *n.* 278.
Habitat in Kilonii *plantis.*
Elytra *punctis ſubſcutellaribus ſtriata.*

ovatus. 69. C. abdomine ovato nigro, pedibus antennisque ruſis. *Fn. ſuec.* 526. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 221. *mant. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 287. *Bonſd. curc. ſuec.* 2. *f.* 26.

De-

Degeer inf. 5. *p.* 219. *n.* 11. Curculio rosæ.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *p.* 85. *n.*90. *t.*24. *f.* 36.
Habitat in Europæ *pomona.*

attelaboides. 307. C. rostro elytrisque unituberculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 191. *n.* 222. *mant. inf.* 1. *p.* 123. *n.* 288.
Habitat in brasilia.

oblongus. 71. C. antennis, elytris pedibusque ferrugineis. *Fn. suec.* 625. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 199. *n.*220. *mant. inf.* 1. *p.* 123. *n.* 286.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 294. *n.* 39. Curculio oblongus niger, elytris pedibusque testaceis.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. *p.* 168. *n.* 102. *t.* 45. *f.* 9. e. f.
Habitat in Europa.

pyri. 72. C. æneo-fuscus. *Fn. suec.* 623. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 198. *n.* 217. *mant. inf.* 1. *p.* 122. *n.* 281. *It. scan.* 355. Curculio viridis opacus, pedibus antennisque magis fuscis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 282. Curculio squamoso-viridis, &c.
Degeer inf. 5. *p.* 246. *n.* 34.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 11.
Sulz. hist. inf. t. 3. *f.* 23.
Habitat in pyri *foliis larva, in hujus* prunique *corollis imago.*

mali. 308. C. subpubescens fuscus, femoribus acute dentatis, antennis pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 499. *mant. inf.* 1. *p.* 122. *n.*282. *Lesk. it. p.* 47. *t.* A. *f.* 13.
Habitat Lipsiæ, *c. pyri proxime affinis.* Leske.

arboreti. 309. C. cinereus, femoribus anterioribus dentatis, cly-

elytris punctato-striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 122. *n.* 279.
Habitat in Cayenna, *argentati magnitudine & statura.*

argentatus. 73. C. corpore viridi-argenteo. *Fn. suec.* 624. * *Scop. ent. carn.* 91. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 198. *n.* 218. *mant. inf.* 1. *p.* 123. *n.* 284. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 12.
Fn. suec. 450. Curculio femoribus omnibus denticulo notatis, corpore viridi oblongo.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 293. *n.* 38. Curculio squamosus viridi-auratus.
Degeer inf. 5. *p.* 219. *n.* 12. Curculio urticæ.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* 9.
Habitat in Europæ *urtica*, *betula*, *corylo*, *quercu.*

viridanus. 310. C. viridis, ore antennisque nigris, oculis atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 198. *n.* 219. *mant. inf.* 1. *p.* 123. *n.* 285.
Habitat Tranquebariæ.

Morio. 311. C. ater nitens, elytris glabris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 198. *n.* 215. *mant. inf.* 1. *p.* 122. *n.* 279. *Bonsd. curc. Suec* 2. *f.* 29.
Habitat in Germania, & Suecia *magnus.*

bisulcatus. 312. C. niger, coleoptrorum limbo cinereo, rostro bisulcato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 198. *n.* 216. *mant. inf.* 1. *p.* 122. *n.* 280.
Habitat in Italia, *statura sulcati.*

æruginosus. 313. C. oblongus totus viridis, femoribus ferrugineis, antennis longioribus. *Bonsd. hist. curc.* 2. *p.* 23. *n.* 7. *f.* 8.
Habitat in Suecia, *statura magis oblonga & antennis longioribus a c. pyri distinctus.*

ery-

erythropus. 315. C. oblongo ovatus niger, antennis longioribus pedibusque rufis. *Bonjd. curc. 2. p. 25. n. 10. f. 10.*
Stroem. act. Hafn. 2. p. 57. n. 28. 29. Curculio salicis & dubius.
Habitat in Scandinaviæ *herbidis, frequentior; an a ruspede satis distinctus, cum femora non semper dentata?*

tessulatus. 316. C. ovatus niger, elytris striatis: striarum intervallis albo nigroque alternatim maculatis. *Bonsd. curc. 2. p. 38. n. 32. f. 32. Mull. zool. dan. prodr. p. 87. n. 967.*
Habitat in Scandinavia, *punctatulo affinis.*

floricola. 317. C. niger, elytris incanis, antennarum articulis mediis spadiceis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 86. n. 93.*
Habitat - - - 3 lineas longus, c. pyri affinis.

Fullo. 318. C. elytris nigris albo punctatis. *Schranck enum. inf. Austr. p. 116. n. 221. Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 86. n. 91. t. 24. f. 37.*
Habitat in Austriæ *plantis variis, præsertim arboribus, niger, 3½ lineas longus.*

anthracinus. 319. C. niger, elytris punctatim striatis, femoribus unidentatis. *Scop. ent. carn. n. 92.*
Habitat in Carniola.

lugubris. 320. C. fuscus, elytris punctis scabris substriatis villosulis coadunatis. *Scop. ent. carn. n. 93.*
Habitat in Carniola.

infidus. 321. C. obsolete cupreus, cærulescenti-villosus. *Scop. ent. carn. n. 94.*
Habitat in Carniola.

pru-

pruni. 322. C. niger subvillosus, antennis, elytris pedibusque rufis. *Scop. ent. carn. n.* 95.
Habitat in Carniola.

cæleſtinus. 323. C. cæruleus, antennis pedibusque ſanguineis. *Scop. ent. carn. n.* 96.
Habitat in Germania.

carniolicus. 324. C. fuſcus, glauceſcenti-villoſus, elytris ſparſim punctatis. *Scop. ent. carn. n.* 97.
Habitat in Carniola.

Scopolii. 325. C. fuſcus villoſulus, antennis pedibusque rufis. *Scop. ent. carn. n.* 89.
Habitat in Carniola, *an diſtinctus ab ovato?*

Roeſelii. 326. C. thorace obſcure viridi: linea longitudinali alba, elytris fuſco-fulvis: lineis elevatis ſulcatis. *Roeſ. inſ.* 3. *p.* 391. *t.* 67. *f.* A.B.C.D.
Habitat in Germania, *roſtro craſſo.*

Mulleri. 327. C. niger, elytris ſubſtriatis, oculis rufis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 963.
Habitat in Daniæ *leviſtico.*

danicus. 322. C. ater, elytris ſubſulcatis pallide punctatis, oculis rufis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 964.
Habitat in Dania.

ſquamifer. 323. C. oblongus, elytris griſeo nigroque ſtriatis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 968.
Habitat in Dania.

auſtriacus. 324. C. cinereus apterus, elytris lineis albidis nigro punctatis. *Schranck inſ. Auſtr. p.* 117. *n.* 222.
Habitat in Auſtria.

religioſus. 325. C. ater nitens, elytris albo maculatis. *Schranck inſ. Auſtr. p.* 118. *n.* 225.

Ha-

Habitat in monte Auſtriæ Oettſcher *ad* cellas Marianas, 4 *lineas longus*, *habitu germani*.

coronatus. 326. C. niger apterus, thorace utrinque puncto duplici fulvo: baſi pilis fulvis coronata. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 291. *n.* 34.
Habitat in Gallia.

Tigris. 327. C. niger, maculis flavo-villoſis, elytris ſubrugoſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 292. *n.* 35.
Habitat in Gallia.

corrugatus. 328. C. fuſcus apterus, elytris rugoſo-ſtriatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. 293. *n.* 37.
Habitat in Gallia.

geographicus. 329. C. ſubgloboſus ex nigro fuſcus, ſquamoſus, lineolis albis varius. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 294. *n.* 40.
Habitat in Gallia.

faſciatus. 330. C. fuſcus, elytris ſtriatis: macularum albarum faſcia triplici tranſverſa. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 295. *n.* 41.
Habitat in Gallia.

albo punctatus. 331. C. ſubgloboſus ſquamoſus ex cinereo fuſcus, elytrorum maculis tribus & apice albis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 299. *n.* 47.
Habitat in Gallia

ſericeus. 332. C. obſcure rufus cinereo-villoſus, roſtro thorace breviore. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 300. *n.* 52.
Habitat in Gallia.

Virgo. 333. C. oblongus cinereo-villoſus, roſtro thoraci æquali. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 301. *n.* 53.
Habitat in Gallia.

ſtri-

ſtritos. 334. C. oblongus niger flaveſcente-punctatus, antennis longis fractis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 217. *n.*9. *Habitat* - - - 2 *lineas longus.*

granuloſus. 601. C. niger, thorace varioloſo, elytris punctis elevatis rugoſis: interſtitiorum punctis minoribus. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 490. *Habitat in* Europa.

leproſus. 602. C. villoſus ferrugineus albido-maculatis, thorace punctis confluentibus, elytris punctato-ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 491. *Habitat in* Europa.

ſulcatus. 603. C. fuſcus thorace punctis profundis rugisque longitudinalibus, elytris punctatis: rugis complanatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 492. *Habitat in* Europa.

chryſoſtictos. 604. C. fuſcus glaber, thorace punctato, elytrorum ſulcis crenatis maculisque tribus auro conſperſis, antennis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 493. *Habitat in* Europa.

argentatus. 605. C. viridi-argenteus, antennis tibiisque rufis, femoribus fuſcis clavatis. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 500. *Habitat in* Europa.

hæmorrhous. 606. C. fuſcus, antennis, pedibus abdominisque apice rufis, elytris fuſco vireſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 23. *n.* 501. *Habitat in* Europ.

†† *femoribus muticis.*

polygoni. 26. C. thorace lineato, elytris cinereis: lineolis fuſcis ſuturaque nigro-punctata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*

p. 188. *n.* 151. *mant. inf.* 1. *p.* 116. *n.* 200.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 609. *n.* 26. *Fn. suec.* 597. Curculio longiroſtris teſtaceus, coleoptrorum ſutura nigra repanda.
Habitat in Europæ *polygono*, *mediæ magnitudinis.*

griſeus. 335. C. ſupra griſeo fuſcus, ſubtus cinereus, roſtro canaliculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 152. *mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 201.
Habitat in Anglia.

triguttatus. 336. C. nigricans, elytris griſeis: maculis duabus albis, poſteriori majori communi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 153. *mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 202.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 11.
Habitat in Anglia.

geminatus. 337. C. cinereus, thorace trilineato, elytris ſtriis numeroſis fuſcis per paria approximatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 203.
Habitat Kilonii, *mediæ magnitudinis*, *fere globoſus.*

diadema. 338. C. flaveſcenti-villoſus, roſtro apice retuſo atro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 204.
Habitat in Cayenna, *ſtatura c. coryli*, *at paulo major.*

coryli. 339. C. cinereo fuſcoque varius, elytrorum ſutura dimidiata atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 154. *mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 205.
Habitat in Angliæ *corylo.*

Spengleri. 32. C. fuſcus, elytris flavis: lineis atris glaberrimis abbreviatis inæqualibus, pedibus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 174. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 229. *Herbſt Beſch. der. berl. Naturf. Fr.* 4. *t.* 7. *f.* 7.
Habitat in America, *ſtatura c. pini.*

vit-

vittatus. 33. C. ater, elytris ſtriis albis rubrisque abbreviatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 173. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 228.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 610. *n.* 33. Curculio longirostris, elytris lineis albis luteisque.
Sloan. jam. 2. *p.* 210. Scarabæus Curculio.
Habitat in America *meridionali, inſulisque oppoſitis.*

bivittatus. 340. C. niger, elytris punctato-ſtriatis: vitta marginali dorſalique interrupta flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 230.
Habitat in inſula S. Thomæ, *ſtatura c. Spengleri.*

lividus. 341. C. griſeus, thorace elytrisque cinereo atroque maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 191. *n.* 175. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 231.
Brown illuſtr. 129. *t.* 49. *f.* 8.
Habitat in America *meridionali, magnus.*

pulcher. 342. C. coleoptris atris: ſtriis ſex dorſalibus approximatis abbreviatis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 176. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 232.
Brown illuſtr. 126. *t.* 49. *f.* 6.
Habitat in Jamaica, *ſtatura vittati.*

hiſtrionicus. 343. C. griſeus, thorace lineis lateralibus fulvis, elytris albis: maculis atris fulvisque. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 177. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 233.
Sparrm. nov. act. Sthockh. 1785. 1. *p.* 44. *n.* 17. *t.* 2.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

Rohrii. 344. C. elytris acuminatis griſeis: baſcos margine flaveſcente. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 178. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 234.
Habitat in inſulis, Americæ *oppoſitis.* v. Rohr.

impreſſus. 345. C. niger, thorace elytrisque punctis impreſ-

fis albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 179. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 235.
Habitat in Jamaica, *ſtatura pulchri.*

cervinus. 70. C. griſeus, antennis baſi rufeſcentibus. *Fn. ſuec.* 627. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 160. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 213. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 15. *Degeer inſ.* 5. *p.* 220. *n.* 13. Curculio griſeo-æneus.
Habitat in Europa, *femoribus interdum dentatis.*

ſtriatus. 346. C. fuſcus, elytris ſtriis cinereis nigro punctatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 214.
Habitat in Africa, *parvus.*

Lacerta. 347. C. griſeus, elytris ſtriatis, antennis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 214. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 215.
Habitat in India, *ſtatura cervini, at triplo major.*

velox. 348. C. piloſus niger, elytris margine, puncto baſeos, faſcia interrupta, punctoque apicis albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 216.
Habitat in Cayenna, *parvus.*

argyreus. 74. C. femoribus ſubmuticis, corpore toto viridi argenteo aureoque maculato. *Muſ. Lud. Ulr.* 54. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 128. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 159.
Habitat in America *auſtrali &* India, *facie argentati, femoribus primoribus ſpina obſoleta armatis.*

imperialis. 349. C. elytris ſtriis elevatis atris ſulcisque punctatis viridi-aureis alternis, baſi gibbis apice acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 129. *mant. inſ.* 1. *p.* 110. *n.* 160.
Drury inſ. 2. *t.* 33. *f.* 1.
Lindenberg Naturf. X. p. 86. *n.* 4. *t.* 2. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, maximus, inſectorum facile pulcherrimum.*

regalis. 75. C. corpore viridi-fericeo: faſciis aureis repandis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 130. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 161.
Habitat in America *meridionali, magnitudine & ſtatura germanici, femoribus fuſcis; annulo aureo.*

margi-natus. 350. C. fuſcus, elytrorum ſutura abdominisque marginibus aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 131. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 162.
Habitat in America.

19-punctatus. 351. C. caneſcens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris novemdecim. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 132. *mant. inſ.* 1. *p.* 111. *n.* 163.
Habitat in Cayenna.

viridis. 76. C. viridis, thoracis elytrorumque lateribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 139. *mant. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 175. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 7.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 616. *n.* 76. Curculio breviroſtris, femoribus muticis, corpore viridi ſupra obſcuro, ſubtus flavidiore.
Degeer inſ. 5. *p.* 256. *n.* 45. Curculio flavo cinctus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 3. *f.* 24.
Schaeff. elem. t. 108.
icon. t. 53. *f.* 6.
Habitat in Europæ *pomona, magnitudine & ſtatura c. pyri, antennis pedibusque nigris.*

gibber. 352. C. vireſcenti-albus, elytris baſi unidentatis poſterius gibboſis. *Pall. ic. inſ. Ruſſ.* 1. *p.* 32. *t.* B. *f.* 14. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 112. *n.* 176.
Habitat in Cayenna.

fulvus. 353. C. fulvus, capitis baſi pedibusque fuſcis, ro-

roſtro emarginato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 177.
Habitat in Saxonia, *parvus.*

palliatus. 354. C. fuſcus, thoracis elytrorumque margine cinereo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 178.
Habitat in Germania, *ſtatura viridis, at paulo minor.*

aurifer. 355. C. corpore ferrugineo auro maculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 140. *mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 179.
Drury inſ. 1. *t.* 32. *f.* 1.
Habitat in America, *pedibus anterioribus elongatis.*

cyanipes. 356. C. albus, elytris vita abbreviata dentata pedibusque cyaneis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 180.
Habitat in Cayenna, *antennis fuſcis cianeo-nitidis.*

tamariſci. 357. C. viridi-nitens, elytris viridi, ferrugineo nigro cinereoque variis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 181.
Habitat in Africæ *tamariſco, ſtatura ſplendiduli, at duplo fere major.*

ſplendidulus. 358. C. viridi-nitens, coleoptrorum diſco cinereo, cupreo nigroque faſciato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 141. *mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 182.
Habitat in Sibiria, *ſtatura argentati, at minor.*

curvipes. 359. C. argenteo-ſquamoſus, tibiis poſterioribus arcuatis intus dentatis ciliatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 113. *n.* 183.
Habitat in India, *mediæ magnitudinis.*

ſpeciofus. 77. C. corpore luteo viridi-nitente, elytris ſpinis ſparſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 55. *

Ha-

Habitat in America *auſtrali &* India, *ſpinis elytri utriusque* 5.

ruficornis. 78. C. corpore atro, thorace utrinque bituberculato, antennis rubris. *Fn. ſuec.* 636. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 162. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 217. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 13.
Habitat in Europa.

albinus. 79. C. niger, fronte anoque albis, thorace tuberculato. *Fn. ſuec.* 632. *Scop. ent. carn.* 66. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 192. *n.* 180. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 236. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 1.
Degeer inſ. 5. *p.* 255. *n.* 44. *t.* 8. *f.* 1. Curculio brevi-roſtris, antennis longis rubris, &c.
Uddm. diſſ. 27. Curculio niger, aculeis thoracis tribus, elytrorum ſex.
Habitat in Europa, *magis boreali, colore c. lapathi referens.*

latiroſtris. 360. C. roſtro latiſſimo plano, elytris apice albis: punctis duobus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 181. *mant. inſ.* 1. *p.* 118. *n.* 237. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 2. 3.
Sulz. hiſt. inſ. t. 2. *f.* 17. Silpha oblonga.
Geoffr. inſ. par. 1. *t.* 5. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 89. *f.* 6.
Habitat in Europa, *antennarum annulo rubro.*

albiroſtris. 361. C. roſtro latiſſimo plano elytrisque poſterius albis nigro variis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 287. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 238. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 80. *n.* 66. *t.* 24. *f.* 26. m.
Habitat in Germaniæ *inferioris betula, latiroſtri duplo major.*

planiroſtris. 362. C. nigro-æneus, roſtro latiſſimo plano pedi-

bus-

busque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 239.
Habitat Kilonii, *parvus*,

margi-nellus. 363. C. niger, thoracis elytrorumque margine albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 182. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 240.
Habitat in Africa, *æquinoctiali ſtatura verrucoſi, at minor.*

linea-tus. 80. C. fuſcus, thorace ſtriis tribus pallidioribus. *Fn. ſuec.* 630.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 155. *mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 206. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 16. 17.
Degeer inſ. 5. *p.* 247. *n.* 35. Curculio breviroſtris, antennis fractis, &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 283. Curculio roſtro thoracis longitudine, &c.
Schaeff. ic. t. 103. *f.* 8.
Habitat in Europæ *ſalice putrida, plantisque variis.*

lunatus. 364. C. coleoptris elevato-ſtriatis: faſcia ſemicirculari maculaque poſteriore albis; lunula nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 156. *mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 207.
Habitat in Angla.

fulvi-pes. 365. C. tomentoſo-virescens, pedibus teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 208.
Habitat Halæ Saxonum, *ſtatura parva lineati.*

ruficol-lis. 366. C. teſtaceus, capite elytrisque ſtriatis cinereo fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 116. *n.* 209.
Habitat Halæ Saxonum, *parvus.*

unda-tus. 367. C. fuſcus, elytris apice pallidis: ſtriga undata fuſca. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 157. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 210.

Ha-

Habitat in Germania, *parvus*, *ſtatura lunulati.*

hiſpidulus. 368. C. fuſcus, thorace cinereo lineato, elytris hiſpidis: punctis obſcurioribus ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 158. *mant. inſ* 1. *p.* 117. *n.* 211.
Habitat Kilonii *in plantis aquaticis.*

ſcabriculus. 369. C. corpore cinereo hiſpido. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 158. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 212. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *f.* 21.
Mant. p. 531. Curculio breviroſtris femoribus muticis, cinereus, elytris hiſpidis.
Habitat in Sueciæ *arenoſis.*

incanus. 81. C. oblongus fuſcus, thoracis dorſo plano. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 147. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 193. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *f.* 37. *Herbſt. apud Fuesslı arch. inſ.* 5. *t.* 24. *f.* 24.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 616. *n.* 81. *Fn. ſuec.* 631. * Curculio breviroſtris cinereus oblongus, elytris obtuſiuſculis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 282. *n.* 10. Curculio cinereo ſquamoſus, &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 242. *n.* 28. Curculio griſeo apterus.
Liſt. ſcar. angl. p. 394. *n.* 30.
Habitat in Europæ *pinetis.*

coſtatus. 370. C. cinereus, thorace nigro: lineis quatuor cinereis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 194.
Habitat in Gallia *auſtrali*, *magnitudine incani.*

interruptus. 371. C. obſcurus, coleoptrorum faſcia interrupta alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 148. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 195.
Habitat in nova Hollandia, *mediæ magnitudinis.*

ſcutellaris. 372. C. ater, elytris crenato-ſtriatis, pedibus anterio-

rioribus elongatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 196.
Habitat in terra van Diemen, *magnus.*

longimanus. 373. C. fuſcus, thoracis margine punctisque duobus ferrugineis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 149. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 197.
Habitat in Braſilia.

raucus. 374. C. nigricans, elytris griſeis cinereo punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 150. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 198. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 82. *n.* 64. *t.* 24. *f.* 25.
Habitat in Germania.

ſpinifex. 375. C. cinereus fuſco irroratus, thorace acute ſpinoſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 199.
Habitat - - - - *gibbus, mediæ magnitudinis.*

chloropus. 82. C. niger, antennis pedibusque rufis. *Fn. ſuec.* 635. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 163. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 218. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *f.* 19.
Habitat in Europæ *plantis, parvus, valde oblongus.*

triſtis. 376. C. niger, elytris ſtriatis cinereis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 164. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 219. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *f.* 28.
Habitat in Anglia, Suecia.

adſperſus. 377. C. ater, elytris poſterius albo maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 165. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 220.
Habitat in nova Hollandia.

punctatus. 378. C. fuſcus, elytris punctis holoſericeis elevatis margineque flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 166. *mant. inſ.* 1. *p.* 117. *n.* 221.
Habitat in Europa *boreali.*

ob-

obscurus. 379. C. ovatus ferrugineo-fuscus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 191. *n.* 167. *mant. inf.* 1. *p.* 118. *n.* 222.
Habitat in Europa *boreali.*

niger. 380. C. ovatus scaber niger, pedibus rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 191. *n.* 168. *mant. inf.* 1. *p.* 118. *n.* 223.
Habitat in Germania.

variolosus. 381. C. niger, thorace carinato varioloso, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 191. *n.* 169. *mant. inf.* 1. *p.* 118. *n.* 224.
Habitat in Saxoniæ *campis.*

stictic us. 382. C. thorace elytrisque varioloso nigris albo punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 191. *n.* 170. *mant. inf.* 1. *p.* 118. *n.* 225.
Habitat ad Caput bonæ spei.

vulgus. 383. C. ater nitens, elytris punctato-striatis, femoribus annulo cinereo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 191. *n.* 171. *mant. inf.* 1. *p.* 118. *n.* 226.
Habitat in America *meridionali.*

succinctus. 384. C. ater, elytris margine lineolisque duabus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 191. *n.* 172. *mant. inf.* 1. *p.* 118. *n.* 227.
Habitat ad Caput bonæ spei.

rufipes. 83. C. cinereus oblongus, pedibus rufis. *Fn. suec.* 634. *
Habitat in Europa.

nebulosus. 84. C. canus, elytris fasciis obliquis nigris. *Fn. suec.* 635.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 142. *mant. inf. p.* 118. *n.* 184. *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 4. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 278. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 8. *Fn. suec.* 1. *n.* 448. Curculio albo nigroque varius,

rius, proboſcide planiuſcula carinata thoracis longitudine.

Degeer inſ. 5. *p.* 241. *n.* 27. Curculio carinatus. *Friſch. inſ.* 11. *p.* 32. *t.* 23. *f.* 5. *Schaeff. ic. t.* 25. *f.* 3. *Knoch Beytr.* 1. *t.* 6. *f.* 8. ε) Curculio nebuloſus capenſis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 44. *n.* 18. *t.* 2.

Habitat in Europæ *campis frequens*, ε) *duplo major ad* Caput bonæ ſpei.

fulcirostris. 85. C. oblongus cinereus ſubnebuloſus roſtro trifulcato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 143. *mant. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 185. *Sparrm. nov. act. Stockh* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 45. *n.* 19. *t.* 2. *Bonsdorf. curc. Suec.* 2. *f.* 5.

Habitat in Europæ *plantis*, *& ad* Caput bonæ ſpei, *ſtatura & magnitudine nebuloſi.*

emarginatus. 385. C. oblongus fuſcus, coleoptrorum dorſo cinereo: lineis duabus punctorum impreſſorum atrorum. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 186.

Habitat Halæ Saxonum, *ſtatura nebuloſi*, *coleoptris apice emarginatis.*

perlatus. 386. C. niger, abomine albo; punctis elevatis glabris atris, roſtro ſulcato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 187.

Habitat in Sina, *ſtatura & magnitudine ſulciroſtris.*

glaucus. 387. C. roſtro carinato thoraceque inæquali obſcuris, elytris glaucis: puncto poſterius elevato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 188.

Habitat Kilonii, *magnitudine & ſtatura albini.*

albidus. 388. C. oblongus fuſcus elytris albidis: faſcia media lituraque baſeos apicisque fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 114. *n.* 189.

Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. *p.* 83. *n.* 75. *t.* 24.

24. *f.* 31. Curculio candidus.
Habitat in Germania, *nebuloſo minor.*

lusitanicus. 389. C. oblongus ſupra fuſcus, elytris macula baſeos alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 144. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 190.
Habitat in Luſitania, *ſtatura & magnitudine incani.*

crenulatus. 390. C. cinereus, elytris lineis elevatis tribus crenulatis atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 145. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 191.
Habitat in nova Hollandia.

punctatulus. 391. C. niger, elytris punctis nigris albisque alternis holoſericeis ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 187. *n.* 146. *mant. inſ.* 1. *p.* 115. *n.* 192.
Habitat in inſula terræ novæ, *magnitudine c. liguſtici.*

ater. 86. C. oblongus ater, antennis rufis. *Fn. ſuec.* 637.* *Bonsd. curc. Suec.* 2. *f.* 20.
Habitat in Europa, *an mera varietas chloropodis?*

emeritus. 87. C. niger, thorace elytrisque ſpinoſis fronte excavata. *Muſ. Lud. Ulr.* 56.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 190. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 249.
Habitat in America *auſtrali* & India, *aranei triſti facie.*
Elytra *verrucis piloſis adſperſa.*

barbarus. 88. C. thorace ſubſpinoſo, elytris angulo duplici criſpato. *Fabr. ſp. inſ. p.* 194. *n.* 191. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 250.
Habitat in Barbaria & Calabria, *minor in* Apulia, *duplo minor in* Gallia, *punctis excavatis adſperſus.*

algirus. 392. C. cinereus, thorace ſpinoſo ſulcato, elytris an-

angulo duplici ſpinoſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 251.
Habitat in Africa & Calabria, *barbaro triplo minor.*

criſpatus. 393. C. thorace mutico ſcabro, elytris lineis tribus elevatis dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 192. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 252.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

globoſus. 394. C. thorace ſpinoſo quinqueſulcato, elytris lævibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 193. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 253. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 50. *n.* 33.
Drury inſ. 1. *t.* 32. *f.* 4.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *an vere diſtinctus ab obeſo?*

obeſus. 395. C. ater, thorace ſpinoſo inæquali, elytris rubris: punctis nigris confertis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 194. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 254. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 50. *n.* 32. *t.* 2.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

ſcalaris. 396. C. ater, thorace ſpinoſo inæquali, elytris ſtriis rufis denticulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 195. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 255.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

cultratus. 397. C. cinereus, thorace tuberculis duobus compreſſis, elytris tuberculatis poſterius cinereis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 196. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 256.
Habitat in nova Hollandia.

capenſis. 89. C. ater, thorace elevato-punctato, elytris ſtriato-crenatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 59. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 184. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 242. *Sparrm.*

Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. 1. *n.* 4. *p.* 44. *n.* 16. *t.* 2.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

Vitulus. 398. C. niger, fronte bidentata, elytris uniſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 185. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 243.
Habitat in Tierra del Fuego.

inæqualis. 399. C. griſeus, thorace inæquali anterius prominulo, elytris ſulcatis, poſterius bidentatis, roſtro triſulcato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 186. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 244.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *mediæ magnitudinis.*

roſtratus. 400. C. fuſcus, capite thoraceque cylindricis anguſtioribus, elytris poſterius ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 187. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 245.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *mediæ magnitudinis.*

Spectrum. 401. C. thorace coleoptrisque globoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 188. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 246.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *parvus*, *ſingularis ſtaturæ.*

acuminatus. 402. C. cylindricus fuſcus, elytris apice acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 194. *n.* 189. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 247.
Habitat in nova Scelandia.

capiſtratus. 403. C. fuſcus, elytris acuminatis crenato-ſtriatis, roſtro ſulcato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 248.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magnus.*

verrucoſus. 90. C. æneo-niger, elevato-punctatus, elytris poſte-

fterius verrucoſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 60. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 183. *mant. inſ.* 1. *p.* 119. *n.* 241.
Drury inſ. 1. 32. *f.* 5.
Habitat in Æthiopia.

cornutus. 91. C. cinereus, thorace elytrisque ſubſpinoſis, capite ſpinis faſciculato piloſis. *Muſ. Lud. Ulr.* 57. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 197. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 257.
Bonsd. nov. act. Stockh. 1785. 1. *n.* 4. *p.* 46. *n.* 24. *t.* 2.
Habitat in nova Hollandia & *ad* Caput bonæ ſpei.

Tribulus. 404. C. cinereus, thorace ſcabro anterius impreſſo, elytris ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 198. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 258.
Habitat in nova Hollandia, *roſtro thoracem fere æquante, apice incraſſato.*

retuſus. 405. C. griſeo-fuſcus, elytris poſterius retuſis dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 199. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 259.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura cornuti.*

quadridens. 406. C. cinereus, thorace ſcabro, elytris ſpinoſis: ſpinis quatuor; poſterioribus longioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 200. *mant. inſ.* 1. *p.* 120. *n.* 260.
Habitat in nova Hollandia.

quadriſpinoſus. 407. C. albidus, elytris quadriſpinoſis, roſtro fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 201. *mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 261.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

Clavus. 408. C. albicans, thorace canaliculato, coleoptris ſpinoſis: lineolis tribus baſeos rubris. *Fabr. ſp. inſ.*

inf. 1. *p.* 196. *n.* 202. *mant. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 262.
Habitat in nova Hollandia.

noduloſus. 409. C. thorace lineis ſex noduloſis, elytris ſpinoſis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 196. *n.* 203. *mant. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 263.
Sparrm. nov. act. Stockh. 1785. 1. *n.* 4. *p.* 42. *n.* 12 ? Curculio noduloſus.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

rubifer. 410. C. cinereus, thorace ſcabro, elytris ſpinis elevatis ſanguineis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 196. *n.* 204. *mant. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 264.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

globifer. 411. C. thorace ſcabro, elytris ſpinoſis poſterius acuminatis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 206. *mant. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 265.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

pilularius. 412. C. thorace utrinque ſpinoſo noduloſo, elytris tuberculato-ſtriatis apice acuminatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 266.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *globifero proxime affinis.*

frontalis. 413. C. ater, fronte retuſa, thorace elytrisque tuberculato-ſeriatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 43. *n.* 14.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *præcedentibus affinis.*
Thorax *tuberculorum lineis* 4, *elytra conicorum utrinque tribus aſpera.*

16-punctatus. 92. C. cæruleſcens, thorace punctis nigris quatuor, coleoptris ſedecim. *Muſ. Lud. Ulr.* 58. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 133. *mant. inf.* 1. *p.* 111. *n.* 164.

Habitat in Brasilia, *crabronis magnitudine, ad latera thoracis aureus.*

decorus. 414. C. supra fuscus, thorace coleoptrisque vittis duabus viridi-aureis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 134. *mant. inf.* 1. *p.* 111. *n.* 165.
Habitat in America *meridionali.*

nitidulus. 415. C. viridi-squamosus, elytris punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 135. *mant. inf.* 1. *p.* 111. *n.* 166.
Habitat in Cayenna, *squamis cum ætate pereuntibus niger.*

candidus. 416. C. elytris spinosis albis: macula laterali fusca. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 136. *mant. inf.* 1. *p.* 111. *n.* 167.
Habitat in Cayenna.

niveus. 417. C. niveus, thoracis dorso rostroque fuscis, elytris spinosis acuminatisque. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 111. *n.* 168.
Habitat in Cayenna, *statura candidi.*

lacteus. 418. C. albus auro nitidulus, elytris sulcatis acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 137. *mant. inf.* 1. *p.* 111. *n.* 169.
Habitat in Jamaica, *mediæ magnitudinis, rostri apice bifido.*

smaragdulus. 419. C. virescens, elytris punctatis: spina anteriore posterioreque erecta valida. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 111. *n.* 170.
Habitat in Cayenna, *statura candidi, at paulo minor.*

8-tuberculatus. 420. C. cinereo fuscoque varius, coleoptris puncta-

ctatis, posterius gibbis: tuberculis octo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 112. *n.* 171.
Habitat in Cayenna, *statura candidi.*

Servus. 421. C. capite thoraceque obscure ferrugineis, elytris fuscis: punctis maculisque albis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 112. *n.* 172.
Habitat in Cayenna, *statura & magnitudine octo-tuberculati.*

modestus. 422. C. cinereus, thorace elytrisque fusco maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 138. *mant. inf.* 1. *p.* 112. *n.* 173.
Habitat in nova Seelandia, *mediæ magnitudinis.*

flavescens. 423. C. obscurus, thoracis elytrorumque acuminatorum lateribus flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 112. *n.* 174.
Habitat in America *meridionali, viridi affinis, at paulo major.*

granulatus. 93. C. viridis striatus punctis nigris elevatis. *Mus. Lud. Ulr.* 61. *
Habitat in America *australi* & India, *magnitudine scarabæi stercorarii.*

abbreviatus. 94. C. subfuscus, elytris griseis: striis atris glabris elevatis abbreviatis. *Mus. Lud. Ulr.* 62. *
Gron. zooph. 597. *
Habitat in Martinica.

apterus. 95. C. thorace spinoso: cruce impressa, elytris ferrugineo punctatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 196. *n.* 206. *mant. inf.* 1. *p.* 121. *n.* 267.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 619. *n.* 95. Curculio brevirostris, pedibus muticis, corpore atro, thorace spinoso, elytris coadunatis, abdomine punctato. *Degeer inf.* 5. *p.* 275. *t.* 16. *f.* 1. Curculio cruciatus.

Sparrm. nov. act. Sthockh. 1785. 1. *n.* 4. *p.* 49. *n.* 31. *t.* 2.

ε) Curculio ornatus. *Drury inf.* 2. *t.* 34. *f.* 3.

Habitat in India & *ad* Caput bonæ ſpei, *maximus.*

ocellatus. 424. C. thorace ſpinoſo anterius excavato, elytris cinereis: punctis atris ſubocellatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 207. *mant. inſ.* 1. *p.* 121. *n.* 268.

Habitat in Madagaſcar.

nivoſus. 425. C. thorace elytrisque ſeriatim tuberculatis niveo lineatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 41. *n.* 11.

Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſubtus albido & flaveſcente pruinoſus vel minutim ſquamoſus.*

nycthemerus. 426. C. albus, thorace elytrisque in parte ſumma atris, faſciis longitudinalibus albis nigrisque alternantibus, abdomine atro, ad latera niveo maculato. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 41. *p.* 42. *n.* 12.

Habitat ad Caput bonæ ſpei.

Argus. 427. C. tomentoſus, capite thoracisque margine anteriore griſeo alboque punctatis, elytris ſtriis elevatis albo cinereoque maculatis punctatisque *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 43. *n.* 15.

Habitat ad Caput bonæ ſpei.

Porculus. 428. C. cinereo-fuſcus piloſus, thorace lineis quinque, elytris poſterius maculis duabus albis. *Sparrm. nov act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 45. *n.* 20.

Habitat ad Caput bonæ ſpei.

Tottus. 429. C. ex cinereo & fuſceſcente rufus, roſtro triſtriato, pedibus ſæpe rufeſcentibus. *Sparrm. nov. act.*

act. Stockh. 1785. 1. *n.* 4. *p.* 45. *n.* 21.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

atratus. 430. C. glabriuſculus nigro-nitens, elytris ſtriatis: interſtitiorum punctis impreſſis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 46. *n.* 22.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

cordiger. 431. C. thorace ſubdidymo cordato, utrinque aculeato, elytis ſtriatis punctatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 46. *n.* 23.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

Tauriculus. 432. C. niger, fronte rotundata punctata, thorace bicarinato punctato ſubcriſpato ſcabro, elytris lineis quatuor tuberculoſis, infimis abbreviatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 47. *n.* 25.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

Juvencus. 433. C. fronte excavato-retuſa, thorace ſcabro utrinque unidentato, elytris utrinque tuberculorum ſerie abbreviata triplici. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 47. *n.* 26.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *tauriculo affinis, at quadruplo minor.*

ephippiatus. 434. C. thorace tuberculis rugisque ſcabro, elytris utrinque ſerie ſeſquitertia ſpinularum: futura ſpinulis connivent.bus. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 47. *n.* 27.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

cuculatus. 435. C. fronte depreſſa ſcabra, thorace anterius porrecto roſtroque biſulcato canaliculatis, elytris pone bituberculatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 48. *n.* 28.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *griſeus, antennis, oculis, pedumque maculis nigris.*

Uva.

Uva. 436. C. ater, capite emarginato, thorace anterius foveolato, elytris nodulis subglobosis confertis glabris: macula baseos thoracis utrinque supra & subtus femorumque ferruginea. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 49. *n.* 29.
Habitat ad Caput bonæ spei.

biglobatus. 437. C. niger rostro canaliculato, thorace globoso punctato scaberrimo, elytris punctato-scabris: tuberculorum utrinque ordinibus duobus. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 49. *n.* 30.
Habitat ad Caput bonæ spei.

calvus. 438. C. ater, thorace utrinque punctis elevatis scabro: disco laeviusculo, elytris striis elevatis glabriusculis: sulcis interjectis impresso-punctatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 50. *n.* 34.
Habitat ad Caput bonæ spei.

senilis. 439. C. fuscus griseo irroratus, thorace teretiusculo, elytris striis elevatis lævibus distantibus ternis aut quinis: interstitiis planis impresso-punctatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 50. *n.* 35.
Habitat ad Caput bonæ spei.

Platina. 440. C. subtus lateribusque albo argenteo viridique aureo splendidus, supra pedibusque griseus, elytrorum fasciis longitudinalibus atris. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 50. *n.* 36.
Habitat ad Caput bonæ spei.

Gallina. 441. C. griseus, subtus canus, thorace utrinque sulcis quinque subarcuatis obliquis, elytris leviter striatis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 51. *n.* 37.
Habitat ad Caput bonæ spei.

ar-

argyrnellus. 442. C. viridi-argenteus, oculis atris, roſtro ſupra plano: linea longitudinali nigra impreſſa. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 51. *n.* 39.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

nigellus. 443. C. nigricans, ſubtus ex griſeo rufeſcens, antennis rectis, thorace elytrisque ſpinuloſis. *Sparrm. nov. act. Stockh.* 1785. 1. *n.* 4. *p.* 52. *n.* 40.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura albini, ſed minor.*

Bonſdorfii. 444. C. oblongus albidiſſimus maculis quibuſdam faſciaque nigris, roſtro biſulcato fuſco. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *p.* 21. *n.* 5. *f.* 6.
Habitat in Sueciæ *potiſſimum ſaliciis, ſtatura ſulciroſtris, at duplo minor.*

teretiſcollis. 445. C. oblongo-ovatus, capite & thorace cylindricis anguſtis, elytris cinereis nigro lituratis. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *p.* 28. *n.* 14. *f.* 14. *Degeer inſ.* 5. *p.* 246. *n.* 33.
Habitat in Sueciæ *alnetis, non infrequens.*

lineellus. 446. C. oblongus cinereo-fuſcus, thorace ſtriis tribus pallidioribus, elytris utrinque linea longitudinali albida una. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *p.* 30. *n.* 17. *f.* 18.
Fn. ſuec. 1. *n.* 472. Curculio cinereus, faſciis longitudinalibus dilutioribus.
Habitat in Suecia, *pediculi magnitudine, lineato affinis.*

echinatus. 447. C. ferrugineus, abdomine globoſo, elytris ſetis erectis denſe echinatis. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *p.* 33. *n.* 21. *f.* 22.
Mull. zool. dan. prodr. p. 86. *n.* 947. Curculio ſcaber?

Ha-

Habitat in Suecia, *ſubtus fuſcus, ano rufo.*

Trunculus. 448. C. ater, abdomine ſubgloboſo, roſtro breviſſimo, antennis pedibusque rufis. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *p.* 33. *n.* 22. *f.* 23.
Habitat in Suecia.

capitatus. 449. C. fuſco-cinereus, ſutura elytrorum baſi nigra, roſtro breviſſimo lato, abdomine ſubgloboſo. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *p.* 33. *n.* 23. *f.* 24. *Degeer inſ.* 5. *p.* 245. *n.* 32.
Habitat in Sueciæ *pinetis, vulgatior, c. coryli proxime affinis.*

aſperatus. 450. C. cinereus, abdomine ovato, elytris ſetis erectis breviſſimis exaſperatis. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *p.* 34. *n.* 24. *f.* 25.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 288. *n.* 23.
Habitat Upſaliæ *in arbuſtis, primo vere ſub ſiccis foliis conſpicuus.*

fuſcicus. 451. C. ovatus, poſterius obtuſiſſimus obſcurus, thorace carinulato, antennis & pedibus fuſcis. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *p.* 37. *n.* 29. *f.* 30.
Habitat in Suecia.

murinus. 452. C. ovatus griſeo-fuſcus, elytris pallide maculatis, poſterius ſetoſis, roſtro ſulcato. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *p.* 37. *n.* 30. *f.* 31. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 86. *n.* 943. *ſn. Fridrichſd. n.* 116.
Habitat in Scandinaviæ *plantis.*

clavipes. 453. C. oblongo-ovatus gibbus ater, antennis nigris, pedibus longis rufis, femoribus clavatis craſſis. *Bonſd. curc. Suec.* 2. *p.* 40. *n.* 35. *f.* 36.
Habitat in Hollandia Sueciæ.

inderienſis. 454. C. apterus ovatus opalino-albus, thorace utrin-

utrinque mucronato, elytris excavato-punctatis. *Pall. inf. ruff.* 1. *p.* 26. *t.* B. *f.* 5. *it.* I. *app. p.* 464. *n.* 36.

Lepech. it. I. *p.* 508. *t.* 16. *f.* 5.

Habitat circa lacum falfum Inderienfem *frequens, fabæ minoris magnitudine, tenebrionis apteri facie.*

nomas. 455. C. albus, roftro craffo biporcato, thorace fcaberrimo, elytris fufco oblique lituratis. *Pet. gaz. t.* 23. *f.* 4. ? *Pall. it.* I. *app. p.* 463. *n.* 31. *inf. ruff.* 1. *p.* 27. *t.* B. *f.* 6.

Habitat in aridiffimis deferti caſpici, *frequens circa fontes lacusque falfos, habitu nebuloſi, ſed major,* 10 *lineas longus.*

candidatus. 456. C. albo-nebulofus, roſtro craſſo: ſtria bifurca, thoracis dorſo cinereo: linea punctisque duobus niveis. *Pall. it.* I. *app. p.* 463. *n.* 23. *inf. ruff.* 1. *p.* 28. *t.* B. *f.* 7.

Habitat in ariáis deferti caſpici, *frequentiſſimus circa lacum* Inderienſem, *ſulcirоſtri paulo major, ſubtus candidiſſimus.*

roridus. 457. C. apterus rufeſcente albus, ſupra lituris punctisque ſubverrucoſis nigris, porco roſtri craſſi longitudinali. *Pall. inf. ruff.* 1. *p.* 28. *t.* B. *f.* 8.

Habitat in falſis torridis deſerti auſtralis ad Volgam, *circa falſularum & atriplicum radices, ſulcirоſtris magnitudine, at craſſior.*

Cenchrus. 458. C. dealbatus, thorace elytrisque lituris confluentibus cinereis nigro punctatis, roſtro craſſo uniporcato. *Pall. inf. ruff.* 1. *p.* 29. *t.* B. *f.* 9.

Habitat in torridis & ſqualidis deſerti Volgenſis *rarior, ſulcirоſtri minor, magis teres.*

te-

tetragrammus. 459. C. apterus cinerascens, thorace fusco: lineis quatuor lacteis, elytrorum lituris quatuor nigris, rostro crasso. *Pall. inf. russ.* 1. *p.* 29. *t.* B. *f.* 10.
Lepech. it. II. *app. p.* 329. *t.* 11. *f.* 28.
Habitat in squalidis aridissimis deserti Volgensis *maxime australis rarior, major, elegans.*

tribuloides. 460. C. thorace bicristato scabro, elytris spinis conicis axillaribus posterioribusque rostro crasso. *Pall. inf. russ.* 1. *p.* 30. *t.* B. *f.* 11.
Habitat in Rio Janeiro Americæ, *habitu indicensis, europæis omnibus major.*

nigrivittis. 461. C. cylindricus dealbatus, capite thoraceque subcarinatis: fascia utrinque longitudinali fusca. *Pall. inf. russ.* 1. *p.* 31. *t.* B. *f.* 12.
Habitat in aridis squalentibus deserti caspici, *frequens, octo lineas longus.*

Vibex. 462. C. cylindricus albissimus, thorace elytrisque striga utrinque nigra longitudinali. *Pall. inf. russ.* 1. *p.* 32. *t* B. *f.* 13.
Habitat in arenosis ad Selengam, *frequens.*

fenestratus. 463. C. apterus albus, rostro crasso, elytrorum maculis sex rhombeis fuscis. *Pall. inf. russ.* 1. *p.* 33. *t.* H. *f.* B. 16.
Habitat in fabulosis ad Selengam, *nebuloso minor.*

flaviceps. 464. C. apterus albus, capite flavescente lateribus rufo, rostro crasso, thorace elytrisque albo lineatis fusco interruptis. *Pall. inf. russ.* 1. *p.* 34. *t.* B. *f.* 17.
Lepech. it. II. *app. p.* 327. *t.* 11. *f.* 27.
Habitat in arenosis ad Selengam & Chonem, *rarior in* Tartariæ *desertis, magnitudine feminis atri.*

pi-

pictus. 465. C. albus, roſtro craſſo, thorace faſciis tribus longitudinalibus, elytrorum arcuata fuſcis. *Pall. it.* I. *app. p.* 463. *n.* 33. *inſ. ruſſ.* 1. *p.* 35. *t.* H. *f.* B. 18.
Habitat rarior in aridiſſimis ſalſis deſerti caſpici, *circa lacum quoque* Inderienſem.

hololeuco. 466. C. ſubcylindricus totus albus immaculatus, roſtro craſſo, oculis atris. *Pall. inſ. ruſſ.* 1. *p.* 35. *t.* H. *f.* B. 19.
Habitat in ſqualidis deſerti caſpici, *ſub atriplicibus & ſalſolis.*

tenebrioides. 467. C. apterus aterrimus glaber, elytris lævigatis. *Pall. inſ. ruſſ.* 1. *p.* 36. *t.* B. *f.* 20.
Friſch inſ. 13. *p.* 28. *t.* 26 ?
Schaeff. ic. t. 62. *f.* 11.
Habitat rarior in deſerti caſpici *aridis*, *hami inter tenebriones apteros.*

albator. 468. C. oblongus alatus niger, elytris nitidis punctatis, poſterius compreſſis pubeſcentibus: faſciis lateralibus niveis. *Pall. inſ. ruſſ.* 1. *p.* 36. *t.* B. *f.* 21.
Habitat in Braſilia, *major.*

noveboracenſis. 469. C. canus, elytris ſubfaſtigiatis: ſtriis quinque albidis nigro punctatis, ſcutello flavicante. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 35. *n.* 35.
Habitat in Noveboraco, 7 *lineas longus.*

melanogrammus. 470. C. corpore cano, ſutura elytrorum anterius nigra, nitida, roſtro breviſſimo. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 36. *n.* 36.
Habitat in Anglia, *incano dimidio minor.*

plagiatus. 471. C. ſubgloboſus, elytris punctis longitudinalibus impreſſis ſtriisque e cinereo & fuſco alternis.

nis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Gef.* 1. *p.* 284.
Habitat in Marchia, *ſtatura c. coryli, at multoties major.*

cinereus. 474. C. oblongus cinereus, elytris albido nebulosis: poſterius faſcia albida. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 285.
Habitat, rarus, Halæ Saxonum, *lineati ſtatura.*

fericeus. 473. C. corpore viridi-argenteo, antennis pedibusque rufis, femoribus poſterioribus ſubdentatis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 286.
Habitat Halæ Saxonum *in ſalice, æſtate frequentiſſimus, argentato affinis, lineati ſtatura & magnitudine.*

tenebricoſus. 474. C. niger nitidus, oculis fuſcis, elytris connatis acuminatis excavato-punctatis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 81. *n.* 67. *t.* 24. *f.* 27.
Habitat Berolini, *rariſſimus,* 5 *lineas longus, tenebrioidi affinis.*

Faber. 475. C. niger, roſtro lato, antennis fuſcis, elytris connatis: punctorum excavatorum ſeriebus octo. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 81. *n.* 68. *t.* 24. *f.* 28.
Habitat in Marchia.

major. 476. C. niger albido villoſus, thorace punctato rugoſo roſtrum æquante, elytris punctato-ſtriatis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 81. *n.* 69. *t.* 24. *f.* 29.
Habitat Berolini, *germanorum maximus.*

linzenſis. 477. C. apterus fuſcus, thoracis elytrorumque rufis. *Schranck enum. inſ. auſtr. p.* 123. *n.* 234.
Habitat Linzii.

ſplen-

splendidus. 479. C. viridis angustissimus, oculis fuscis, antennis pedibusque fuscescentibus, elytris punctato-striatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 82. n. 72. t. 24. f. 30.*
Habitat Berolini, 3 *lineas longus.*

trivialis. 480. C. cinereus, thorace lineis tribus exsoletis albis elytris maculis fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 82. n. 73.*
Habitat Berolini, 3 *fere lineas longus, statura c. polygoni.*

arenarius. 481. C. capite cano, thorace granulato pedibusque nigris, elytris connatis griseis punctato-striatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 22. n. 74.*
Habitat Berolini, *statura c. ligustici, at dimidio minor.*

berolinensis. 482. C. albicans, subtus varius, thorace rugoso nigro ad latera variegato, elytris fasciis duabus undulatis nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 83. n. 75. t. 24. f. 31.*
Habitat Berolini, *frequens nebuloso affinis, at multo minor.*

globatus. 483. C. capite thoraceque fuscescentibus subæneis, thoracis margine arcubusque duobus mediis longitudinalibus cinereis, abdomine subgloboso, elytris connatis punctato-striatis: interstitiis fasciis alternis cinereis & fuscescentibus maculisque obsoletis albidis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 83. n. 76. t. 24. f. 32.*
Habitat Berolini *frequens, variæ magnitudinis.*

Viverra. 484. C. fordide cinereus, rostro lato, thorace scabro, anterius turgido, per mediam longitudinem sulcato, elytris striatis: interstitiis scabris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 83. n. 77.*

Ha-

Habitat in Pomerania, *vix ſeſquilineam longus, antennis fuſcis.*

Herbſtii. 485. C. cinereus, thorace ſubgloboſo granulato, elytris rotundatis ſtriatis: ocellis rubro-aureis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. p. 84. n. 78.*
Habitat Berolini, *rarior.*

pyricola. 486. C. anguſtus ater, ſubtus antennisque ſpadiceus, thorace granulato, elytris ſulcatis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. p. 84. n. 79.*
Habitat in Pomerania, *vix 2 lineas longus, roſtro paulo longiore.*

granulatus. 487. C. ovatus griſeus, ſupra granulatus: granulis hinc inde rubris pellucidis, elytris connatis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. p. 84. n. 80. t. 24. f. 33.*
Habitat in Marchia, 3 *lineas longus.*

piniperda. 488. C. ſpadiceus, thorace elongato punctato, elytris punctato-ſtriatis, femoribus ſubdentatis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. p. 84. n. 81.*
Habitat in Marchia, 1½ *lineam longus, facie boſtrichi piniperdæ.*

futuralis. 489. C. elongatus cinereus fuſco ſubvarius, ſubtus, lateralibus futuraque albus, antennis oculisque nigris. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. p. 84. n. 82. t. 24. f. 34.*
Habitat in Marchia, *anguſtus*, 3 *lineas longus.*

Eremita. 490. C. ſupra flaveſcente-piloſus, roſtro tenui thoraceque ſubpunctato nigris, antennis elytrisque punctato-ſtriatis fuſcis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. p. 85. n. 83.*
Habitat in Marchia, 2 *lineas longus.*

bru-

bruchoides. 491. C. thorace elytrisque abbreviatis nigris granulatis & ſtriatis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. p. 85. n. 84.*
Habitat in Marchia, *brucho ſimilis, vix ultra dimidiam lineam longus, teres, craſſus roſtro pendulo.*

ſingularis. 492. C. ſubbreviroſtris cinereus, elytris ſtriis punctatis: punctis excavatis centro eminentibus. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1066. *n.* 3.
Habitat in Luſitania, *mediæ magnitudinis, femoribus clavatis.*

carinatus. 493. C. ſubbreviroſtris niger, thorace ſubcarinato, elytris angulatis tuberculatis. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1066. *n.* 3.
Habitat in Luſitania, *barbaro ſimilis, at quadruplo minor.*

oedematoſus. 494. C. niger glaber politus, elytris rubris. *Sulz. hiſt. inſ. p.* 40. *t.* 4. *f.* 10.
Habitat in Europa.

Cypri. 495. C. ſulcatus, linea dorſi longitudine atra. *Haſſelq. it. p.* 449. *n.* 100.
Habitat in Cypro.

albidus. 496. C. apterus ſupra albicans, ſubtus dilute roſeus, thorace bicuſpidato, elytris ſulcatis: punctis canis. *Lepech. it.* I. *p.* 313. *t.* 17. *f.* 7.
Habitat in Ruſſia.

bipunctatus. 497. C. thorace ſcabro, elytris nebuloſis: punctis ad apicem duobus nigris nitidis. *Lepech. it.* II. *p.* 205. *t.* 11. *f.* 25.
Habitat in Sibiria.

guttatus. 498. C. niger, vellere rufeſcente nigro punctato: pun-

punctis in elytris transparentibus. *Lepech. it. II. p.* 205. *t.* 11. *f.* 30.
Habitat in Sibiria.

populneus. 499. C. ater, femoribus pallidis. *Scop. ent. carn. n.* 74.
Habitat in Carniola, *c. fagi proxime affinis, at femoribus æqualibus.*

piger. 500. C. femoribus anterioribus clavatis, rostro striis elevatis tenis; lateralibus apice conjunctis. *Scop. ent. carn. n.* 65.
Habitat in Carniola.

iners. 501. C. rostro linea elevato unica, elytris striis decem punctatis. *Scop. ent. carn. n.* 68.
Habitat in Carniola.

resinosus. 502. C. niger scaber, abdomine subtus, elytris apice albidis. *Scop. ent. carn. n.* 67.
Habitat in Carniola.

picatus. 503. C. piceus, abdomine nigro, subtus albido, femoribus clavatis. *Scop. ent. carn. n.* 69.
Habitat in Carniola.

erraticus. 504. C. rostro apice concavo, elytris subvillosis striatis: stria tertia tuberculata. *Scop. ent. carn. n.* 70.
Habitat in Carniola.

C. album. 505. C. ex cupreo nigroque varius, elytris ad angulum baseos externum linea arcuata alba. *Scop. ent. carn. n.* 99.
Habitat in Carniola.

sensitivus. 506. C. niger, femoribus fulvis apice nigris. *Scop. ent. carn. n.* 100.
Habitat in Carniola.

nemoreus. 507. C. apterus niger opacus, capite glabro, rostro bifido, thorace elytrisque scabris acuminatis. *Scop. ent. carn. n.* 101.
Habitat in Carniola.

Momus. 508. C. rostro supra bisulcato, abdomine posterius fulvo villoso, femoribus anterioribus crassioribus. *Scop. ent. carn. n.* 102.
Habitat in Carniola.

Zoilus. 509. C. rostro deflexo, elytris striatis nigro punctatis. *Scop. ent. carn. in.* 103.
Habitat in Carniola.

quercinus. 510. C. niger, scutello trilobo: lobo anteriore albo, elytris puncto albo. *Scop. ent. carn. n.* 106.
Habitat in Carniolæ & Helvetiæ *quercu.*

carniolicus. 511. C. niger, thorace albido, elytris striis quinque elevatis nigro albo punctatis. *Scop. ent. carn. n.* 107.
Habitat in Carniola.

villosulus. 512. C. rufus subvillosus, elytris fasciis duabus obscurioribus obsoletis. *Scop. ent. carn. n.* 108.
Habitat in Carniola.

præcox. 513. C. ferrugineus, elytris striatis subvillosis. *Scop. ent. carn. n.* 109.
Habitat in Carniola, *sub finem Aprilis conspicuus.*

tricolor. 514. C. niger, thorace punctis binis albis, elytris punctatis: margine interiore albo, lineisque binis longitudinalibus flavis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 91. *n.* 45.
Habitat - - -

denti-rostris. 515. C. ovatus niger, rostro apice quadridentato. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 85. *n.* 941.
Habitat in Dania.

tardus. 516. C. nigricans, thorace elytrisque utrinque rufis: macula apicis atra. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 86. *n.* 942.
Habitat in Dania.

nodosus. 517. C. canescens, elytris nodulis minimis striatis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 86. *n.* 948. *Olaff. it. isl.* 1. *p.* 319. Silakkept.
Habitat in Islandia.

longicornis. 518. C. nigricans, thorace hirto, elytris cinereis: maculis flavicantibus, pedibus antennisque rufis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 86. *n.* 949.
Habitat in Dania.

opacus. 519. C. totus griseus laevissimus. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 46. *n.* 950.
Habitat in Dania.

bicolor. 520. C. griseus, antennis pedibusque rufescentibus. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 46. *n.* 951.
Habitat in Dania.

maculosus. 521. C. ovatus, obscure flavicans, elytris luteo maculatis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 46. *n.* 952.
Habitat in Dania.

fasciatus. 522. C. cervinus ovatus elytris lineis tribus elevatis: fascia posterius carinata. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 46. *n.* 955.
Habitat in Dania.

terlineatus. 523. C. elongatus cinereus, thorace terlineato, an-

antennis nigris. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 46. *n.* 956.
Habitat in Dania.

mollis. 524. C. griseo-auratus, elytris mollibus. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 960.
Act. Nidr. 4. p. 12. *t.* 16. *f.* 6.
Habitat in Scandinavia.

undulatus. 525. C. griseus nitens, fasciis elytrorum undulatis ferrugineis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 87. *n.* 961.
Act. Nidr. 4. *p.* 13.
Habitat in Scandinavia.

bispinus. 526. C. cæruleus, thorace utrinque spinoso, antennis nigris. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 91. *n.* 1023.
Schaeff. ic. t. 6. *f.* 4.
Habitat in Europa.

inermis. 527. C. violaceus, thorace puncto utrinque impresso, antennis nigris. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 91. *n.* 1025.
Schaeff. ic. t. 56. *f.* 8.
Habitat in Europa.

fuscatus. 528. C. nigro-fuscus, thorace utrinque fascia longitudinali, elytris duplici transversa cinerea. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 280. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

fimbriatus. 529. C. niger, thorace punctato, elytris alternatim striatis & punctatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 281. *n.* 9.
Habitat in Gallia.

exaratus. 530. C. oblongus totus niger, thorace punctato,

elytris fulcatis. *Geoff. inf. par.* 1. *p.* 282. *n.* 11.
Habitat in Gallia.

squamosus. 531. C. squamis nitentibus, thoracis elytrorumque fasciis longitudinalibus. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 284. *n.* 14.
Habitat in Gallia.

Geoffroei. 532. C. rufus subvillosus, capite nigricante. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 284. *n.* 15.
Habitat in Gallia.

graminеus. 533. C. cæruleo-viridis nitens, thorace punctato, elytris striatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 284. *n.* 16.
Pet. gazoph. p. 77. *n.* 6.
Habitat in Europa.

dolorosus. 534. C. oblongus niger, abdomine squamoso: lateribus albis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 285. *n.* 17.
Habitat in Gallia.

denticulatus. 535. C. ovatus ex nigro cinereus, thorace utrinque denticulato. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 288. *n.* 24.
Habitat in Gallia.

aculeatus. 536. C. subrotundus niger squamosus, elytris striatis, thorace utrinque aculeato: lateribus lineaque media albis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 288. *n.* 25.
Habitat in Gallia.

subglobosus. 537. C. subglobosus ex cinereo ater, striatus, rostro thoracis longitudine. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 289. *n.* 26.
Habitat in Gallia.

erythroleucos. 538. C. globosus rufus, elytris striatis: fascia transversa alba. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 289. *n.* 27. *Habitat in* Gallia.

leucozonius. 539. C. globoſus niger, elytris ſtriatis: faſcia tranſverſa alba. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 289. *n.* 28. *Habitat in* Gallia.

ſpinoſus. 540. C. totus fuſcus ſpinoſus, elytris ſtriis elevatis villoſo ſpinoſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 412. *n.* 97. *Habitat in* Gallia.

armus. 541. C. niger, ſcutello albicante, elytrorum ſtriis utrinque denticulatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 290. *n.* 31. *Habitat in* Gallia.

marmoratus. 542. C. lividus, coleoptris faſciis plurimis obſcuris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 291. *n.* 33. *Habitat in* Gallia.

bohemicus. 543. C. corpore, capite antennisque nigris, thorace papilloſo & elytris quatuor papillarum ordinibus inſignitis cinereis incanis. *Richter Abh. Naturg. Boehm. p.* 34. *Habitat in diſtrictu* Bohemiæ Reichenbergenſi, *ſubgloboſus, magnitudine dermeſtis pellionis.*

rotundatus. 544. C. apterus, corpore oblongo nitido nigro læví. *Degeer inſ.* 5. *p.* 243. *n.* 29. *t.* 7. *f.* 22. *Habitat in* Europa, $3\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

multicolor. 545. C. corpore ſubgloboſo ex rufo fuſco: punctis ex flavo griſeis, elytris carinatis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 244. *n.* 30. *Habitat in* alno, *mediæ magnitudinis.*

ochropus. 546. C. corpore oblongo viridi nitido, antennis pedibusque flavis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 245. *n.* 31. *Habitat in* Europa, *ultra* 2 *lineas longus.*

faſciculatus. 547. C. corpore ovato fuſco: faſciculis piloſis griſeis,

seis, antennis longis. *Degeer inf.* 5. *p.* 276. *n.* 10. *t.* 16. *f.* 2.
Habitat Surinami.

fulviro-stris. 549. C. nigro-æneus, rostro plano pedibusque flavescentibus. *Fabr. mant. inf.* 2. *app. p.* 381.
Habitat in Scania, *parvus.*

triangularis. 551. C. obscurus flavicans, thoracis basi triangulari, elytris striato-punctatis. *Petagn. inf. Calabr. p.* 14. *n.* 71.
Habitat Brancaleoni *in* Calabria, *in* carduorum *floribus frequens.*

formosus. 553. C. corpore virescente, antennis pedibusque rufis. *Mayer Abh. boeh. Ges.* 4. *p.* 183.
Habitat in Bohemiæ *floribus cardui*, *magnitudine t. pyri.*

carinatus. 582. C. griseus oblongus, rostro carinato: carina utrinque fuscata, thorace elytrisque punctatis: his polline griseo consperfis: punctorum ordinibus decem, pedibus anticis longioribus: femoribus tibiisque fusco annulatis. *Mus. Lesk. p.* 21. *n.* 445.
Habitat extra Europam.

crassirostris. 583. C. griseus, rostro crasso supra rugoso, thorace nigro punctato, elytris obsolete rugosis: pilis erectis hispidis, abdomine fusco. *Mus. Lesk. p.* 21. *n.* 449.
Habitat in Europa.

dealbatus. 584. C. oblongus varioloso niger, polline albo consperso, elytris fasciis obliquis duabos maculisque tribus albis, abdomine nigro punctato. *Mus. Lesk. p.* 21. *n.* 456.
Habitat in Europa.

in-

incinera-tus. 585. C. niger, thoracis lineis quatuor elytrorumque vittis quatuor punctisque ſparſis cinereis. *Muſ. Lesk. p.* 21. *n.* 450.
Habitat in Europa.

plani-roſtris. 586. C. ſubgloboſus griſeus, roſtro explanato, elytris ſtriatis erecto-piloſis. *Muſ. Lesk. p.* 21. *n.* 459.
Habitat in Europa.

varius. 587. C. elytris griſeo fulvoque variis punctato-ſtriatis: punctis holoſericeis fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 21. *n.* 461.
Habitat in Europa.

nævius. 588. C. nævius, roſtro craſſo ſupra plano fuſco, elytris rugoſis: ſutura elevata poſterius carinata, femoribus fuſcis, tibiis rufis griſeo ſquamoſis. *Muſ. Lesk. p.* 21. *n.* 463.
Habitat in Europa.

coraci-nus. 589. C. niger ovatus glaber, elytris connatis apice acuminatis thoraceque punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 465.
Habitat in Europa.

lati-roſtris. 590. C. elytris punctato-ſtriatis cinereo-piloſis, roſtro brevi lato ſtria dorſali exarato. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 466.
Habitat in Europa.

hirtus. 591. C. fuſcus, thoracis lineis quatuor, elytrisque hiſpidis punctato-ſtriatis griſeis: horum marginibus externis albidis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 467.
Habitat in Europa.

ruga-tus. 592. C. griſeus, thoracis dorſo elytrorumque rugoſorum ſutura ferrugineo-fuſca, thoracis dorſo utrin-

utrinque puncto. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 470.
Habitat in Europa.

infuſcatus. 593. C. roſtro thoraceque fuſcis : hujus lineis tribus griſeis, elytris tibiisque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 471.
Habitat in Europa.

obſoletus. 594. C. fuſco-griſeis, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 472.
Habitat in Europa.

fubrufus. 595. C. fulvo griſeus, antennis tibiisque rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 473.
Habitat in Europa.

clavipes. 596. C. oblongus fuſcus cinereo adſperſus, antennis tibiisque rufis, femoribus clavatis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 475.
Habitat in Europa.

exoletus. 597. C. fuſcus, elytris ſtriatis, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 478.
Habitat in Europa.

nubilus. 598. C. fuſcus griſeo-nebuloſus, roſtro lato plano, elytris ſtriatis, apice obtuſis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 479.
Habitat in Europa, *magnitudine pediculi, ſtatura c. Albini.*

tenebricoſus. 599. C. niger ſubæneus ovatus hirtus punctato-ſtriatus, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 481.
Habitat in Europa.

lutoſus. 600. C. lutoſus ovatus, antennis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 22. *n.* 482.
Habitat in Europa.

RHI-

RHINOMACER. *Antennæ* fetaceæ, roſtro inſidentes.

Palpi quatuor extrorſum craſſiores.

curculioides. 1. Rh. villoſo-griſeus, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 1. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 1. Rhinomacer curculioides.
Habitat in Italia, *ſtatura cuculionis, ſubtus cinereus, pedibus nigris.*

atrelaboides. 2. Rh. villoſo-piceus, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 123. *n.* 2.
Habitat in Sueciæ *pinetis, curculioide minor.*

cæruleus. 3. Rh. cæruleſcens ſubvilloſus antennarum baſi pedibusque flavis. *Petagn. inſ. Calabr. p.* 14. *n.* 72. *f.* XXXIV.
Habitat ad littora Calabriæ, Brancaleoni; *an forte Attelabi ſpecies?*

ATTELABUS. *Caput* poſterius acuminatum, inclinatum.

Antennæ moniliformes, apicem verſus craſſiores.

* *maxilla bifida.*

coryli. 1. A. niger, elytris rufis reticulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 1. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 619. *n.* 1. *Fn. ſuec.* 638. *Amœn. acad.* 5. *t.* 3. *f.* 171. Attelabus niger, elytris rubris. *It. ſel.* 153. Curculio niger, elytris rubris, capite poſtice elongato. *Degeer inſ.* 5. *p.* 257. *n.* 46. *t.* 8. *f.* 3. Curculio excoriato-ruber. *Geoffr.*

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 273. *n.* 11.
Pontopp. atl. Dan. p. 205. *n.* 1. *t.* 16.
Sulz. hift. inf. t. 4. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 75. *f.* 8.
Habitat in coryli *foliis, quæ in cylindrum convolvit & utrinque claudit.*

avellanæ. 2. A. niger, elytris, thorace pedibusque rubris.
Scop. ent. carn. 71. Curculio collaris.
Schaeff. ic. t. 56. *f.* 5. 6.
Habitat in Germaniæ *corylis, a. coryli fimilis; an mera varietas?*

bicolor. 32. A. niger, thorace elytrisque rufescentibus, scutello femorum tibiarumque basi & apice nigris. *Muf. Lesk. p.* 23. *n.* 504.
Habitat in Europa.

denigratus. 33. A. niger, thorace elytrisque rubris, dorsi macula tibiis femorumque basi & apice nigris. *Muf. Lesk. p.* 23. *n.* 505.
Habitat in Europa.

erythropterus. 34. A. niger, elytris rubris lævissime striato-punctatis. *Muf. Lesk. p.* 23. *n.* 506.
Habitat in Europa.

bipustulatus. 11. A. ater, elytris macula baseos rufa. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 200. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 2.
Habitat in America *septentrionali.*

gemmatus. 14. A. ferrugineus, tuberculis nigris sparsis. *Thunb. nov. inf. spec.* 3. *p.* 68. *f.* 80. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 4.
Habitat ad Caput bonæ spei, *magnitudine & figura a. coryli.*

indicus. 15. A. ferrugineus, capite, elytrorum basi fasciaque

que cyaneis. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 68. *f.* 18. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 5.
Habitat in India, *statura & magnitudine melanuri.*

curculionoides. 3. A. niger, thorace elytrisque rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 200. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 6. *Scop. ent. carn.* 72. Curculio nitens. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 273. *n.* 10. *Suiz. hist. inf. t.* 4. *f.* 12. *Schaeff. ic. t.* 75. *f.* 8.
Habitat in Europæ *corylo, salice, a. coryli similis, sed minor.*

surinamensis. 4. A. elytris apice bidentatis.
Habitat Surinami, *pensylvanico similis, a. coryli minor, niger; elytris fuscis, pedibus ferrugineis, antennis albo nigroque annulatis.* Rolander.

pensylvanicus. 5. A. niger, elytris rubris: fascia media apicisque nigra. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 3.
Habitat in America *boreali, statura surinamensis, sed minor, maxillis pedibusque rufis, antennis obtusis basi flavescentibus, thorace oblongo glabro.*

melanuros. 6. A. niger, elytris testaceis, apice nigris.
Habitat Upsaliæ, *pensylvanico similis, sed major, antennarum abdominisque basi & elytris testaceis.*

angulatus. 16. A. ferrugineus, coleoptris angulatis: disco nigro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 7.
Habitat in Cayenna, *statura a. coryli, antennis & pectore nigris.*

ruficollis. 17. A. rufus, capitis vertice nigro, elytris cæruleis nitidis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 200. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 124. *n.* 8.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *p.* 87. *n.* 3. *t.* 25. *f.* 1. a.

Ha-

Habitat in Sibiria, *ſtatura a. coryli, antennarum apice cæruleo.*

pubeſcens. 18. A. violaceus hirtus, roſtro atro. *Fabr. inſ. 1. p.* 200. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 124. *n.* 9.
Habitat in Germania, *roſtro longiori.*

betulæ. 7. A. ater, pedibus ſaltatoriis. *Fn. ſuec.* 640. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*201. *n.*6. *mant. inſ.*1. *p.*124. *n.* 10.
Degeer inſ. 5. *p.* 259. *n.* 47. Curculio excoriato-niger.
Habitat in betulæ foliis, *quæ rodendo pulchre criſpa reddit, acyſſime ſaliens.*

** *maxilla unidentata.*
† *palpis poſterioribus ſecuriformibus*, Clerii.

mutillarius. 19. A. niger, elytris faſcia triplici alba baſi rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*201. *n.*1. *mant. inſ.* 1. *p.*125. *n.* 1. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.*87. *n.*1. *t.* 25. *f.* 2.
Schranck inſ. auſtr. n. 34. Dermeſtes formicarioides.
Habitat Halæ ſaxonum.

dubius. 20. A. rufus, elytris nigris: faſcia duplici alba baſique rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*201. *n.*2. *mant. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 2.
Habitat in America *boreali.*

ichneumonius. 21. A. capite thoraceque rufis, elytris nigris: faſcia media rufa ſtrigaque apicis alba. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 125. *n.* 3.
Habitat in America *boreali.*

formicarius. 8. A. niger, thorace rufo, elytris faſcia duplici alba.

alba basique rubris. *Fn. suec.* 641. *Scop. ent. carn.* 111. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 5.
Degeer inf. 5. *p.* 160. *n.* 3. *t.* 5. *f.* 8. Clerus formicarius.
Schranck inf. austr. p. 21. *n.* 31. Dermestes formicarius.
Raj. inf. p. 103. *n.* 29.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* 8.
Habitat in Europa & *boreali* America, *ptinum pertinacem devastans, larva inter cortices putridos.*

sphageus. 22. A. niger, fronte elytrorumque fascia cinereis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 4.
Habitat in America *boreali, statura & magnitudine formicarii.*

sexguttatus. 23. A. niger, fronte cinerascente, elytris maculis tribus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.*201. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 6.
Habitat in America *meridionali.*

quadrimaculatus. 24. A. niger, thorace rubro, elytris punctis duobus albis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 288. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 7.
Habitat in Halæ Saxonum *pinetis, parvus.*

unifasciatus. 25. A. niger, elytris fascia alba basi rubris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 125. *n.* 8.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* 13. Attelabus formicarius minor.
Habitat in Helvetiæ & Africæ *onopordo.*

octopunctatus. 26. A. cyaneus hirtus, elytris rufis: punctis quatuor nigris *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 126. *n.* 9.
Habitat in Hispaniæ *umbellatis, statura formicarii.*

ticolor. 27. A. rufus, capite nigro, elytris basi cæruleis,

me-

medio rufis apice violaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 10.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *formicario minor.*

bifaſciatus. 28. A. viridi-æneus pubeſcens, elytris cyaneis: faſciis duabus coccineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 11.
Habitat in Sibiria, *formicarii magnitudine.*

ſipylus. 9. A. viridis, elytris faſcia duplici flava interrupta, thorace hirſuto. *Muſ. Lud. Ulr.* 63. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 12.
Habitat in Africa, *ſtatura & magnitudine formicarii.*

Ammios. 29. A. viridis hirtus, elytris cyaneis: maculis tribus flavis; poſterioribus lunatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 13.
Habitat in Africæ *ammi majori*, *ſtatura & magnitudine apiarii.*

apiarius. 10. A. cæruleſcens, elytris rubris: faſciis tribus nigris.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 202. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 14. Clerus elytris rubris: faſciis tribus cæruleſcentibus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 204. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 4. Clerus nigro-violaceus hirſutus, &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 157. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 3. Clerus cæruleo-violaceus.
Schranck inſ. auſtr. p. 21. *n.* 36. Dermeſtes apiarius.
Swammerd. bibl. nat. t. 26. *f.* 3.
Reaum. inſ. 6. *t.* 8. *f.* 10.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 6. & 14.
Schaef. el. t. 46.
ic. t. 48. *f.* 11.
Habitat in Europa, America, Sibiria, *larva frequens*

quens in alveariis , imago in floribus , formicario duplo major.

cyaneus. 30. A. cyaneus , abdomine pedibusque teſtaceis.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 126. *n.* 15.
Habitat in India , *mediæ magnitudinis.*

crabroniformis. 31. A. niger hirtus , elytris rufis : faſciis tribus nigris ; tertia terminali. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 126. *n.* 16.
Habitat in Oriente , *apiario major.*

†† *palpis quatuor ſubfiliformibus* , Spondylides.

cerambοides. 12. A. ater , elytris rugoſis thorace latioribus. *Fn. ſuec.* 643.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 2.
Uddm. diſſ. 26. *t.* 1. *f.* 1. Curculio maximus ater oblongus , elytris irregulariter reticulatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 32. *n.* 2. Tenebrio varioloſus.
Habitat in boleto fomentario; *nonne potius tenebrio?*

bupreſtoides. 13. A. ater , elytris nervoſis , thorace ſubgloboſo.
Fn. ſuec. 644. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 203. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 1.
Fn. ſuec. 1. *n.* 554. Bupreſtis ater.
Degeer inſ. 5. *p.* 84. *n.* 21. *t.* 3. *f.* 21. Cerambyx maxilloſus niger , &c.
Friſch inſ. 13. *p.* 23. *t.* 19. Scarabæus arboreus , collo craſſo.
Habitat in Europæ *ſilvis.*

NOTOXUS. *Antennæ* filiformes.
Palpi quatuor ſecuriformes.
Maxilla unidentata.

porcatus. 1. N. niger elytris porcatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 127. *n.* 1.

Ha-

Habitat in terra van Diemen, *molli major.*

violaceus. 2. N. pubescens niger violaceo-nitidus, elytris lævibus: punctis tribus flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 127. *n.* 2.
Habitat in nova Seelandia.

mollis. 3. N. pubescens, elytris nigris: fasciis tribus pallidis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 203. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 127. *n.* 3.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 621. *n.* 11. *Fn. suec.* 642. Attelabus griseus pubescens, elytris fasciis tribus pallidis.
Uddm. diss. 28. *t.* 1. *f.* 9. Curculio oblongus ruber, elytris nigris fascia triplici albicante.
Geoff. inf. par. 1. *p.* 305. *n.* 3. Clerus fuscus villosus, &c.
Degeer inf. 5. *p.* 159. *n.* 2. *t.* 5. *f.* 6. Clerus fusco fasciatus.
Schranck inf. austr. p. 22. *n.* 37. Dermestes mollis.
Habitat in Europæ *floribus.*

monoceros. 4. N. thorace in cornu supra Caput protenso. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 203. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 127. *n.* 4. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 88. *n.* 2. *t.* 25. *f.* 4.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 651. *n.* 14. Meloe monoceros.
Fn. suec. 638. Attelabus monoceros.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 356. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 8. Notoxus.
Habitat in Europæ *floribus.*

204. CERAMBYX. *Antennæ* ſetaceæ.
Palpi quatuor.
Thorax ſpinoſus aut gibbus.
Elytra linearia.

* *palpis quatuor æqualibus.*
† *filiformibus.*
† *maxilla cylindrica integra*, Prioni.
† *thorace ſpinis mobilibus.*

longimanus. 1. C. elytris baſi unidentatis apiceque bidentatis, antennis longis. *Muſ. Lud. Ulr.* 64. * *Gron. zooph.* 522. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 1.
Grew muſ. 163. *t.* 13. Nocoonaca.
Degeer inſ. 5. *p.* 102. *n.* 6.
Sloan. jam. 2. *p.* 209.
Merian. ſurin. t. 28.
Vinc. muſ. t. 1. *f. inf. med.*
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 2. *p.* 11. *t.* 1. *f.* a.
Aubent. miſcell. t. 64. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali*, *tibiis anterioribus in altero ſexu longiſſimis.*

trochlearis. 2. C. elytris fuſco canoque variis: punctis elevatis.
Habitat in India. Degeer.

†† *thorace marginato.*

fuliginoſus. 84. C. ater, thorace crenato unidentato, elytris apice crenato-dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 2.
Habitat in America *meridionali*, *antennis pedibusque interdum rufis.*

roſtratus. 85. C. thorace unidentato rufo, mandibulis inflexis acutis, ſterno ſpinoſo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 3.

Habitat in Siam, *mediæ magnitudinis, capite atro, antennis piceis, elytris nigris, pedibus rufis.*

cervicornis. 3. C. thorace utrinque tridentato, mandibulis porrectis extus uniſpinoſis, antennis brevibus. *Reuſ. Lud. Cir.* 65. * *Gron. zooph.* 523. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 12.

Degeer inſ. 5. *p.* 94. *n.* 1.
Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 6.
Merian. ſurin. t. 48.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 2. *p.* 12. *t.* 1. *f.* B.
Brown. jam. 429. *t.* 44. *f.* 8.
Aubent. miſcell. t. 90. *f.* 3.
Habitat larva in Americæ *ligno* bombacis, *exemto edulis, incolis in* deliciis.

armillatus. 4. C. thorace utrinque quadridentato, elytris ferrugineis nigro marginatis, femoribus poſterioribus unidentatis. *Gron. zooph.* 525. *t.* 15. *f.* 6. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 15.

Habitat in India, *maximus.*

damicornis. 86. C. thorace denticulato, mandibulis porrectis bidentatis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 16.

Mant. 1. *p.* 532. Cerambyx thorace marginato crenulato angulato, maxillis porrectis corniformibus introrſum bidentatis, antennis mediocribus.

Degeer inſ. 5. *p.* 97. *n.* 2.
Drury inſ. 1. *t.* 37. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, cujus incolis larva in deliciis.*

im-

imbricornis. 5. C. thorace bidentato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis, antennis perfoliato-imbricatis, brevioribus. *Gron. muſ.* 529.
Roeſ. inſ. 2. *ſcar.* 2. *t.* 1. *f.* 1.
Habitat in Carolina, *ſtatura coriarii, an mera hujus varietas?*

Faber. 6. C. thorace utrinque unidentato rugoſo, elytris piceis, antennis mediocribus. *Fn. ſuec.* 646. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 6.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 13. *f.* 1.
Friſch inſ. 13. *p.* 2. *t.* 17.
Schaeff. ic. t. 72. *f.* 3.
t. 111. *f.* 1.
Habitat in Europæ *ligno rarior.*

coriarius. 7. C. thorace tridentato, corpore piceo, elytris mucronatis, antennis brevioribus. *Fn. ſuec.* 647. * *Scop. ent. carn.* 161. *Gron. zooph.* 528. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 206. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 7.
Fn. ſuec. 480. Cerambyx niger, thorace planiuſculo, margine utrinque tridentato, coleoptris piceis.
Gadd ſat. 79. Cerambyx cinereo-nigricans, antennis & pedibus rufis.
Degeer inſ. 5. *p.* 59. *n.* 1. *t.* 3. *f.* 5. Cerambyx Prionus. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 198. *n.* 1. *t.* 3. *f.* 9. Prionus.
Raj. inſ. p. 95. *n.* 1.
Friſch inſ. 13. *t.* 9.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 26.
Roeſel inſ. 2. *ſcar.* 2. *t.* 1. *f.* 1. 2.
Schaeff. el. t. 103.
ic. t. 67. *f.* 3.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 13. *f.* 3. 4. 5. 6.
Voet coleoptr. 2. *t.* 3. *f.* 9.

Habitat in Europæ *betulis putridis, ova magna, oblonga, flavescentia pariens.*

gigan-teus. 87. C. thorace utrinque tridentato, corpore nigro, elytris ferrugineis, antennis brevibus. *Mant.* 1. *p.* 531. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 206. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 129. *n.* 14.
Aubent. misc. t. 64. *f.* 2.
Drury inf. 3. *t.* 49. *f.* 1.
Habitat in America *meridionali, mandibulis bidentatis.*

melanopus. 8. C. thorace ferrulato, corpore nigro, antennis brevibus, elytris mucronatis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 208. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 130. *n.* 25. Prionus thorace marginato dentato, maxillis porrectis multidentatis, elytris mucronatis.
Gron. zooph. 531.
Merian. furin. t. 24. *f.* 1.
Drury inf. 1. *t.* 38. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali, coriario duplo major.*

spinosus. 88. C. thorace multidentato nigro, elytris unidentatis testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 130. *n.* 26.
Habitat Tranquebariæ, *mediæ magnitudinis.*

barbatus. 89. C. thorace integro, mandibulis ferrugineo-hirsutissimis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 208. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 130. *n.* 27.
Habitat in America *meridionali, magnus.*

Thomæ. 9. C. thorace crenulato, corpore nigro, elytris glabris ferrugineis: margine luteo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 207. *n.* 15. *mant. inf. p.* 129. *n.* 19. *Herbst Besch. der berl. naturf. Fr.* 4. *t.* 7. *f.* 9.
Habitat in insulis Americæ *meridionali oppositis, 2 pollices longus.*

bi-

bilineatus. 90. C. thorace crenato albo lineato, elytris ferrugineis: atomis albis margineque luteo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 20.
Habitat in inſulis Americæ *oppoſitis.*

cinnamomeus. 10. C. thorace denticulato, corpore ferrugineo, elytris mucronatis. *Muſ. Lud. Ulr.* 66. *
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 208. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 24. Prionus thorace marginato denticulato, mandibulis porrectis tridentatis.
Merian. ſurin. 24. *t.* 24.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 2.
Drury inſ. 1. *t.* 40. *f.* 2.
Habitat in America *meridionali*, *elytris cinnamomeis.*

depſarius. 12. C. thorace ſubemarginato unidentato pubeſcente, corpore nigricante, antennis brevibus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 7.
Habitat in Suecia, *coriario minor*, *& dimidio anguſtior.*

mucronatus. 91. C. thorace bidentato, elytris rufis mucronatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 8.
Habitat in America *meridionali.*

curvus. 92. C. niger, thorace bidentato: dentibus arcuatis, elytris obtuſis teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 9.
Habitat in terra van Diemen, *mediæ magnitudinis.*

Luzonum. 93. C. thorace multiſpinoſo. mandibulis porrectis unidentatis apice bifidis, pedibus anterioribus elongatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 10.
Petiv. gazoph. t. 47. *f.* 1.
Habitat in inſulis Luzonum.

fer-

ferripes. 94. C. thorace multiſpinoſo, mandibulis porrectis apice tridentatis, pedibus ſpinoſo-ferratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 11.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *c. luzonum proxime affinis.*

attratus. 13. C. thorace utrinque bidento, corpore atro, antennis mediocribus antrorſum aculeato-ferratis. *Gronov. zooph.* 524. *t.* 14. *f.* 9.
Habitat in Zeylon.

lineatus. 14. C. thorace ferrulato dentato, elytris nigris: linea alba, antennis compreſſis brevioribus.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 204. *n* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 4. Prionus thorace marginato crenato unidentato niger albo vittatus, elytris apice crenato-dentatis.
Sloan. jam. 2. *p.* 209. *t.* 237. *f.* 34.
Brown jam. 430. *t.* 43. *f.* 7.
Habitat in America *meridionali*, *inſulisque oppoſitis.*

nitidus. 95. C. thorace crenato unidentato, cyaneo-æneus, elytris cupreis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 128. *n.* 5.
Habitat in Braſilia, *coriario paulo minor.*

ſpinibarbis. 15. C. thorace ſubcrenulato, capite ſub maxillis ſpinoſo ſcabro, antennis brevibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 67. *
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 208. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 21. Prionus thorace marginato crenato, capite ſub mandibulis tridentatis.
Merian. furin. 24. *t.* 24.
Habitat in America *meridionali*, *niger.*

maxilloſus. 96. C. thorace crenato, mandibulis porrectis intus hirſutis quadridentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 22.

Dru-

Drury inf. 1. *t.* 38. *f.* 3.
Habitat in America *meridionali*, *ſpinibarbi affinis.*

canaliculatus. 97. C. thorace crenato: canali dorſali villoſo albo, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 23.
Habitat in inſulis Americæ *oppoſitis, coriario minor.*

biſaſciatus. 16. C. thorace denticulato, corpore nigro, elytris rubris: faſciis duabus atris, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 17.
Gron. zooph. p. 532. *t.* 14. *f.* 4.
Habitat in America *meridionali.*

cylindroides. 98. C. obſcurus, thorace tridentato, pectore abdomineque ferrugineis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 129. *n.* 18.
Habitat in America *boreali*, *mediæ magnitudinis.*

planatus. 17. C. thorace ſcabro anterius dentato, corpore nigro, antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 645.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 257. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 6. infuſus flavipes.
Habitat in Europæ *truncis decorticatis*, *pediculo duplo major*, *antennis mediocribus*, *vix hujus generis.*

†† *maxilla obtuſa unidentata*, Cerambyces.

barbicornis. 18. C. thorace ſpinoſo, antennarum quatuor primis articulis nigro-barbatis, corpore teſtaceo nigro variegato. *Muſ. Lud. Ulr.* 68.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 34.
Habitat in Aſia.

Am.

Ammiralis. 19. C. thorace subspinoso, antennarum quarto articulo barbato, secundo spinoso.
Habitat Surinami, *niger, elytrorum basi, thoracisque lateribus rufis.*

Batus. 20. C. thorace spinoso rugoso, elytris bidentatis, antennis longis uncinato-aculeatis. *Mus. Lud. Ulr.* 69.
Mus. Petrop. 652. *n.* 154. Capricornus niger cornutus.
Habitat in America *australi & India.*

aranei-formis. 21. C. thorace spinoso tuberculatoque, elytris porosis, antennis longis: articulo quinto barbato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 131. *n.* 3.
Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 24.
Drury inf. 1. *p. t.* 35. *f.* 4.
Habitat in America *meridionali, griseus, ædili duplo major.*

nodosus. 99. C. thorace spinoso, elytris cinereis nigro maculatis, antennis longissimis: articulo tertio apice nodoso. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 131. *n.* 4.
Habitat in Marilendia.

cancriformis. 100. C. thorace multideniato: dorso plano, elytris tibiisque anterioribus unidentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 131. *n.* 5.
Drury inf. 2. *t.* 35. *f.* 1. Cerambyx pustulatus.
Habitat in America *meridionali.*

tuberculatus. 101. C. thorace spinoso tuberculatoque, elytris punctatis spinosisque, antennis longis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 131. *n.* 6.
Habitat in Jamaica, *statura cancriformis.*

he-

hebræus. 102. C. thorace acute dentato: dorſo bicarinato, elytris cinereis fuſco ſtriatis maculisque. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 7. *Habitat in* America *meridionali*, *cinereus*.

Scorpio. 103. C. thorace quadriſpinoſo, elytris tuberculato-granulatis, tibiis anterioribus apice dilatatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 8. *Habitat in* America *meridionali*, *cinereus*.

Sentis. 23. C. thorace ſpinoſo lævi, elytris faſtigiatis biguttatis, antennis ſubtus aculeatis longioribus. *Habitat in* India, *griſeus*, *linea alba ab antennis per latera thoracis & abdominis ducta*, *antennis corpore ſeſquilongioribus*.

farinoſus. 24. C. piceus, thorace ſpinoſo, elytris punctis albis farinoſis ſparſis, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 55. *Degeer inſ.* 5. *p.* 108. *n.* 9. *t.* 13. *f.* 17. Cerambyx niger, &c.
Forſter nov. inſ. ſp. 1. *p.* 39. *n.* 39. Cerambyx chinenſis.
Merian. ſurin. t. 24. *f. inf.*
Drury inſ. 2. *t.* 31. *f.* 4.
Habitat in argemones mexicanæ *radice*, *larva albicans*, *capite caudaque nigris*, *imago lineolis duabus elytrorum mediis approximatis glabris*.

ferrugineus. 25. C. thorace ſpinoſo rugoſo, elytris faſtigiatis ſubferrugineis, antennis longis. *Muſ. Lud. Ulr.* 70. *
Habitat in India.

depreſſus. 26. C. depreſſus niger, cinereo variegatus, tho-

ra-

* Cerambycum *larvæ cortices & ligna rodunt, perforant, penetrant, extrahuntur a picis.*

race multiſpinoſo, elytris acuminatis, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 32.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 626. *n.* 26? Cerambyx thorace quadri-ſpinoſo: dorſo depreſſo, elytris faſtigiatis nebuloſis: anterius punctis elevatis ſparſis, antennis longis.

Schreb. inſ. 8. *f.* 10? Cerambyx lepturoides, thorace mucronato, elytris apice emarginatis, punctis elevatis ſcabris.

Habitat in inſulis, Americæ *meridionali oppoſitis*, *ſuccincti magnitudine.*

faſciatus. 104. C. cyaneus, thorace ſpinoſo, elytris faſcia flava, antennis mediocribus ante apicem flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 33.

Pall. ic. inſ. ruſſ. 2. *t.* F. *f.* 4.

Herbſt apud Fuesſli arch. inſ. 5. *t.* 25. *f.* 5.

Habitat Tranquebariæ.

glaucus. 28. C. glaucus, thorace quinqueſpinoſo, elytris muricatis: latere faſciaque nigris, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 9.

Degeer inſ. 5. *p.* 111. *n.* 13. *t.* 14. *f.* 4. Cerambyx tuberculatus.

Habitat in America *meridionali, ſubtus fuſcus.* Rolander.

bidentatus. 105. C. thorace ſubſpinoſo, elytris bidentatis ſcabris cinereo-fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 10.

Habitat in America *meridionali.*

nebulo- 29. C. thorace ſpinoſo, elytris faſtigiatis: punctis
ſus. faſcisque nigris, antennis longioribut. *Fn. ſuec.* *n.* 650. *It. gotl.* 173. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 215. 26.

26. *mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 36. *Scop. ent. carn. n.* 173.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 204. *n.* 7.
Voet. coleoptr. 2. *t.* 4. *f.* 4.
Degeer inſ. 5. *p.* 71. *n.* 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 7.
Habitat in abietum *truncis, quas librum deſtruendo necat.*

faſciculatus. 106. C. thorace ſpinoſo, elytris integris: punctis tribus hiſpidis, antennis mediocribus hirtis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 37.
Habitat in Germania, *medius quaſi inter nebuloſum & hiſpidum.*

hiſpidus. 30. C. thorace ſpinoſo, elytris anterius albidis apice bidentatis, antennis mediocribus hirtis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 37.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 215. *n.* 27. *Fn. ſuec.* 651. Cerambyx thorace ſpinoſo, elytris ſubpræmorſis punctisque tribus hiſpidis, antennis hirtis longioribus.
Fn. ſuec. 1. *n.* 484. *t.* 1. Cerambyx cinereus, elytris præmorſis nigris faſciaque alba, antennis ſeſquilongioribus.
Degeer inſ. 5. *p.* 71. *n.* 9. *t.* 3. *f.* 17. Cerambyx faſciculatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 206. *n.* 9.
Raj. inſ. p. 97. *n.* 4.
Schaeff. ic. t. 14. *f.* 9.
Friſch inſ. 13. *p.* 22. *t.* 16.
Habitat in Europa.

piloſus. 107. C. thorace biſpinoſo, elytris griſeis apice unidentatis, antennis mediocribus hirtis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 39.
Habitat Halæ Saxonum, *ſtatura hiſpidi, ſed minor, griſeus.*

ru-

rugicollis. 108. C. niger, thorace inermi rugosissimo, antennis mediocribus pedibusque piceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 135. *n.* 40.
Habitat Tranquebariæ.

longicornis. 109. C. thorace inermi: dorso plano, corpore fusco griseoque vario, antennis longissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 135. *n.* 41.
Habitat in Coromandel, *mediæ magnitudinis.*

marginalis. 110. C. thorace inermi, elytris subtestaceis: margine omni nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 215. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 135. *n.* 42.
Habitat ad Caput bonæ spei.

bivicornis. 111. C. thorace inermi viridi, elytris obscuris, antennis brevibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 135. *n.* 43.
Habitat in Sierra Leon Africæ.

defertus. 31. C. thorace spinoso-lineato, elytris bidentatis albo-fasciatis, antennis longioribus. *Mus. Lud. Ulr.* 71. *
Habitat in America.

succinctus. 32. C. thorace bispinoso rugoso, elytris fascia flava antennis longioribus compressis. *Mus. Lud. Ulr.* 72. *Gron.* * *zooph.* 535. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 213. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 133. *n.* 27. *Degeer inf.* 5. *p.* 113. *n.* 14. *t.* 14. *f.* 5. Cerambyx fusco castaneus.
Marcgr. bras. 254. Quici.
Drury inf. 1. *t.* 39. *f.* 2.
Habitat in America, *præsertim* Brasilia.

strigosus. 112. C. ferrugineus, thorace bispinoso rugoso, elytris flavo striatis, antennis longis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 133. *n.* 28.

Habitat in Cayenna, *ſtatura & magnitudine ſuccincti, antennarum corpore duplo longiorum femorumquo apice nigro.*

rufipes. 113. C. thorace biſpinoſo rufo, elytris lævibus nigris, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 29.
Habitat in America *meridionali, ſtatura & magnitudine ſtigmatis.*

dimidiatus. 114. C. thorace biſpinoſo rugoſo, flavus nigro punctatus, elytris nigris baſi flavis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 30.
Habitat in Cayenna, *ſuccincto paulo minor.*

bicolor. 115. C. ferrugineus, thorace biſpinoſo tuberculatoque, elytris ultra dimidium abdomineque atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 134. *n.* 31.
Habitat in Cayenna, *ſtatura & magnitudine rufipedis.*

virens. 33. C. thorace rotundato ſpinoſo, corpore viridi femoribus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 12.
Syſt. nat XII. 2. *p.* 627. *n.* 33. Cerambyx thorace ſpinoſo, elytris obtuſis, corpore viridi, antennis longioribus, femoribus unidentatis.
Drury inſ. 1. *t.* 40. *f.* 1.
Sloan. jam. 2. *t.* 237. *f.* 39. 40.
Brown jam. 430. *t.* 43. *f.* 8.
Habitat in inſulis Americæ *oppoſitis, antennis nunc longioribus, nunc brevioribus, femoribus nunc muticis, nunc dentatis.*

nitens. 116. C. viridi-nitens, thorace rotundato ſubſpinoſo, femoribus clavatis: clava anteriorum rufa. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 131. *n.* 13.

Ha-

Habitat in Africa *æquinoctiali*, *virenti affinis.*

afer. 117. C. thorace rotundato ſpinoſo, corpore viridi, antennis pedibusque rufis. *Mant. p.* 532. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 14.
Drury inſ. 1. *t.* 39. *f.* 4.
Habitat in Africa.

feſtus. 118. C. thorace ſpinoſo viridi, elytris violaceis baſi viridibus, femoribus ferrugineis unidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 15.
Habitat ab fluvium Gaboon Africæ.

vittatus. 119. C. viridis nitens, thorace ſpinoſo, elytrisque nigro lineatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 16.
Habitat in Braſilia.

velutinus. 120. C. thorace ſpinoſo niger: vitta atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 17.
Habitat in America *meridionali*, *virenti proxime affinis.*

futuratus. 121. C. ater, thorace ſpinoſo, elytris futura vittaque media aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. 132. *n.* 18.
Habitat in America *meridionali*, *velutino proxime affinis.*

torridus. 122. C. niger, thorace ſubſpinoſo, elytris viridibus apice ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 19.
Habitat in Sierra Leon Africæ.

Gigas. 123. C. niger, thorace rugoſo acuteque ſpinoſo, elytris ferrugineis, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 20.

Ha-

Habitat in India, *maximus hujus tribus.*

moschatus. 34. C. viridis nitens, thorace spinoso, antennis cyaneis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 210. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 131. *n.* 11.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 627. *n.* 34. *Fn. suec.* 652. * *Scop. ent. carn.* 165. Cerambyx thorace spinoso, elytris obtusis viridibus nitentibus, femoribus muticis, antennis mediocribus.
Fn. suec. 1. *n.* 478. Cerambyx viridi-cæruleſcen, antennis corpus ſubæquantibus.
Degeer inſ. 5. *p.* 64. *n.* 2. Cerambyx odoratus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 203. *n.* 5. Cerambyx viridi-cæruleſcens.
Mouff. inſ. 149. *f. ult.* Cerambyx tertius.
Raj. inſ. p. 81. *n.* 17.
Liſter ſcar. p. 384. *n.* 11.
Friſch inſ. 13. *t.* 11.
Ammir. inſ. t. 33.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* e.
Schaeff. ic. t. 11. *f.* 7. *& t.* 55. *f.* 1.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 13. *n.* 2. *t.* 2. *f.* 2.
Habitat in Europæ *ſalice, antennis pedibusque nunc cyaneis, nunc fuſcis, virous odorem gratum & ſoporiferum ſpirans, ova pariens candida, ſapida.*

ulpinus. 35. C. thorace ſpinoſo, coleoptris faſcia maculisque quatuor atris, antennis longis. *Fn. ſuec.* 654. *Scop. ent. carn.* 166. *Fabr ſp.inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 23.
It. ſcan. 260. Cerambyx ſubcæruleſcens, faſcia maculisque 4 nigris.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 202. *n.* 4. *t.* 3. *f.* 6.
Scheuchz. it. alp. 1. *t.* 1. *f.* 5.
Jonſt. inſ. t. 15. *f.* 3.
Mouff. inſ. 150. *f.* 2.
Rob. ic. 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* d.

Schaeff.

Schaeff. ic. t. 123. *f.* 1.
Drury inf. 2. *t.* 31. *f.* 5.
Habitat in Europæ *montoſis.*

ſcalatus. 124. C. fuſcus: linea longitudinali alva, thorace ſpinoſo, antennis longiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 24.
Habitat in America *meridionali*, *mediæ magnitudinis.*

cafer. 125. C. viridi-æneus, thorace ſpinoſo, elytris teſtaceis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 25.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *mediæ magnitudinis.*

Morio. 126. C. ater, thorace biſpinoſo rugoſo, antennis longioribus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 133. *n.* 26.
Habitat in Cayenna, *ſtatura & magnitudine ſuccincti.*

ædilis. 37. C. thorace ſpinoſo: punctis quatuor luteis, elytris obtuſis nebuloſis, antennis longiſſimis. *Fn. ſuec.* 653. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 1.
It. oel. Cerambyx nebuloſus, antennis corpore longioribus, thoracis punctis quatuor luteis.
Petiv. gaz. t. 8. *f.* 8. Capricornus ruſticus.
Degeer inſ. 5. *p.* 66. *n.* 5. *t.* 4. *f.* 1. 2.
Mouff. inſ. 151. *f.* 2.
Act. nidr. 4. *t.* 16. *f.* 8.
Friſch inſ. 13. *t.* 12.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 27.
Schaeff. ic. t. 14. *f.* 7.
Bergſtr. nomencl. 1. 3. 5. *t.* 1. *f.* 5. 6. *t.* 2. *f.* 1.
Habitat in Europæ *borealis arborum truncis*, *antennis pro ſexu diverſis.*

va-

varius. 127. C. thorace ſpinoſo tuberculatoque, corpore nigro cinereoque variegato, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 130. *n.* 2.
Habitat in Auſtria, *ædili minor.*

Cerdo. 39. C. thorace ſpinoſo rugoſo niger, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 21.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 629. *n.* 39. *Scop. ent. carn.* 162. Cerambyx thorace ſpinoſo rugoſo nudo, corpore nigro, antennis longis: articulis quatuor primis clavatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 201. *n.* 2.
Mouſſ. inſ. 149. *f.* 1.
Friſch inſ. 13. *t.* 8.
Drury inſ. 1. *t.* 39. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 14. *f.* 8.
Bergſtr. nomencl. 1. 8. 10. *t.* 1. *f.* 10. & *t.* 2. *f.* 3.
β) Cerambyx Heros. *Scop. ent. carn.* 163.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 200.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 11. *f.* 5. 6.
Habitat in Europæ *ligno*, β) *major.*

Heros. 128. C. niger, thorace ſpinoſo rugoſo, elytris apice ſubſpinoſis teſtaceis, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 132. *n.* 22.
Schaeff. ic. t. 24. *f.* 3.
Habitat in Europæ *quercu*, *cerdoni affinis.*

auricomus. 40. C. thorace quadriſpinoſo ater, elytris tæniis geminis aureis, pedibus poſterioribus latiſſimis compreſſis. *Gron. zooph.* 534. *t.* 16. *f.* 1.*
Habitat in America *meridionali*, *antennis corpore paulo longioribus.*

Juvencus. 53. C. thorace inermi rugoſo, elytris acuminatis nigris, lanuginoſo-caneſcentibus, antennis lon-

gissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 135. *n.* 44.
Habitat in America *meridionali ferrugineus*, *cat chariæ magnitudine.*

holosericeus. 129. C. thorace inermi rugoso, griseus, elytris unidentatis holosericeis fusco cinereoque micantibus, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 135. *n.* 45.
Habitat in India, *mediæ magnitudinis.*

longicollis. 130. C. thorace inermi elongato cylindrico niger ferrugineo irroratus, antennis longissimis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 135. *n.* 46.
Habitat in India, *mediæ magnitudinis*, *capite fusc*

Herbstii. 131. C. niger, thorace rugoso utrinque unispinoso, elytris supra viridi aureis: margine ad apicem fasciisque duabus rubris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 7. *p.* 168. *n.* 11. *t.* 45. *f.* 10.
Voet coleoptr. 2. *t.* 8. *f.* 26 ?
Habitat in America.

platypus. 132. C. cæsius, subtus, antennis pedibusque cæruleus, elytris ex purpureo viridi-aureis: lineis duabus elevatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 7. *p.* 169. *n.* 12. *t.* 45. *f.* 11.
Degeer inf. 7. *t.* 49. *f.* 3.
Habitat in India, *statura moschati.*

Insinatus. 133. C. thorace spinoso, corpore toto testaceo, elytris fascia undulata pallida. *Syst. nat.* XII. 2. *add. p.* 1067. *n.* 5.
Habitat in Lusitania, *culicis magnitudine*, *antennis ferrugineis*, *an hujus tribus ?*

balteus. 134. C. thorace spinoso, corpore ferrugineo, abdomine ovato, elytris fascia nigricante. *Syst. nat.* XII. 2. *add. p.* 1067. *n.* 6. *Ha-*

Habitat in Lusitania, *culicis magnitudine, antennis corpore vix longioribus, an ad hanc tribum spectat?*

smirnensis. 135. C. thorace teretiusculo subconvexo ad latera utrinque mucronato. *Hasselq. it. pal. p.* 451.
Habitat in Syria; *an huic tribui adscribendus?*

††† *maxilla bifida.*
† *cornea*, Lamiæ.

Tribulus. 136. C. thorace quadrispinoso, scutello elytrisque spinosis, antennis longioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 136. *n.* 1.
Habitat ad fluvium Gaboon Africæ.

fronticornis. 137. C. thorace spinoso, frontis cornu porrecto apice emarginato recurvo, antennis longis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 136. *n.* 2.
Drury inf. 2. *t.* 31. *f.* 2. Cerambyx bipunctatus.
Habitat ad Caput bonæ spei, *fuscus.*

pedicornis. 138. C. thorace elytrisque spinosos, femoribus anterioribus cornutis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 136. *n.* 3.
Habitat in nova Hollandia.

Hystrix. 139. C. thorace quinquespinoso, elytris fasciculato-pilosis, antennis mediocribus serratis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 136. *n.* 4.
Habitat ad Caput bonæ spei.

Crista. 140. C. griseus, thorace acute spinoso, elytris basi tuberculo compresso tridentato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 136. *n.* 5.
Habitat in nova Seelandia.

ambulator. 141. C. thorace anterius utrinque bispinoso, cor-

pore nebuloſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 6.
Habitat in inſulis Luzonum.

Rubus. 21. C. thorace ſpinoſo bimaculato, elytris bidentatis baſi ſcabris mucronatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 59.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 625. *n.* 21. Cerambyx thorace ſpinoſo, antennis ſubtus hiſpidis longis, elytris bidentatis baſique mucronatis albo bimaculatis.
Degeer inſ. 5. *p.* 106. *n.* 7. *t.* 13. *f.* 16. Cerambyx albo faſciatus.
Habitat in India.

ſpinicornis. 142. C. thorace ſpinoſo rugoſo, elytris griſeis truncatis, antennis compreſſis, articulis apice ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 60.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *rubro minor.*

brunnus. 143. C. brunneus, thorace triſpinoſo, elytris obtuſis: ſtriis duabus elevatis obſcuris, antennis compreſſis brevioribus. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 37. *n.* 37.
Degeer inſ. 5. *p.* 99. *n.* 3. *t.* 13. *f.* 13. Cerambyx penſylvanicus.
Drury inſ. 1. *t.* 37. *f.* 1.
Habitat in America *ſeptentrionali*, *moſchato major*, *an propria ſpecies huc ſpectans?*

ſcabrator. 144. C. ſubteſtaceus, thorace ſpinoſo, elytris punctis atris baſeos ſcabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 61.
Habitat in India.

Spengleri. 145. C. cinereus, thorace ſpinoſo tuberculato, elytris ſcabris: maculis duabus lateralibus atris.

Fa-

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 225. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 62.
Habitat in America *meridionali.*

bidens. 146. C. griſeus, thorace acute ſpinoſo, elytris apice bidentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 63.
Habitat in nova Hollandia.

Cantor. 147. C. thorace mutico cinereo nigro-punctato, elytris pallide teſtaceis apice bidentatis cinereis nigro maculatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 64.
Habitat in Sina, *mediæ magnitudinis, niger, cinereo-villoſus.*

Solandri. 148. C. niger, thorace ſubſpinoſo, elytris bidentatis fuſcis cinereo irroratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 65.
Habitat in nova Hollandia.

cornutus. 149. C. thorace obtuſe ſpinoſo, mandibulis baſi cornutis antennis longiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 50. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 66.
Habitat in America.

leprofus. 150. C. thorace ſpinoſo, elytris baſi varioloſis cinereis: macula laterali nigra, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 51. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 67.
Habitat in America.

capenſis. 36. C. niger, thorace biſpinoſo, elytris faſciis quatuor rufis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 25.
Poda muſ. 32. *n.* 3.
Petiv. gazoph. t. 3. *f.* 8.
Drury inſ. 1. *t.* 39. *f.* 3.
Voet coleoptr. 2. *t.* 8. *f.* 25.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

hot-

hotten-tottus. 151. C. thorace ſpinoſo rufo, elytris nigris: faſcia maculisque duabus marginalibus ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 26.
Brown ill. 118. *t.* 49. *f.* 1. cerambyx punctatus. *Voet coleoptr.* 2. *t.* 8. *f.* 26.

ferrugatus. 152. C. obſcure ferrugineus, thorace ſpinoſo, elytris obſcure virescentibus: ſtriga interrupta ſanguinea, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 27.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magnus.*

humeralis. 153. C. thorace ſpinoſo, elytris flavis nigro faſciatis anterius mucronatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 128.
Habitat - - - -

trifaſciatus. 154. C. ater, thorace ſubſpinoſo, elytris faſciis tribus flavis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 29.
Habitat in Sierra Leon Africæ.

jamaicenſis. 155. C. thorace ſpinoſo poſterius finuato: elytris flavis: faſciis duabus maculaque rhombea cyanea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 30.
Habitat in Jamaica.

nobilis. 156. C. thorace ſpinoſo atro: margine flavo, elytris atris: faſciis tribus flavis punctisque duobus albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 31.
Habitat in Cayenna, *ſtatura bifaſciati.*

æthiops. 157. C. ater thorace ſpinoſo, elytris faſciis duabus punctoque apicis luteis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 32.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

va-

variegator. 158. C. thorace ſpinoſo cinereo elytrisque fuſco variis, antennis longis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 33.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *mediæ magnitudinis.*

Sutor. 38. C. thorace ſpinoſo, elytris atris ferrugineo maculatis, ſcutello luteo, antennis longiſſimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 17.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 628. *n.* 38. *Fn. ſuec.* 655. *
Scop. ent. carn. 162. Cerambyx thorace ſpinoſo, elytris obtuſis atris ſubnebuloſis, ſcutello luteo, antennis longiſſimis.
Fn. ſuec. 1. *n.*482. Cerambyx ater, elytris punctatis maculis pallidis ſpartis, antennis corpore longioribus, thorace ſpinoſo.
Gadd diſſ. 27. Cerambyx nigro nebuloſus, ſcutello pallido, elytris fuſco æneis.
Degeer inſ. 5. *p.* 65. *n.* 4. Cerambyx atomarius.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 4.
Schaeff. ic. t. 65. *f.* 1.
Habitat in Europæ *ſilvis.*

Sartor. 159. C. niger, thorace ſpinoſo, ſcutello flavo, elytris immaculatis, antennis longiſſimis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 18.
Habitat Dreſdæ, *an major varietas ſutoris ?*

reticulator. 160. C. niger, thorace ſpinoſo nigro-lineato, elytrisque reticulatis fulvis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*219. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 19.
Habitat in India, *ſutoris magnitudine.*

molator. 161. C. obſcure cinereus fuſco-maculatus, thorace ſpinoſo, elytris apice rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 20.
Habitat in Cayenna, *mediæ magnitudinis.*

titillator. 162. C. thorace ſpinoſo, elytris cinereo fuſco glaucoque nebuloſis, antennis longiſſimis rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.*137. *n.* 21.
Habitat in Carolina.

vittator. 163. C. thorace ſpinoſo, elytris cinereo pulverulentis: vittis duabus flavis nigro marginatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.*137. *n.* 22.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 38. *n.* 38. Cerambyx incanus.
Petiv. gazooph. t. 24. *f.* 6.
Habitat ad Sinus Campechienſis *littora.*

oculator. 164. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris maculis quatuor flavis ſubocellaribus, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 219. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 138. *n.* 123.
Degeer inſ. 7. *t.* 49. *f.* 1. Cerambyx ocellatus.
Voet coleopt. 2. *t.* 7. *f.* 21.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

Textor. 41. C. thorace ſpinoſo, elytris convexis atris, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 7.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 629. *n.* 41. *Fn. ſuec.* 656. * *Scop. ent. carn.* 164. Cerambyx thorace ſpinoſo, elytris obtuſis convexis atris punctatis, antennis mediocribus.
Uddm. diſſ. n. 29. Cerambyx ſordide niger, punctis elevatis ſparſis, antennis crathis corporis longitudinem ſubæquantibus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 201. *n.* 3.
Degeer inſ. 5. *p.* 64. *n.* 3.
Schaeff. ic. t. 10. *f.* 1.
Bergſtr. nomencl. 1. 5. 8. *t.* 1. *f.* 8.
Habitat in Europæ *truncis arborum.*

va-

vaginator. 165. C. niger, thorace ſpinoſo rugoſo, elytris emarginatis ferrugineis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 8.
Habitat in India, *magnus.*

pulcher. 166. C. niger, anterius faſciis, poſterius punctis viridibus, thorace ſpinoſo, elytris baſi mucronatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 9.
Drury inſ. 1. *t.* 32. *f.* 6.
Habitat in Africa.

regalis. 167. C. thorace ſpinoſo viridi faſciato, elytris viridi irroratis: maculis tribus fulvis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 10.
Brown illuſtr. t. 50. *f.* 1.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *ſtatura pulchri.*

nigricornis. 168. C. griſeus, thorace mutico, elytris dorſo planis, antennis brevibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 11.
Habitat in Coromandel.

griſator. 169. C. griſeus, thorace mutico, elytris baſi tuberculis duobus apice ſpinoſis, antennis brevibus villoſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 136. *n.* 12.
Habitat Tranquebariæ, *mediæ magnitudinis.*

ſternutator. 170. C. thorace ſpinoſo, elytris baſi poroſis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 13.
Habitat in inſula Barbados.

gutturator. 171. C. thorace ſpinoſo, elytris teſtaceis albo irroratis: baſi punctis elevatis glabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 218. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 137. *n.* 14.
Habitat in Africa.

nu-

nubilus. 172. C. thorace inermi ferrugineo nigro lineato, elytris fusco ferrugineoque variis : macula marginali cinerea, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 137. *n.* 15.
Habitat in Germania, *mediæ magnitudinis.*

ariolator. 173. C. thorace spinoso lineato, elytris fuscis : linea semicirculari alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 137. *n.* 16.
Habitat in India.

tristis. 42. C. fuscus, thorace spinoso, elytris maculis duabus atris, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 139. *n.* 37.
Scop. ann. hist. nat. 5. *p.* 95. *n.* 54.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *p.* 90. *n.* 6. *t.* 25. *f.* 7.
Habitat in ligno cupressi Europæ *australis, antennis interdum corpore duplo longioribus.*

funestus. 174. C. fuscus, thorace spinoso, elytris lævibus : maculis duabus atris, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 139. *n.* 38.
Habitat frequens in Galliæ *sambuco, tristi proxime affinis, at duplo minor.*

punctator. 175. C. ater, thorace spinoso, elytris albo punctatis, antennis longis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 140. *n.* 39.
Forster nov. inf. sp. 1. *p.* 39. *n.* 39. Cerambyx chinensis.
Drury inf. 2. *t.* 31. *f.* 4. Cerambyx farinosus.
Habitat in Sina.

crispus. 175. C. thorace spinoso, elytris lineis tribus elevatis ferrugineis, antennis mediocribus, corpore cinereo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 140. *n.* 40.

Ha-

Habitat ad Caput bonæ ſpei.

rotator. 176. C. cinereus, thorace ſpinoſo, elytris ſubfaſciatis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 32. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 41.
Habitat in India.

glycyr- 177. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris albo-lineatis bicarinatis, pedibus ferrugineis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 42. *Pall. it.* II. *p.* 723. *n.* 60. *Sulz. hiſt. inſ. t.* 5. *f.* 9. Cerambyx ovatus?
Habitat in Sibiria, *fuliginatore triplo major.*

crucia- 178. C. niger, thorace ſpinoſo, coleoptris cruce tus. media alba. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 43. *Pall. ic. inſ. Ruſſ.* 2. *t.* F. *f.* 5.
Lepechin it. II. *p.* 198. *t.* 10. *f.* 8. Cerambyx crucifer.
Habitat in Ruſſia *magis auſtrali, ſtatura fuliginatoris, at paulo major.*

fuligi- 43. C. niger, thorace ſubſpinoſo, elytris cinera-nator. ſcentibus, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 44.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 205. *n.* 8.
Degeer inſ. 5. *p.* 70. *n.* 7.
Friſch inſ. 13. *t.* 19.
Voet coleoptris 2. *t.* 8. *f.* 30.
Habitat in Europa *auſtrali, ætate totus niger, lanugine deraſa.*

cinerarius. 179. C. cineraſcens, thorace ſpinoſo, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 45.
Pall. ic. inſ. ruſſ. 2. *t.* F. *f.* 11.
Habitat in Ruſſia *meridionali, ſtatura fuliginatoris, cui proxime affinis.*

ca-

carinatus. 180. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris piceis: carina laterali elevata albida, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 46.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. *p.* 91. *n.* 8. *t.* 25. *f.* 8.
Habitat in Sibiria, *ſtatura & magnitudine fuliginatoris.*

coquus. 44. C. thorace ſubſpinoſo hirſuto, elytris obtuſis ſulcatis atris anterius ferrugineis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 47.
Habitat in America *boreali, thoracis ſpinis minutiſſimis.*

ruſpator. 181. C. thorace ſpinoſo fuſco: maculis duabus ferrugineis, elytris fuſcis cinereo variegatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 223. *n.* 37. *mant. inſ.* 1. *p.* 140. *n.* 48.
Habitat in Africa *æquinoctiali, mediæ magnitudinis.*

tornator. 182. C. thorace ſpinoſo quadripunctato, elytris rufis: maculis quatuor nigris, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 223. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 59.
Forſt. nov. inſ. ſp. 1. *p.* 41. *n.* 41. Cerambyx trophthalmus.
Habitat in America *boreali.*

Bankſii. 183. C. griſeus, thorace ſubſpinoſo, elytris ferrugineo irroratis: faſciis duabus cinereis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 223. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 141. *n.* 50.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

ſaltator. 184. C. griſeus, thorace inermi, elytris faſciis duabus macularibus abbreviatis ſtrigaque poſterio-

riore punctata niveis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 141. *n.* 51.
Habitat - - - - *parvus.*

testator. 185. C. thorace spinoso cornuque brevi recumbente, corpore testaceo, antennis brevibus apice nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 223. *n.* 40. *mant. inf.* 1. *p.* 141. *n.* 52.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *parvus*, *brevis*, *villosus.*

Kæhleri. 50. C. niger, thorace spinoso elytrisque sanguineis: macula nigra. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 96. *n.* 56. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 219. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 138. *n.* 24.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 204. *n.* 6.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 1.
β) Cerambyx ungarica. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 90. *n.* 4. *t.* 25. *f.* 6.
Schaeff. ic. t. 153. *f.* 4.
Habitat in Europa *magis australi.*

pedestris. 51. C. ater, vitta integra alba, thorace spinoso, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 223. *n.* 41. *mant. inf.* 1. *p.* 141. *n.* 53.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 631. *n.* 51. Cerambyx thorace spinoso apterus niger, elytris tomentosis atris; fasciis alba, antennis mediocribus.
Poda inf. p. 34. *n.* 9. Cerambyx pedestris.
Scop. ent. carn. n. 168. Cerambyx arenarius.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *p.* 91. *n.* 9. *t.* 25. *f.* 9.
Habitat in Europa *magis australi.*

Scopolii. 186. C. niger, thorace spinoso, elytris unicoloribus, antennis brevibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 141. *n.* 54.
Scop. ent. carn. n. 169. Cerambyx æthiops.

Ha-

Habitat in Germania *auſtrali, pedeſtri proxime affinis, at paulo minor, elytris nunc nigris, nunc teſtaceis.*

germanicus. 187. C. ater, thorace ſpinoſo, elytris marginibus lineisque duabus utrinque coeuntibus albis.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 141. *n.* 55.
Habitat in Germania, *ſtatura & magnitudine pedeſtris.*

molitor. 188. C. fuſcus, vittis tribus integris albis, thorace ſubſpinoſo, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 56.
Habitat in India, *an varietas pedeſtris?*

tuberculator. 189. C. griſeus, thorace mutico, coleoptris baſi bituberculatis: maculis duabus communibus albis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 57.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *parvus.*

nutator. 190. C. villoſus, thorace mutico lineato cinereo, antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 142. *n.* 58.
Habitat in Tahiti, *tuberculatoris magnitudine.*

curculionoides. 64. C. fuſcus, thorace coleoptrisque ocellis quatuor atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 34.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 634. *n.* 64. Cerambyx thorace mutico, ocellis quatuor nigris, elytris ocello ſeſquialtero, antennis longis.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 101. *n.* 75. Leptura curculionoides.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 210. *n.* 5.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 1. & *t.* 155. *f.* 5.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

lu-

luſcus. 191. C. niger ferrugineo irroratus, thorace ſpinoſo rugoſo, elytris baſi macula ocellari atra, antennis longiſſimis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 35.
Habitat in Siam, *triſti paulo major.*

notatus. 192. C. obſcurus thorace ſpinoſo, elytris punctis duobus approximatis atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 139. *n.* 36.
Habitat in Cayenna, *ſtatura curculionoidis.*

fulvus. 193. C. apterus niger, thorace ſpinoſo, elytris rubris, abdomine brevioribus. *Schranck inſ. auſtr. p.* 139. *n.* 263. *Scop. ent. carn. n.* 170. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *t.* 25. *f.* 10.
Habitat in Auſtria.

ungaricus. 194. C. niger, capite thoraceque ſpinoſo linea longitudinali, elytris futura lineisque tribus albis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 91. *n.* 12. *t.* 25. *f.* 11.
Habitat in Ungaria.

triſaſciatus. 366. C. thorace ſpinoſo, elytris convexis nigris: faſciis tribus coccineis interruptis; apicis anguſtiore, antennis corpore longioribus. *Muſ. Lesk. p.* 24. *n.* 534.
Habitat extra Europam.

luteus. 367. C. oblongus, thorace quadriſpinoſo capite antennarum nigrarum baſi pedibusque luteis, dorſi lineis tribus fuſcis, elytris apice biſpinoſis flaveſcentibus: rugis duabus margineque fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 24. *n.* 535.
Habitat extra Europam.

Davieſii. 377. C. ater, thorace ſpinoſo, punctis maculisque plurimis fulvis, elytris ſubtriangularibus. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. *n.* 3. 3. 15. *t.* 8. *f.* 6.
Ha-

Habitat in sinu Hinduras Americæ, *curculionoide paulo major.*

†† *membranacea*, Saperdæ.

Carcharias. 52. C. thorace mutico cylindrico, corpore griseo nigro punctato, antennis mediocribus. *Fn. fuec.* 660. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 230. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 147. *n.* 1.
Degeer inf. 5. *p.* 73. *n.* 10. *t.* 3. *f.* 19. Cerambyx punctatus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 208. *n.* 1.
Pet. gaz. 5. *t.* 2. *f.* 1.
Goed. inf. 2. *t.* 51.
Lift. goed. f. 106.
Schaeff. ic. t. 38. *f.* 4. & *t.* 152. *f.* 4.
Drury inf. 1. *t.* 41. *f.* 5.
Bergstr. nomencl. 1. 5. 7. *t.* 1. *f.* 7.
ε) Cerambyx villosus. *Lepech. it.* II. *t.* 11. *f.* 18?
Habitat in Europæ, ε) Sibiriæ *silvis.*

confluens. 368. C. niger, thorace cylindrico, antennis mediocribus, elytris punctis confluentibus. *Muf. Lesk. p.* 26. *n.* 557.
Habitat in Europa.

fuscicornis. 369. C. testaceus, thorace longo utrinque tuberculato, femoribus clavatis ferrugineis, antennis fuscis. *Muf. Lesk. p.* 26. *n.* 558.
Habitat in Europa.

surinamus. 54. C. thorace mutico subcylindrico, corpore subferrugineo, elytris litura una alterave fusca, antennis mediocribus.
Habitat Surinami, *mediæ magnitudinis, elytris spina acutissima terminatis.*

fea-

scala-ris. 55. C. thorace mutico subcylindrico, coleoptris linea suturali dentata, punctisque flavis, antennis mediocribus. *Fn. suec.* 697. * *Scop. ent. carn. n.* 175. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 147. *n.* 2.
Degeer inf. 5. *p.* 77. *n.*14. Cerambyx flavo-viridis.
Scop. ann. hist. nat. 5. *p.* 102. *n.* 77. Leptura scalaris.
Frisch inf. 12. *p.* 29. *t.* 3. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 38. *f.* 5.
Hufn. inf. t. 7.
Habitat in Europæ *populo.*

candi-dus. 195. C. albus, thorace coleoptrisque fuscis: vittis duabus albis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 147. *n.* 3.
Habitat - - - statura & magnitudine scalaris.

ater-dus. 169. C. ater, elytris albo punctatis, antennis longis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 147. *n.* 4.
Habitat in Africæ *plantis, oculati magnitudine.*

rnode-stus. 197. C. niger, capite, thorace anoque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 147. *n.* 5.
Habitat in Africa *æquinoctiali, statura & magnitudine oculati.*

cardui. 56. C. fuscus, thorace lineato, scutello flavo, antennis longis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 23. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 94. *n.* 5. *t.* 26. *f.* 2.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 632. *n.* 56. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 101. *n.* 74. Cerambyx thorace mutico cylindrico, corpore fusco linea longitudinali flavicante, antennis longioribus.
Habitat in Europæ *magis australis* carduis, *quos maio devastat, statura populnei.*

melanoceras. 198. C. cinereus, thorace lineato, elytris fuscis unicoloribus, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 499. *mant. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 24.
Habitat Lipsiæ, *statura c. cardui, at paulo minor.*

futuralis. 199. C. virescens, thorace rotundato lineato, elytris acuminatis: futura alba. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 25.
Habitat in Africæ *plantis, statura c. cardui.*

mœstus. 200. C. thorace quadrispinoso, corpore fusco. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 26.
Habitat in nova Seelandia.

populneus. 57. C. thorace mutico cylindrico flavo-lineato, elytris punctis quatuor flavis, antennis mediocribus. *Fn. suec.* 661. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 27.
Gadd sat. 79. Cerambyx fusco-cinereus, antennis nigro alboque variegatis, elytrorum punctis octo luteis.
Degeer inf. 5. *p.* 78. *n.* 15. Cerambyx decempunctatus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 208. *n.* 3. Leptura nigra, &c.
Schaeff. ic. t. 48. *f.* 5.
β) *Bergst. nomencl.* 1. *t.* 2. *f.* 4?
Habitat in Europæ & Americæ *populetis*, β) *triplo minor.*

tremulus. 201. C. viridis, thorace punctis duobus, elytris quatuor nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 234. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 28.
Shaeff. ic. t. 101. *f.* 1.
Habitat Halæ Saxonum; *an varietas punctati?*

punctatus. 202. C. thorace mutico subcylindrico totus viridis: punctis nigris numerosis, antennis mediocri-

cribus. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1067. *n.* 7. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 29.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 10.
Habitat in Europa *magis auſtrali, antennis pedibusque nigris.*

virescens. 203. C. thorace villoſo cinereo, elytris ſubattenuatis viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.*499. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 30.
Habitat in Italia & Galliæ *ſambuco, ſtatura punctati.*

macroceras. 204. C. fuſcus, thorace cylindrico, pedibus teſtaceis, antennis longiſſimis nigris: annulo albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 234. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 31.
Habitat in Africa *æquinoctiali parvus.*

Volvulus. 205. C. ſupra niger, thorace cylindrico elytrisque margine cinereis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 33.
Habitat in Cayenna, *ſtatura cylindrici, at paulo minor.*

linearis. 58. C. niger, thorace mutico cylindrico, pedibus omnibus totis luteis, antennis mediocribus. *Fn. ſuec.* 663. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 232. *n.*6. *mant. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 9.
Scop. ent. carn. n. 153. Leptura parallela.
Schaeff. ic. t. 55. *f.* 6.
Herbſt apud Fuesslı arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 1.
Habitat in Europæ *ſilvis.*

cylindricus. 59. C. cylindricus niger, pedibus anterioribus luteis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 10.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 633. *n.* 59. *Fn. ſuec.* 662.

Cerambyx thorace cylindrico mutico, linea albida, elytris fastigiatis nigris, pedibus anticis pallidis.
De Geer inf. 5. *p.* 75. *n.* 12. Cerambyx cinereus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 208. *n.* 2. Leptura tota caeruleo-nigra.
Scopol. ent. carn. n. 157. Leptura cylindrica.
Rueſ. inf. 2. *ſcar.* 2. *t.* 3.
Habitat in pyri prunique *ramis.*

melanocephalus. 206. C. thorace cylindrico pedibusque rufis, corpore nigro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 148. *n.* 11.
Habitat in Africa, *ſtatura & magnitudine cylindrici.*

pilicornis. 207. C. violaceus, thorace rotundato, antennarum articulo primo ſecundoque clavato piloſis.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 148. *n.* 12.
Pall. inf. ruſſ. 2. *t.* F. *f.* 14.
Rozier Journ. de phyſ. 1. *t.* 1. *f.* B?
Habitat in America *meridionali, cylindrico paulo major.*

erythrocephalus. 208. C. rufus, thorace rotundato villoſo, antennis, pectore elytrisque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 148. *n.* 13.
Schranck inf. auſtr. n. 270.
Herbſt apud Fuesslii arch. inf. 5. *t.* 26. *f.* 3.
Habitat in Germania, *cylindrici ſtatura & magnitudine.*

ſibiricus. 209. C. cyaneus, thorace ſuſpinoſo, elytris faſciis duabus flavis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 148. *n.* 14.
Habitat in Sibiria, *ſtatura clavicornis, at paulo minor.* cla-

Antennæ breves, quæ corpore breviores, mediocres, quæ longitudine corporis; longæ, quæ corpore longiores ſunt.

clavicornis. 210. C. viridis, thorace rotundato, elytris maculis tribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 232. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 15.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

longipes. 211. C. violaceus, thorace ſubgloboſo, antennis longioribus, femoribus clavatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 16.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

latipes. 212. C. niger, thorace ſubgloboſo, femoribus clavatis apice violaceis, tibiis poſterioribus compreſſis, antennis longioribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 148. *n.* 17.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *mediæ magnitudinis.* Leske.

trilineatus. 213. C. griſeus, vittis tribus dentatis albis, antennis longis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 18.
Mant. p. 532. Cerambyx thorace cylindrico, corpore ferrugineo, elytris mucronatis, marginibus dentatis albis, antennis longiſſimis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 226. *n.* 7. Stenocorus trilineatus.
Drury inſ. 1. *t.* 41. *f.* 1.
Habitat in inſulis Americæ *oppoſitis.*

lateralis. 214. C. niger, thoracis lateribus elytrorumque vitta laterali ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 19.
Habitat in America *boreali.*

lynceus. 215. C. thorace atro: puncto utrinque ferrugineo, elytris griſeis acuminatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 233. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 149. *n.* 20.
Habitat in nova Seelandia.

gri-

grifeus. 216. C. grifeus, fcutello margine, elytris lineolis flavefcentibus. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 21.
Habitat in nova Seelandia.

analis. 217. C. teftaceus, elytrorum apicibus anoque nigris. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 233. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 149. *n.* 22
Habitat in Africa *æquinoctiali, mediæ magnitudinis.*

oculatus. 60. C. thorace mutico cylindrico luteo: punctis duobus nigris, elytris faftigiatis linearibus nigris. *Fn. fuec.* 664. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 231. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 147. *n.* 6.
Uddm. diff. 31. Cerambyx ferrugineo-rufus, elytris nigro-cinereis punctis excavatis nigris.
Degeer inf. 5. *p.* 74. *n.* 11. *t.* 3. *f.* 20.
Scop. ent. carn. n. 152. Leptura oculata.
Schaeff. ic. t. 128. *f.* 4.
Huffn. inf. t. 13.
Habitat in Europæ *filvis.*

hirtus. 218. C. ferrugineus grifeo-villofus, fcutello orbitaque oculorum fulvis. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 232. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 147. *n.* 7.
Habitat in nova Seelandia.

unicolor. 219. C. teftaceus, thorace rotundato punctato: antennis longis pedibusque concoloribus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 147. *n.* 8.
Habitat in infula Amfterdam oceani auftralis, *hirto minor.*

cantharinus. 82. C. ferrugineus, thorace cylindrico, antennis pedibusque nigris. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 150. *n.* 33.
Syft. nat. XII. 2. *p.* 637. *n.* 82. Cerambyx thorace fubmutico, corpore rufo, oculis femoribusque

que nigricantibus, elytris mollibus, antennis longioribus.
Fabr. ſp. inſ. 2. *app. p.* 500. Callidium thorace rotundato ſubſpinoſo rufum, antennis pedibusque nigricantibus.
Habitat in Germania, *mediæ magnitudinis.*

teutonicus. 220. C. niger, thorace cylindrico, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*235. *n.*23. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 34.
Habitat in Germania, *ſtatura cantharini.*

janthinus. 221. C. thorace cylindrico, corpore violaceo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 235. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.*150. *n.* 35.
Habitat in terra Pedemontana.

monſpelienſis. 222. C. niger, thorace cylindrico ſubſpinoſo, antennisque ferrugineis, elytris cyaneis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 36.
Habitat Monſpelii, *præuſto major.*

præuſtus. 223. C. niger, elytris flavis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*235. *n.*25. *mant. inſ.* 1. *p.*150. *n.*37. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 641. *n.* 24. *Fn. ſuec.* 506. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.*103. *n.* 80. Leptura (præuſta) thorace ſubgloboſo fuſco, elytris flavis apice nigris, pedibus quatuor pallidis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 209. *n.* 4.
Schaeff. ic. t. 52. *f.* 8.
Habitat in Europæ *ſilvis.*

Lineola. 224. C. niger, thoracis linea dorſali femoribusque apice rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*235. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 38.
Herbſt apud Fuesslı arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 4.
Habitat in Italia, *parvus.*

mi-

minutus. 225. C. fuscus, thorace cylindrico, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 235. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 150. *n.* 39.
Habitat in Anglia, *parvus.*

cæruleſcens. 226. C. thorace mutico cylindrico, albo-cæruleus, thoracis lineis tribus ſcutelloque pallidioribus. *Schranck. inf. auſtr. p.* 144. *n.* 271.
Scop. ent. carn. n. 160. Leptura cæruleſcens.
Herbſt apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 26. *f.* 5.
Habitat in Germania, Calabria, 5 *fere lineas longus.*

ferreus. 227. C. plumbeo-niger immaculatus, thorace cylindrico inermi, ſcutello albido. *Schranck inf. auſtr. p.* 145. *n.* 272. *Beytr. zur Naturg. p.* 66. §. 11.
Habitat in Auſtria, 4½ *lineas longus.*

puſtulatus. 228. C. niger, thorace inermi cylindrico: macula media fulva. *Schranck inf. auſtr. p.* 145. *n.* 273. *Beytr. zur Naturg. p.* 66. §. 10.
Habitat in Auſtriæ *floribus.*

ſilphoides. 229. C. niger, thorace mutico cylindrico, elytris lineis ſub tribus elevatis, femoribus tibiisque anterioribus medio fulvis. *Schranck inf. auſtr. p.* 145. *n.* 274.
Habitat Viennæ, *ad Maii finem conſpicuus.*

lividus. 230. C. niger, thorace dilute ferrugineo: punctis nigris elevatis, elytris flaveſcentibus. *Herbſt apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 95. *t.* 26. *f.* 7.
Habitat Berolini, *cantharino affinis.*

cyaneus. 231. C. cæruleus: punctis elevatis, thorace cylindrico, antennis pedibusque nigris. *Herbſt apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 95. *n.* 13. *t.* 26. *f.* 6.
Ha-

Habitat in Pomerania, 3 *circiter lineas longus.*

cincticornis. 232. C. thorace cylindrico: lineis sex longitudinalibus albis, elytris dentatis fuscis albo irroratis, antennis longis medio albo annulatis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 290. *t.* 1. *f.* 3.
Habitat - - - *statura populnei*, *longicorni affinis.*

M nigrum. 233. C. thorace mutico cylindrico, elytris griseo-nebulosis: macula albida M nigro notata. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 291.
Schaeff. ic. t. 55. *f.* 4 ?
Habitat, *rarior*, Halæ Saxonum.

sericus. 234. C. thorace mutico cylindrico: linea lutea, elytris fuscis, scutello pedibusque luteis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 292.
Habitat, *rarior*, Halæ Saxonum, *in floribus*, *cylindrico affinis.*

vulneratus. 235. C. thorace mutico cylindrico: tuberculo carinato luteo, elytris nigricantibus, pedibus luteis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 293.
Habitat in lapidicinis Giebichenſteinenſibus, *pustulato affinis.*

tripunctatus. 378. C. thorace flavo: punctis tribus nigris, elytris nigris medio longitudinaliter albidis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 17.
Habitat in Noveboraco, *cylindrici facie*, *at minor.*

++ *palpis capitatis*, Rhagia.

curſor. 45. C. thorace ſpinoſo, elytris obtuſis rufis: ſutura lineaque nigris, antennis mediocribus. *Fn. ſuec.* 658. * *Scop. ent. carn.* 167. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 4.
Fn. ſuec. 1. *n.* 481. Cerambyx rufus, coleoptrorum

rum lineis tribus nigris longitudinalibus.
Degeer inſ. 5. *p.* 127. *n.* 3. Leptura curſor.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 7.
Habitat in Europa *boreali.*

cinctus. 236. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris ſubferrugineis: faſcia flava, femoribus poſterioribus unidentatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 5.
Habitat in Auſtria, *magnitudine & ſtatura curſoris.*

noctis. 48. C. niger, thorace ſpinoſo, antennarum baſi ferruginea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 6.
Habitat in Europa *boreali, curſori proxime affinis; an ejus varietas?*

anglicus. 237. C. thorace ſpinoſo, elytris faſciis duabus obliquis flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 7.
Fn. ſuec. 1. *n.* 486. Cerambyx cinereus, coleoptris faſciis duabus flavis, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace ſpinoſo.
Degeer inſ. 5. *p.* 124. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 6. Leptura mordax.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 222. *n.* 1. Stenocorus glaber, &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 8.
Schaeff. elem. t. 118. *f.* 1.
ic. t. 8. *f.* 1. 3.
Habitat in Anglia, Gallia.

ornatus. 238. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris faſcia lata flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 230. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 8.
Habitat in Penſylvania.

exilis. 239. C. thorace ſpinoſo, elytris elevato-ſtriatis cinereis nigroundatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 146. *n.* 9. in-

indagator. 240. C. cinereus, thorace ſpinoſo, elytris ſtriatis: atomis faſciisque duabus nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 3.
Habitat in Germania.

inquiſitor. 49. C. niger, thorace ſpinoſo, elytris nebuloſis teſtaceo ſubfaſciatis. antennis brevioribus. *Fn. ſuec.* 659.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 229. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 2.
Fn. ſuec. 1. *n.* 485.* Cerambyx cinereus nigro-nebuloſus, antennis corpore dimidio brevioribus, thorace ſpinoſo.
Degeer inſ. 5. *p.* 126. *n.* 2. *t.* 4. *f.* 1. Leptura inquiſitor.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 223. *n.* 2. Stenocorus niger, &c.
Friſch inſ. 13. *t.* 14.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 10.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 7.
Habitat in Europæ *truncis arborum, larva hexapus nuda alba, capite collarique corneis fuſcis, dorſo canaliculato.*

mordax. 241. C. griſeus, thorace ſpinoſo, elytris nebuloſis, teſtaceo ſubfaſciatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 1.
Schaeff. ic. t. 8. *f.* 2.
Habitat in Germania, *inquiſitori affinis, at paulo major.*

elegans. 242. C. ater, thorace utrinque uniſpinoſo, elytris caſtaneis: baſi, ſutura maculaque communi nigris; faſciis duabus flavis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 133. *n.* 253.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 7. *p.* 170. *n.* 6. *t.* 45. *f.* 12. Rhagium elegans.
Habitat in Bavaria, & Calabria.

ſy-

fycophanta. 243. C. nigro ferrugineoque varius, thorace ſpinoſo, elytris faſciis tribus obſcurioribus lineisque duabus elevatis, antennis brevibus. *Schranck. inſ. auſtr. p.* 137. *n.*260.
Habitat Vindobonæ.

niger. 365. C. thorace ovato: margine poſteriori ſcutelloque flavo, elytris faſtigiatis, antennis brevibus. *Petagn. inſ. Calab. p.* 17. *n.* 83. *f.* XXXVI.
Habitat in Calabria, *totus niger, an hujus tribus?*

+++ *palpis clavatis*, Callidia.

ruſticus. 67. C. thorace nudo, corpore lurido, antennis ſubulatis brevioribus. *Fn. ſuec.* 666. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 152 *n.* 15. *Fn. ſuec.* 492. Carambyx fuſcus, punctis thoracinis impreſſis.
Degeer inſ. 5. *p.* 83. *n.* 20. Carambyx griſeo-fuſcus, &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 4. *f.* 20.
Schaeff. elem. t. 13. *f.* 1. & *t.* 76. *f.* 1.
icon. t. 63. *f.* 6.
Habitat in Europæ *ſilvis.*

agreſtis. 244. C. niger, thorace nudo, elytris ſtriatis fuſcis, antennis brevibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 16.
Habitat Halæ Saxonum, *ſtatura ruſtici, at duplo minor.*

dichrous. 370. C. niger, thorace rotundato, elytris ſtriatis, tibiis plantisque brunneis. *Muſ. Lesk. p.* 26. *n.* 570.
Habitat in Europa.

lævigatus. 371. C. niger opacus, thorace elytrisque lævibus, antennis mediocribus, femoribus rubris compreſ-

preſſis, tibiis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 26. *n.* 573.
Habitat in Europa.

viridans. 372. C. thorace rotundato viridi: fovea utrinque impreſſa, elytris teſtaceo-viridibus rugoſo-reticulatis, antennis pedibusque fuſco-teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 26. *n.* 574.
Habitat in Europa.

cyanochryſos. 373. C. violaceus pubeſcens, antennis apice fuſcis, femorum piceorum baſi tibiisque luteis. *Muſ. Lesk. p.* 26. *n.* 578.
Habitat in Europa.

octonotatus. 374. C. capite nigro fulvo piloſo furca glabra antrorſum notato, thorace rotundato maculis punctisque quatuor fulvis piloſis, elytris fuſcis biſaſciatis quadripunctatis, abdomine pedibusque fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 26. *n.* 580.
Habitat in Europa.

leucozonias. 375. C. niger, abdominis ſegmentorum trium priorum margine externo & pectore canis, elytris faſciis duabus linearibus deorſum arcuatis albis & apice cinereo. *Muſ. Lesk. p.* 27. *n.* 588.
Habitat in Europa.

luridus. 68. C. thorace ſubtuberculato nudo, niger, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 29.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 634. *n.* 68. Cerambyx thorace mutico ſubrotundo, corpore nigro, elytris luridis.
Habitat in Europæ *borealis pinetis, bajulo ſimillimus, at triplo minor.*

fuſcus. 245. C. niger, thorace ſubtuberculato canalicula-

to nudo, elytris ſtriatis obſcure teſtaceis, antennis mediocribus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 30.
Habitat Halæ Saxonum, *ſtatura & magnitudine luridi.*

lugubris. 246. C. thorace ſubtuberculato nudo, elytris ſubſtriatis, corpore lurido immaculato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 31.
Habitat Halæ Saxonum, *ruſtico proxime affinis, at triplo minor.*

raucus. 247. C. thorace lævi obſcure ferrugineo, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 32.
Habitat in Africa *æquinoctiali, ſtatura luridi.*

hafnienſis. 248. C. thorace ſubvilloſo nigro: lineis quatuor albis, intermediis abbreviatis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 33.
Habitat Hafniæ.

aulicus. 249. C. thorace lævi nitido, corpore nigro opaco, elytris lævibus, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 239. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 34.
Habitat Hafniæ.

erythropus. 250. C. thorace lævi nitido, elytris violaceis, tribus rufis, antennis brevibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 240. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 35.
Habitat in Germania *boreali.*

femoratus. 69. C. thorace nudo, corpore atro opaco, femoribus rubris, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 237. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 9.
Degeer inſ. 5. *p.* 93. *n.* 31.
Schaeff. ic. t. 55. *f.* 7.

Hab-

Habitat in Germania, *statura violacei, at dimidio minor, angustior.*

occidentalis. 251. C. ater, thorace pubescente, elytris fasciis duabus rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 10.
Habitat in America *occidentali, magnitudine & statura violacei; loco fasciæ posterioris macula interdum marginalis.*

acuminatus. 252. C. thorace verrucoso nigricante, elytris acuminatis viridibus: sutura cyanea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 11.
Habitat ad Caput bonæ spei.

rufficus. 253. C. niger, thorace verrucoso, elytris testaceis: macula media apiceque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 12.
Habitat in Russiæ *silvis.*

violaceus. 70. C. thorace subpubescente, corpore violaceo, antennis brevibus. *Fn. suec.* 667. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 8.
Degeer inf. 5. *p.* 88. *n.* 24. Cerambyx violaceus.
Scop. ann. hist. nat. 5. *p.* 97. *n.* 59. Stenocorus violaceus.
Gadd diss. 28. Cantharis nigra, thorace rotundato, elytris cærulescentibus.
Frisch inf. 12. *t.* 3. *ic.* 6. *f.* 1.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 26. *f.* 10.
Habitat in Europa *boreali, frequens.*

auratus. 71. C. thorace dente lateriali depresso, viridi-inauratus, antennis nigris, femoribus posterioribus cæruleis.
Habitat in America, *violaceo similis, pedibus purpureis, an hujus tribus?*

Stigma. 72. C. thorace punctato, corpore atro, elytris læ-

vi-

vibus : ſtigmate albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 17.
Degeer inſ. 5. *p.* 119. *n.* 22. *t.* 14. *f.* 13. Cerambyx niger, &c.
Habitat in America, *totus niger.*

equeſtris. 254. C. ater nitidus, thorace nudo, coleoptris faſcia interrupta nuda. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 18.
Habitat in Cayenna, *ſtatura ſtigmatis, at minor.*

hirtus. 255. C. thorace hirto, elytris acuminatis pallide teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 19.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magnus.*

tranquebaricus. 256. C. thorace ſubtus utrinque macula tomentoſa ferruginea, antennis longioribus barbatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 20.
Habitat Tranquebariæ.

compreſſus. 257. C. obſcure niger, thorace lævi, antennis longis pedibusque teſtaceis : femoribus compreſſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 21.
Habitat in Siam, *barbato minor.*

variegatus. 258. C. thoracis dorſo glabro atro : lineis quatuor albis, elytris flavo irroratis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 22.
Habitat in nova Seelandia.

auſtralis. 259. C. thoracis lineis duabus, elytris quatuor albis ; mediis coeuntibus abbreviatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 23.
Habitat in nova Seelandia.

ſul-

Callidiis *omnibus thorax rotundatus, muticus.*

fulcatus. 260. C. thorace tomentoſo cinereo, elytris albo nigroque ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 24.
Habitat in nova Seelandia.

ſtriatus. 73. C. thorace glabro, corpore nigro, elytris ſtriatis, antennis brevibus. *Fn. ſuec.* 668. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 240. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 36.
Degeer inſ. 5. *p.* 90. *n.* 26. Cerambyx niger nitidus, &c.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 13.
Habitat in Europæ *ſilvis.*

lynceus. 261. C. thorace ſubſpinoſo villoſo niger, elytris macula ſubdidyma fulva. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 240. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 37.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

ſalicis. 262. C. rufus, thorace tuberculato ſpinoſoque, pectore elytrisque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 154. *n.* 38.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. *p.* 92. *n.* 3. *t.* 25. *f.* 13. Stenocorus ruficollis.
Habitat in Lipſiæ *ſalicibus: an hujus tribus?*

puſillus. 263. C. niger, antennis tibiisque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 39.
Habitat in Germania, *parvus.*

bimaculatus. 164. C. fuſcus, thorace villoſo, elytris maculis duabus ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 240. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 40.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *mediæ magnitudinis.*

flavus. 265. C. corpore flavo, femoribus clavatis, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 240. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 155. *n.* 41.

Habitat in insulis, Americæ *meridionali oppositis.*

variabilis. 74. C. thorace glabro, corpore fusco-æneo, antennis pedibusque fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 237. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 13.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 635. *n.* 74. *Fn. suec.* 669. Cerambyx thorace mutico subrotundo inæquali glabro, pectore anoque ferrugineis, antennis ferrugineis.
Pedа mus. *p.* 36. Cerambyx scaber.
Frisch inf. 12. *p.* 345. *t.* 6. *f.* 3. 4.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 12.
Habitat in Europæ *borealis pinetis.*

fericeus. 266. C. thorace holosericeo cinereo, elytris testaceis: punctis elevatis rubris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 152. *n.* 14.
Habitat in Barbaria, *rustico major.*

testaceus. 75. C. thorace subtuberculato, corpore testaceo, antennis mediocribus fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 239. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 26.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 635. *n.* 75. *Fn. suec.* 670. Cerambyx thorace subrotundo mutico glabro, corpore testaceo antennis mediocribus.
Degeer inf. 5. *p.* 93. *n.* 30. Cerambyx testaceus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 218. *n.* 18. Leptura testacea, thorace glabro.
Schaeff. ic. t. 64. *f.* 6.
Habitat in Europæ *silvis.*

deustus. 267. C. testaceus, thorace subtuberculato, elytris apice violaceis. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 500. *mant. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 27.
Habitat in Italia, *testacco proxime affinis, an varietas?*

li-

An hujus tribus Cerambyx flavo-fasciatus Schaefferi ic. t. 34. *f.* 12?

ligneus. 268. C. niger, thorace tuberculato villoso, elytris rubris: macula apiceque violaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 153. *n.* 28.
Habitat - - - *mediæ magnitudinis.*

portitor. 269. C. niger, thorace transversim oblongo: maculis duabus nitentibus, elytris ex nigro rubescentibus, antennis longis. *Schranck Schr. der berl. Ges. nat. Fr.* 2. *p.* 312.
Frisch inf. 13. *t.* 2. *f.* 17.
Habitat in Bavariæ *pinetis*, *bajulo affinis*, *punctis excavatis inæqualis*, *mordux.*

obscurus. 270. C. thorace subvilloso fusco elytris testaceo cinereoque variis; antennis mediocribus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 151. *n.* 1.
Habitat in terra van Diemen, *bajulo major.*

Bajulus. 76. C. thorace villoso, tuberculis duobus, corpore fusco. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 151. *n.* 2.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 636. *n.* 76. *Fn. suec.* 672. *Mus. Lud. Ulr.* 76. Cerambyx thorace mutico subrotundo villoso, tuberculis duobus, antennis brevibus.
Degeer inf. 5. *p.* 86. *n.* 82. Cerambyx caudatus.
Scop. ent. carn. n. 156. Leptura Bajula.
Fn. suec. 1. *n.* 489. Cerambyx nigricans; thorace villoso cinereo, punctis duobus glabris.
Frisch. inf. 13. *t.* 10.
Sulz. hist. inf. t. 4. *f.* 29.
Schaeff. el. t. 76. *f.* 4.
icon. t. 64. *f.* 4. 5.
β) *Fn. suec.* 1. *n.* 490. Cerambyx testaceus, thorace villoso cinereo, lineolis duabus glabris.
γ) Cerambyx saxonicus duplo minor. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 151.

Habitat in Europæ *borealis arborum truncis, ligna parietes, asseres e pino desumta perforans.*

fennicus. 77. C. thorace tuberculato rufo, elytris violaceis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 151. *n.* 3.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 636. *n.* 77. *Fn. suec.* 674. Cerambyx thorace mutico subrotundo: tuberculis subferrugineo-obsoletis, elytris violaceis, antennis longiusculis.
Udàm. diss. 33. Cerambyx elytris nigro-cæruleis, apice abdominis ferrugineo.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 219. *n.* 19. Leptura atra.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 12.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 26. *f.* 8.
Habitat in Europæ *pinetis.*

italicus. 271. C. thorace subcylindrico hirto rufo, elytris violaceis, antennis mediocribus piceis, pedibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 236. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 151. *n.* 4.
Habitat in Italia, *fennico minor.*

liciatus. 78. C. niger cinereo-nebulosus, antennis brevibus.
Habitat in Europa, *bajuli magnitudine.*
Elytra *strigis duabus undulatis cinerascentibus obsoletis.*

undatus. 79. C. thorace tuberculato, elytris nigris: fasciis duabus undatis albis, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 240. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 42.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 636. *n.* 79. *Fn. suec.* 675. Cerambyx thorace mutico subrotundo tuberculato, elytris fasciis duabus undulatis, antennis submediocribus.
Degeer inf. 5. *p.* 91. *n.* 28. Cerambyx nigro-fuscus. *Schaeff.*

Schaeff. ic. t. 68. *f.* 1.
Habitat in Europa *boreali.*

colonus. 272. C. elytris lividis: fasciis tribus fuscis, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 241. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 43.
Habitat in Carolina.

versicolor. 273. C. thorace rufo, elytris nigris basi rufis: fasciis duabus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 241. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 44.
Habitat in America *boreali.*

flexuosus. 274. C. thorace flavo-fasciato, elytris fasciis septem flavis: anterioribus antrorsum, posterioribus retrorsum arcuatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 241. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 45.
Drury inf. 1. *t.* 41. *f.* 2. Cerambyx pictus.
Forst. nov. inf. cent. 1. *p.* 43. *n.* 43. Leptura Robiniæ.
Pet. gaz. t. 27. *f.* 3?
β) Callidium (angulatum) thorace globoso nigro flavo fasciato, elytris nigris: fasciis sex flavis, secunda tertiaque angulatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 241. *n.* 32.
Habitat in Americæ *robinia.*

exiguus. 275. C. testaceus, elytris fascia abbreviata alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 241. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 46.
Habitat in nova Seelandia, *femoribus valde clavatis basi albis.*

lunatus. 276. C. thorace globoso nigro flavo-fasciato, elytris atris: fasciis quinque flavis: baseos maculari. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 500. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 47.
Habitat in insulis Americæ *oppositis, major.*

flo-

floralis. 277. C. thorace globoso albo-fasciato, elytris nigris: fasciis quinque albis; secunda tertiaque lunatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 241. *n.* 33. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 48. *Pall. it.* II. *p.* 724. *n.* 63. *Habitat in* Italia, *statura exigui.*

fulminans. 278. C. thorace globoso maculato, elytris nigris: fasciis undato-angulatis albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 241. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 49. *Habitat* - - -

arcuatus. 279. C. elytris fasciis quatuor flavis: prima interrupta; reliquis retrorsum arcuatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 241. *n.* 35. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 50. *Uddm. diff.* 20. *Leche nov. sp.* 30. Cerambyx niger, elytris fasciis quatuor flavis arcuatis. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 640. *n.* 21. *Fn. suec.* 696. Leptura (arcuata) thorace, globoso nigro, elytris fasciis linearibus flavis, tribus retrorsum arcuatis, pedibus ferrugineis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 212. *n.* 10. *Frisch. inf.* 12. *t.* 3. *ic.* 4. *f.* 1. *Raj. inf. p.* 83. *n.* 23. *Pet. gazoph. t.* 63. *f.* 7. *Scharff. ic. t.* 38. *f.* 6. & *t.* 107. *f.* 2. 3. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *t.* 26. *f.* 14. *Habitat in* Europæ *hortis.*

arietis. 280. C. thorace nigro, elytris nigris: fasciis flavis, secunda antrorsum arcuata, pedibus ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 242. *n.* 36. *mant. inf.* 1. *p.* 155. *n.* 51.
Degeer inf. 5. *p.* 81. *n.* 18. Cerambyx quadrifasciatus.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 640. *n.* 23. *Fn. suec.* 795. Leptura arietis.
Fn. suec. 1. *n.* 507. Leptura nigra, elytrorum lineis transversis flavis, pedibus testaceis.

Geoffr.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 214. *n.* 11. Leptura nigra, &c.
Scop. ann. hift. nat. 5. *p.* 96. *n.* 57. Stenocorus arietis.
Raj. inf. p. 82. *n.* 22.
Lift. fcar. p. 385. *n.* 14.
Pet. gazoph. t. 63. *f.* 6.
Frifch inf. 12. *p.* 32. *t.* 3. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 38. *f.* 7.
Herbft apud Fuesslí arch. inf. 5. *t.* 26. *f.* 15.
β) *Bergftr. nomencl.* 1. 9. 12. *t.* 1. *f.* 12.
Habitat in Europæ *hortis.*

plebeius. 281. C. thorace globofo immaculato, elytris nigris: fafciis linearibus albis. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 243. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 52. *Syft. nat.* XII. 2. *p.* 639. *n.* 17. *Fn. fuec.* 692. Leptura (ruftica) thorace globofo tomentofo, elytris cinereis: fafciis linearibus albidis undatis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 215. *n.* 12. Leptura nigra, &c.
Raj. inf. p. 83. *n.* 25.
Petiv. gazoph. t. 63. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 7.
Habitat in Europæ *hortis.*

maculofus. 282. C. thorace maculato, elytris mucronatis nigris: ftrigis tribus arcuatis flavis, bafi ferrugineis. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 243. *n.* 38. *mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 53.
Habitat in America.

americanus. 283. C. thorace fubfpinofo, elytris bidentatis fufcis: ftrigis quatuor flavis, femoribus clavatis compreffis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 54. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 243. *n.* 39. Callidium acuminatum.
Habitat in America *boreali.*

detritus. 284. C. thorace flavo-fafciato, elytris nigris: fafciis

fciis quinque flavis, pedibus ferruginei. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 243. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 150. *n.* 55.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 640. *n.* 20. *Fn. ſuec.* Leptura (detrita) thorace globoſo nigricante, elytris fuſcis: faſciis quatuor tranſverſis flavis, pedibus rufis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 216. Leptura nigra, &c.
Schaeff. elem. t. 76. *f.* 2.
icon. t. 38. *f.* 9. & *t.* 64. *f.* 3.
Habitat in Europæ *hortis.*

indus. 285. C. niger, elytris glaucis baſi nigro-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 243. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 56.
Habitat in India, *mediæ magnitudinis, pube glauceſcente nitidus.*

portugallus. 286. C. thorace globoſo ferrugineo, elytris nigris: faſciis tribus atris; primo annulari. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 244. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 57.
Habitat in Luſitania, *ſtatura c. verbaſci.*

verbaſci. 287. C. thorace nigro-maculato, elytris ſubvirefcentibus: faſciis tribus nigris; prima lunari. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 244. *n.* 43. *mant. inſ.* 1. *p.* 156. *n.* 58.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 640. *n.* 22. Leptura (verbaſci), thorace ſubovato nigro, elytris faſciis tribus nigris, prima ſemi-annulata.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 12.
Herbſt apud Fuesſli arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 19.
Habitat in Europæ *magis auſtralis verbaſco.*

annularis. 288. C. thorace nigro-maculato, elytris bidentatis ſubvirefcentibus: faſciis tribus nigris, prima annulari. *Fabr. mant. inſ.* 1. *n.* 156. *n.* 59.
Habitat in Siam, *c. verbaſci proxime affinis.*

aegy-

ægyptiacus. 289. C. thorace ferrugineo, elytris cinerascentibus: fasciis tribus fuscis; prima annulari. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 244. *n.* 44. *mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 60.
Habitat in Oriente.

mystícus. 290. C. elytris fuscis: fasciis apiceque cinereis basi rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 244. *n.* 45. *mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 61.
Degeer inf. 5. *p.* 82. *n.* 19. Cerambyx albo fasciatus.
Scop. ent. carn. 177. Cerambyx quadricolor.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 639. *n.* 18. *Fn. suec.* 693. * Leptura (mystica) thorace globoso tomentoso, elytris fusco-cinereis antice rufis: fasciis linearibus arcuatis lataque canis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 215. *n.* 17. Leptura nigra, &c.
Raj. inf. p. 83. *n.* 26.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 9.
Habitat in Europa.

gibbosus. 291. C. niger, elytris cinereo fasciatis basi bituberculatis apice acuminatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 156. *n.* 62.
Habitat Kilonii, *statura & magnitudine mystici.*

picipes. 292. C. ater, thorace globoso, elytris striga obliqua alba. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 157. *n.* 63.
Habitat - - - *c. alni paulo major.*

alni. 293. C. niger, elytris fasciis duabus albis, elytrorum basi antennis tibiisque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 245. *mant. inf.* 1. *p.* 157. *n.* 64.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 639. *n.* 19. Leptura alni.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 26. *f.* 21.
Habitat in Europa, *mystico affinis, sed octies minor.*

sanguineus. 80. C. thorace subtuberculato elytrisque sanguineis,

neis, corpore nigro, antennis mediocribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 238. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 153. *n.* 25.
Raj. inſ. p. 97. *n.* 3. Cerambyx minor.
Degeer inſ. 5. *p.* 92. *n.* 29.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 220. *n.* 22.
Schaeff. ic. t. 64. *f.* 1.
Habitat in Europæ *ſilvis*, Upſaliæ *in parietibus.*

caſtaneus. 81. C. niger, elytris antennis pedibusque ferrugineis, antennis brevioribus. *Fn. ſuec.* 676.
Habitat in Europæ *cortice abiegno.*
Thoracis *latera inferiora linea rubra longitudinali.*

ebulinus. 83. C. niger, thorace tuberculato, elytris violaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 5.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 637. *n.* 83. Cerambyx thorace mutico, corpore nigro, elytris viridi-cæruleis, antennis mediocribus.
Habitat in Africæ *plantis*, *ſtatura italici.*

æneus. 294. C. fuſcus, thorace elytrisque viridi-æneis, femoribus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 151. *n.* 6.
Habitat in Africa, *ſtatura italici.*

clavipes. 295. C. niger opacus, femoribus omnibus clavatis, antennis longioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 236. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 152. *n.* 7.
Herbſt apud Fuesslı arch. inſ. 5. *t.* 26. *f.* 9.
Habitat in Germania.

pannonicus. 296. C. niger, thorace margine ſubæneo, medio elevato, elytris viridi-cæruleis, femoribus clavatis. *Herbſt apud Fuesslı arch. inſ.* 5. *p.* 96. *n.* 6. *t.* 26. *f.* 11.
Habitat in Ungaria, 8 *lineas longus.*

æneus.

æneus. 297. C. viridi-æneus, subtus, antennis pedibusque fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 96. *n.* 7. *t.* 26. *f.* 12.
Habitat Berolini.

venustus. 298. C. thorace flavo: fascia nigra, elytris nigris: fasciis tribus latis ex viridi flavis, antennis pedibusque nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 98. *n.* 16. *t.* 26. *f.* 16.
Habitat in India.

indicus. 299. C. niger subtus flavus, frontis maculis, thoracis fasciis duabus, elytrorum quinque flavis, antennis pedibusque rubris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 98. *n.* 17.
Habitat in India.

confusus. 300. C. niger pubescens, thoracis punctis obsoletis sex, elytrorum fasciis undatis albidis quatuor, antennis fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 98. *n.* 18. *t.* 26. *f.* 18.
Habitat Berolini *in* salicibus.

litteratus. 301. C. elytris nigris: fasciis apiceque cinereis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 99. *n.* 22. *t.* 26. *f.* 20.
Schranck inf. austr. n. 306? Leptura figurata.
Habitat in Germania.

hispidus. 302. C. thorace globoso ferrugineo, corpore testaceo, capite nigro, femoribus clavatis ustulatis, antennis hispidis mediocribus. *Forster nov. inf.* 1. *p.* 42. *n.* 24.
Habitat in America *septentrionali, mystici magnitudine.*

viridis. 303. C. thorace tuberculato violaceo, elytris viridibus punctato-striatis, antennis nigris. *Mull. zool.*

zool. dan. prodr. p. 95. *n.* 1067. *Fn. Fridrichsd. p.* 14. *n.* 134.
Habitat in Dania.

multicolor. 304. C. thorace nigro ovato villo ex griseo flavo pubescente, elytris ex griseo flavoque variis.
Drury inf. 1. *t.* 41. *f.* 6.
Habitat in Noveboraco.

pulverulentus. 306. C. thorace convexo nigro-fusco, elytris castaneis griseo-villosis apice bidentatis. *Degeer inf.* 5. *p.* 118. *n.* 21. *t.* 14. *f.* 12.
Habitat in Pensylvania, *pollicem fere longus.*

nigricans. 307. C. niger depressus, femoribus clavatis, antennis mediocribus crassis. *Degeer inf.* 5. *p.* 88. *n.* 23.
Hufn. inf. t. 16.
Habitat in conclavibus Sueciæ, 7 *lineas longus.*

aurichalceus. 308. C. fusco-æneus nitidus, thorace depresso, antennis pedibusque nigris. *Degeer inf.* 5. *p.* 89. *n.* 25.
Habitat - - - *dimidium pollicem longus.*

lucidus. 309. C. niger, elytris fusco-castaneis lucidis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 98.
Habitat in Carniola.

rufus. 310. C. niger thorace villoso, antennis rufis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 98. *n.* 61.
Habitat in Carniola.

carniolicus. 311. C. thorace subbituberculato, abdominisque apice rufis, elytris atro-violaceis.
Scop. ann. hist. nat. 5. *p.* 98. *n.* 63. Stenocorus ferinicus.
Habitat in Carniola.

fu-

fuligi-nosus. 312. C. totus ater opacus, antennis mediocribus. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 98. *n.* 62.
Habitat in Carniola.

calcara-tus. 313. C. nigro-violaceus, femoribus rufis posterius dentatis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 98. *n.* 64.
Habitat in Carniola.

cara-boides. 314. C. rufus, elytris atro-violaceis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 99. *n.* 65.
Habitat in Ungariæ & Carniolæ *collibus*, *statura carabi minoris.*

ater. 315. C. niger, elytris truncatis, antennis mediocribus. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 100. *n.* 69.
Habitat in Carniola.

bracca-tus. 316. C. niger, antennis pedibusque rufis: femoribus posterioribus crassis spina armatis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 100. *n.* 70.
Habitat in Carniola.

tenuis. 317. C. niger nitens, elytris attenuatis, antennis mediocribus. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 100. *n.* 71.
Habitat in Carniolæ *floribus umbellatarum.*

octo-punctatus. 318. C. viridis, thorace tereti, elytris punctis octo nigris. *Schranck inf. austr. p.* 142. *n.* 267. *Beytr. z. Naturg. p.* 65. §. 9.
Scop. ann. hist. nat. 5. *p.* 101. *n.* 73. Leptura octopunctata.
Habitat rarior in Austriæ *tiliis.*

glauco-pterus. 319. C. ferrugineus, thorace quadriverrucoso, oculis pectoreque nigris. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 294. *t.* 1. *f.* 4.
Habitat rarior Halæ Saxonum, *variabili affinis, at dimidio major.*

vi-

virescens. 320. C. corpore lineari viridi-æneo, antennis longis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges. 1. p. 295.*
Habitat - - - - *magnitudine circiter variabilis, statura moschati.*

** *palpis inæqualibus, anterioribus 2 filiformibus, posterioribus clavatis*: Stenocori Fabricii.

festivus. 11. C. thorace utrinque bidentato, elytris bidentatis viridibus: linea laterali lutea. *Fabr. sp. ins. 1. p. 226. n. 5. mant. ins. 1. p. 143. n. 5.*
Degeer ins. 5. p. 100. n. 4. t. 13. f. 14. Cerambyx spinosus.
Sulz. hist. ins. t. 5. f. 6. Cerambyx sulcatus.
Gron. zooph. 541. t. 16. f. 5.
Drury ins. 1. t. 37. f. 5.
Herbst. apud Fuessli arch. ins. 5. t. 25. f. 12.
Habitat in insulis Americæ *oppositis.*

marilandicus. 321. C. thorace depresso tuberculato mutico, elytris bidentatis fusco cinereoque nebulosis, antennis mediocribus. *Fabr. sp. ins. 1. p. 226. n. 6. mant. ins. 1. p. 143. n. 6.*
Habitat in Marilandia.

insularis. 321. C. thorace inermi tuberculato, elytris bidentatis, antenarum articulis bispinosis. *Fabr. sp. ins. 1. p. 227. n. 8. mant. ins. 1. p. 143. n. 7.*
Habitat in insulis Americæ *meridionali oppositis, ex testaceo & cinereo varius.*

bispinosus. 322. C. thorace inermi subtuberculato, elytris bidentatis, antennarum articulis bispinosis, corpore testaceo. *Fabr. mant. ins. 1. p. 143. n. 8.*
Habitat in America *meridionali, statura insularis, at minor.*

se-

semi-punctatus. 323. C. thorace spinoso inæquali, elytris bidentatis basi punctatis apice glabris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 227. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 9.
Habitat in nova Hollandia.

quadri-maculatus. 27. C. rufescens thorace scabro spinoso, elytris bidentatis: maculis duorum parium glabris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 227. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 12. *Gron. zooph.* 542. * *Sloan. jam.* 2. *t.* 237. *f.* 21.
Drury inf. 1. *t.* 37. *f.* 3.
Habitat in America *meridionali*, *femoribus* 4 *posterioribus apice spinosis.*

gemi-natus. 324. C. thorace mutico nigro: macula utrinque rufa, elytris nigris: maculis duorum parium glabris, antennis longissimis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 13.
Habitat in Sierra Leon Africæ, *congeneribus hujus tribus minor & brevior.*

africa-nus. 325. C. thorace mutico atro, elytris bidentatis basi testaceis apice atris: fascia pallida. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 227. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 14.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *antennis longitudine corporis*, *nigris.*

circumflexus. 326. C. ferrugineus, thorace mutico, elytris unidentatis testaceis: striga undata punctisque duobus fuscis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 15.
Habitat in Cayenna, *mediæ magnitudinis.*

annulatus. 327. C. thorace lineato, elytris unidentatis, antennis longioribus: annulis tribus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 16.
Habitat - - - -

de-

decem-maculatus. 328. C. thorace subspinoso quadrimaculato, elytris bidentatis ferrugineis flavo cinereoque maculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 17.
Habitat in America.

brasilianus. 329. C. thorace spinoso ferrugineo, elytris acuminatus testaceis: lineolis tribus glabris flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 18.
Habitat in Brasilia, *annulato minor.*

cayennensis. 330. C. thorace subspinoso, elytris bidentatis cinereo, fusco flavoque variis: angulo baseos compresso. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 144. *n.* 19.
Habitat in Cayenna, *parvus cinereus.*

Druryi. 331. C. thorace subspinoso, elytris truncatis bidentatis ferrugineis cinereo fasciatis, antennis brevibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 145. *n.* 20.
Habitat in America *meridionali.*

undulatus. 332. C. cinereus, thorace spinoso, elytris bidentatis: fasciis duabus undatis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 145. *n.* 21.
Habitat - - - -

rurícola. 333. C. fuscus, thorace spinoso ferrugineo, elytris bidentatis pallidioribus, antennis longis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 228. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 145. *n.* 22.
Habitat in India, *mediæ magnitudinis.*

garganicus. 334. C. thorace spinoso, elytris bidentatis testaceis: macula pallida, antennis longis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 226. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 4.
Habitat in Marilandia.

La-

Lamed. 46. C. thorace ſpinoſo pubeſcente, elytris faſtigiatis lividis: tænia obſcura longitudinali ſinuata, antennis brevibus. *Fn. ſuec.* 649. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 3. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 226. *n.* 6. Stenocorus niger, &c.
Habitat in Europa.

cyaneus. 335. C. cyaneus, thorace ſpinoſo, elytris baſi flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 226. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 2.
Forſter nov. inſ. 1. *p.* 40. *n.* 40. Cerambyx palliatus.
Fabr. ſyſt. entom. p. 182. *n.* 2. Calopus blandus.

meridianus. 47. C. thorace ſubſpinoſo, elytris faſtigiatis fuſcis anterius teſtaceis, pectore nitente. *Fn. ſuec.* 648. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 225. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 143. *n.* 1.
Syſt. nat. X. 1. *p.* 398. *n.* 7. Leptura meridiana.
Degeer inſ. 5. *p.* 305. Leptura fuſca cinerea.
Schaeff. ic. t. 3. *f.* 13. *t.* 79. *f.* 7. *t.* 82. *f.* 4. *t.* 279. *f.* 3.
Raj. inſ. p. 96. *n.* 1.
Habitat in Europa *boreali*, *etiam in* Calabria, *mas teſtaceus*, *femina nigricans*, *larva ſubterranea*, *pedibus longiſſimis.*

quadrioculatus. 336. C. thorace ſubſpinoſo: punctis ſeptem nigris, corpore teſtaceo, elytris apice dentatis: lineis longitudinalibus curvatis fuſcis, antennis longis.
Schall. Abh. der. hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 289. *t.* 1. *f.* 2.
Habitat - - - *magnitudine meridiani; an hujus tribus?*

ramphygeus. 61. C. thorace mutico ſubcylindrico bipunctato, corpore livido, elytris maculis duabus flavis apice bidentatis.

Habitat in America, *festivi magnitudine*; *an hujus tribus?*

zonarius. 63. C. thorace mutico cylindrico rugoso, antennis longioribus, elytris obtusis fuscis: fascia linearis albida. *Mus. Lud. Ulr.* 75. *
Marcgr. bras. 254. Quici.
Habitat in America, *an ad hanc tribum?*

irroratus. 62. C. thorace mutico cylindrico inæquali, elytris apice bidentatis albo irroratis; antennis longioribus aculeatis.
Drury inf. 1. *t.* 33. *f.* 3.
Habitat in Americæ *meridionali oppositis insulis, insulis, inquisitoris magnitudine.*

glabratus. 337. C. thorace mutico cinereo: linea glabra fusca, elytris bidentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 227. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 143. *n.* 11.
Habitat in insula S. Crucis, Oceani americani.

suaveolens. 305. C. thorace spinoso cærulescenti aureo, corpore viridi, elytris cyaneis, antennis mediocribus pedibusque nigris, abdomine tibiisque ferrugineis, posterioribus longioribus compressis. *Mant. p.* 532.
Habitat in Jamaica & Carolina.

scabricornis. 338. C. ferrugineus thorace subcylindrico, antennis nitidis, intus denticuliatis scabris. *Fuessli Verz. schw. inf. p.* 13. *n.* 241. *f.* 3. a. b.
Scop. ent. carn. n. 174.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 210. *n.* 6.
Habitat in Europa.

asper. 339. C. ater, asper, rigidus, thorace bispinoso, elytris in medio tuberculatis. *Sulz. hist. inf. p.* 44. *t.* 5. *f.* 3.
Habitat in Italia.

bre-

brevis. 340. C. nigricans, thorace ſpinoſo, femoribus rotundatis brevibus, tarſis anterioribus lobatis perhirſutis. *Sulz. hiſt. inſ. p.* 45. *t.* 5. *f.* 5.
Habitat in Surinamo.

halodendri. 341. C. ater, punctis excavatis, thorace albido villoſo, elytris margine maculaque baſeos rubris. *Pallas it.* II. *app. n.* 62.
Habitat in Sibiriæ robinia halodendro, *c. Kaehleri affinis, an hujus tribus?*

badius. 342. C. badius, thorace elytrisque ſtriatis. *Lepech. it.* I. *t.* 16. *f.* 3.
Habitat in Sibiria, *an ex hac tribu?*

ruber. 343. C. elytris rubris: apicum macula oblonga nigra, thorace nigro: maculis duabus rubris. *Lepech. it.* I. *t.* 16. *f.* 3.
Habita in Sibiriæ *glycyrrhiza echinata.*

fimbriatus. 344. C. ater, margine albo, thorace biſpinoſo. *Lepech. it.* II. *p.* 198. *t.* 10. *f.* 8.
Habitat in montis Ural *larice; an huc ſpectat?*

tæniatus. 345. C. thorace ſpinoſo, elytris nigricantibus: faſciis duabus albidis, antennis corpore duplo longioribus. *Lepech. it.* II. *p.* 299. *t.* 11. *f.* 32.
Habitat in Sibiriæ *petrarum fiſſuris.*

aculeatus. 346. C. nigricans antennis longiſſimis: ſpinis tribus introrſum armatis. *Kozier journ. de phyſ.* 1. *p.* 26. *t.* 1. *f.* C.
Habitat in America.

arenarius. 347. C. niger apterus, capitis thoracisque linea media longitudinali, elytrorum margine albo, antennis brevibus. *Scop. ent. carn. n.* 168.
Poda muſ. græc. p. 34. Cerambyx pedeſtris.
Habitat in Carniola.

timidus. 348. C. niger, elytris flavescentibus: maculis binis atris. *Scop. ent. carn. n.* 171. *ann. hist. nat.* 5. *p.* 99. *n.* 67.
Habitat in Carniola, *e longinquo hostem fugiens, & sub umbella se recipiens.*

adspersus. 349. C. elytris nigro maculatis punctatisque, antennis brevibus. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 95. *n.* 55.
Habitat in Carniola, *tristi affinis, sed minor.*

ovalis. 350. C. ovatus fuscus, elytris integris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 206. *n.* 10.
Habitat in Gallia.

cruentatus. 351. C. griseus, thorace spinoso, elytris basi unidentatis: maculis sex ferrugineis, antennis longis aculeatis. *Degeer. inf.* 5. *p.* 107. *n.* 8.
Habitat in India, *rubo affinis, an hujus tribus?*

sinensis. 352. C. niger, thorace spinoso, elytris ad latera albo-maculatis, antennis longis cinereo-maculatis. *Degeer inf.* 5. *p.* 109. *n.* 10.
Habitat in Sina, *tres lineas ultra pollicem longus.*

tigrinus. 353. C. ex fusco griseus, thorace spinoso, elytris maculis punctisque fuscis sparsis, antennis longioribus. *Degeer inf.* 5. *p.* 114. *n.* 15. *t.* 14. *f.* 6.
Habitat in Pensylvania, 11. *lineas longus.*

pensylvanicus. 354. C. thorace subspinoso, elytris truncatis flavo griseis: fasciis undulatis punctatis fuscis, antennis longioribus maculatis. *Degeer inf.* 5. *p.* 114. *n.* 16. *t.* 14. *f.* 7.
Habitat in Pensylvania, *dimidium pollicem longus.*

hirsutus. 355. C. fuscus, thorace spinoso, elytris hirsutis striato-punctatis, antennis mediocribus maculatis. *Degeer inf.* 5. *p.* 115. *n.* 17. *t.* 14. *f.* 8.

Ha-

Habitat in Surinamo, 4 *lineas longus.*

gibbus. 356. C. fuscus cinereo-maculatus, thorace rugoso subspinoso, elytris gibbis punctis nigris hispidis, antennis mediocribus. *Degeer inf.* 5. *p.* 116. *n.* 18. *t.* 14. *f.* 9.
Habitat in Surinamo, *hirsuto brevior, at latior & crassior.*

hirtipes. 357. C. fuscus, thorace mutico cylindrico, elytris apice truncatis bidentatis, plantis anterioribus hirsutis, antennis longioribus: media macula alba. *Degeer inf* 5. *n.* 116. *n.* 19. *t.* 14. *f.* 10.
Habitat in India, $8\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

virideſcens. 358. C. ex flavo viridis, thorace mutico cylindrico: taſciis tribus longitudinalibus flavis, antennis longioribus nigro cinereoque maculatis. *Degeer inf.* 5. *p.* 76. *n.* 13.
Habitat in Europa, *mediæ magnitudinis.*

hieroglyphicus. 359. C. ſubtus canus, capite thoraceque lanuginoſis: area nigra elytris nigris glabris: ſutura utrinque ramoſa punctisque quinque ex cæruleſcente albidis. *Pall. it.* II. *app. n.* 59.
Habitat in Sibiriæ *borealis ſilvis.*

perforatus. 360. C. ſupra pulvere albidus, ſubtus lanugine flaveſcens, elytris punctis quinque dorſalibus mediis nigerrimis. *Pall. it.* II. *app. n.* 60.
Habitat cum hieroglyphico, cui proxime affinis.
Elytrorum *puncta quaſi perforata.*

ferrugiNoſus. 361. C. nigricans, elytris ferrugineis, antennis introrſum ſpinoſis. *Rozier journ. de phyſ. p.* 27. *t.* 1. *f.* D.
Habitat in America.

car-

carbonarius. 362. C. niger opacus, antennis brevibus. *Scop. ent. carn. p.* 55. *n.* 178.
Habitat in Carniola, *an propria ſpecies ?*

lunulatus. 363. C. ex fuſco obſcure rufeſcens, thorace ſubcylindrico mutico, elytris rubeſcentibus: lunulis quatuor fuſcis apice dentatis. *Drury inſ.* 1. *t.* 37. *f.* 4.
Habitat in Jamaica.
Elytrorum *ſutura prope thoracem cor fuſcum refert.*

minimus. 364. C. minutiſſimus. *Sceligm. av.* 4. *t.* 108. *f.* 4.
Habitat - - - - *cutem penetrans.*

vittatus. 378. C. thorace ſpinoſo pubeſcente, elytris ſubfaſtigiatis teſtaceis, ſutura vittaque fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 25. *n.* 540.
Habitat in Europa.

quadriguttatus. 379. C. pallide teſtaceus, thorace ſubſpinoſo, elytris biſpinoſis: maculis duabus flavis, femoribus clavatis muticis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. *n.* 3. 3. 16. *t.* 8. *f.* 7.
Habitat in Honduras Americæ, *quadrimaculato duplo minor, ſubdepreſſus.*

CALOPUS. *Antennæ* filiformes.
Palpi quatuor; anteriores clavati; poſteriores filiformes.
Thorax gibbus.
Elytra linearia.

ferraticornis. 1. C. fuſcus, antennis compreſſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 228. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 145. *n.* 1. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 634. *n.* 65. *Fn. ſuec.* 665. Ce-

Species 338-364 *incerti adhuc loci.*

Cerambyx ferraticornis, thorace mutico subovali, corpore lurido fusco, antennis compressis antice ferratis mediocribus.

Degeer inf. 5. *p.* 79. *n.* 6.

Habitat in Europa *boreali, statura oleri, elongatus, cylindricus.*

hispicornis. 2. C. subfuscus, antennarum articulis posterius spina minutissima armatis.

Syst. nat. XII. 2. *p.* 634. *n.* 66. Cerambyx thorace mutico subrotundo, corpore subfusco, elytris fastigiatis bidentatis, antennis mediocribus postice dentatis.

Habitat in America, *cerambyci rustico similis, at duplo major; an hujus generis?*

pygmæus. 3. C. munutissimus fuscus, antennis ferratis pilosis.

Degeer inf. 5. *p.* 80. *n.* 17. *t.* 4. *f.* 5. Cerambyx pygmæus.

Habitat in Suecia, *pulicis magnitudine.*

205. LEPTURA. *Antennæ* setaceæ.
Palpi quatuor filiformes.
Elytra apicem versus attenuata.
Thorax teretiusculus.

* *labio integro*, Donaciæ Fabricii.

aquatica. 1. L. aurata, femoribus posterioribus clavatis dentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 245. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 157. *n.* 1.

Syst. nat. XII. 2. *p.* 637. *n.* 1. *Fn. suec.* 677. * *Scop. ent. carn.* 147. Leptura deaurata, antennis nigris, femoribus posticis dentatis.

Degeer inf. 5. *p.* 140. *n.* 80. *t.* 4. *f.* 14. 15. Leptura aquatica spinosa.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 229. *n.* 12.

Raj.

Raj. inf. p. 100. *n.* 1.
Frisch inf. 12. *p.* 33. *t.* 6. *f.* 2.
Habitat in plantis aquaticis, nymphæis, caricibus, phellandrio, *cujus radici intra globum brunneum adhæret pupa.*
Femora *posteriora rarius mutica.*

simplex. 17. L. aurata, femoribus simplicibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 245. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 157. *n.* 2.
Degeer inf. 5. *p.* 142. *n.* 19? Leptura aquatica mutica.
Habitat in Anglia & Germania.

fasciata. 18. L. deaurata, elytris fascia longitudinali purpurea. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 100 *n.* 3.
Degeer inf. 5. *p.* 143. *n.* 20. Leptura aquatica fasciata.
Habitat in Europæ *aquis*, *femoribus posterioribus nunc muticis, nunc dentatis.*

holosericea. 19. L. viridi-nitens, antennis pedibusque ex atro fuscis, femoribus posterioribus dentatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 100. *n.* 4.
Habitat in Marchiæ *pratis humidis.*

paluſtris. 20. L. ex nigricante violacea, antennis pedibusque spadiceis, femoribus posterioribus dentatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 100. *n.* 5.
Habitat in Pomeraniæ *paludibus.*

cinerea. 21. L. cinerea cupreo irrorata, pedibus posterioribus muticis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 100. *n.* 6.
Habitat in Pomerania.

violacea. 58. L. ex atro subænea, elytris obscure violaceis, abdomine sanguineo. *Pall. it.* II. *n.* 64.
Habitat in Sibiria, *magnitudine aquaticæ.*

bi-

bicolor. 84. L. aurea, thorace supra elytrisque viridibus, his striato-punctatis hinc inde impressis, femoribus clavatis: posterioribus dentatis. *Mus. Lesk. p.* 27. *n.* 589.
Habitat in Europa.

crassipes. 85. L. viridi-ænea, subtus cinereo-ænea, elytris striato-punctatis transverse lineolis subtriatis, ore, antennis pedibusque rufis, femoribus crassis: posterioribus muticis. *Mus. Lesk. p.* 27. *n.* 590.
Habitat in Europa.

fusca. 86. L. fusca, elytris punctato-striatis, ore, antennis pedibusque rufis, femoribus posterioribus dente valido armatis. *Mus. Lesk. p.* 27. *n.* 191.
Habitat in Europa.

ænea. 87. L. rufo-ænea, subtus cinereo-ænea, elytris punctato-striatis: rugis crenatis, femoribus posterioribus dentatis. *Mus. Lesk. p.* 27. *n.* 592.
Habitat in Europa.

nitida. 88. L. nitida viridi-aurea, elytris punctato-striatis: rugis crenatis vittaque lata purpureo-ænea, abdomine antennis pedibusque auratis, femoribus posterioribus dentatis. *Mus. Lesk. p.* 27. *n.* 593.
Habitat in Europa.

vulgaris. 89. L. viridi-argentea, elytris punctato-striatis: rugis crenatis vittaque lata communi viridi-purpurea, capite, abdomine pedibusque cinereo-argenteis, femoribus posterioribus muticis. *Mus. Lesk. p.* 27. *n.* 594.
Habitat in Europa.

cærulea. 90. L. cærulea, elytris punctato-striatis: rugis crena-

natis, antennis æneis, femoribus posterioribus dentatis. *Muſ. Lesk. p.* 27. *n.* 595.
Habitat in Europa.

** *labio bifido*, Lepturæ Fabricii.
† *thorace antrorſum oblongiuſculo anguſtiore, elytris apice truncatis.*

unipunctata. 22. L. nigra, elytris rufis: puncto medio nigro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 1.
Habitat Dreſdæ, *ſtatura bipunctatæ.*

haſtata. 23. L. atra, elytris rubris: apice futuraque medio nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 157. *n.* 2. *Sulz. hiſt. inſ. t.* 5. *f.* 11.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 226. *n.* 6. Stenocorus niger, &c.
Habitat in Europa *magis auſtrali, melanuræ affinis; mas minor, abdomine rufeſcente.*

carbonaria. 91. L. nigra, elytris teſtaceis apice fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 28. *n.* 612.
Habitat in Europa, *an hujus familiæ?*

nigella. 92. L. nigra, elytris teſtaceis, tibiis anticis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 28. *n.* 614.
Habitat in Europa, *an hujus familiæ?*

erythropus. 93. L. nigra, pedibus rubris, femorum baſi tibiarum apice plantisque nigris. *Muſ. Lesk. p.* 28. *n.* 606.
Habitat in Europa.

quinquemaculata. 94. L. nigra, antennis nigro annulatis, pedibus elytrisque teſtaceis: his maculis quinque fuſcisque tribus nigris. *Muſ. Lesk. p.* 28. *n.* 600.
Habitat in Europa.

fu-

fusca. 95. L. fusca aureo pubescens, antennarum basi testacea, femoribus tibiisque anticis testaceis: illis supra fasciis, quatuor posterioribus basi testaceis. *Mus. Lesk. p.* 28. *n.* 617.
Habitat in Europa.

bipunctata. 24. L. nigra villosa, elytris lividis: sutura puncto medio apiceque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 245. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 3.
Habitat in Sibiria, *melanuræ valde affinis, elytris apice rotundatis.*

melanura. 2. L. nigra, elytris rubescentibus lividisve: sutura apiceque nigris. *Fn. suec.* 678. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 245. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 4.
Gadd. diss. 27. Leptura thorace nigro nitido, elytris obsolete sordideque flavescentibus.
Degeer inf. 5. *p.* 137. *n.* 14. Leptura variabilis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 226. *n.* 7. *t.* 4. *f.* 1.
Raj. inf. p. 97. *n.* 6.
Petiv. gaz. t. 30. *f.* 5.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 4.
ε) Leptura minor. *Fabr. mant.* 1. *p.* 158.
Habitat frequens in Europæ *floribus, mas elytris apice nigris, femina unicoloribus,* β) *duplo minor.*

livida. 26. L. nigra, elytris testaceis immaculatis; pedibus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 246. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 5.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 26. *f.* 23.
ε) Leptura major. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 158.
Habitat in Germaniæ *floribus,* β) *duplo major.*

rubra. 3. L. nigra, thorace, elytris tibiisque purpureis. *Fn. suec.* 500. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 246. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 158. *n.* 6.
Degeer inf. 5. *p.* 132. *n.* 7.
Frisch inf. 12. *t.* 3. *ic.* 6. *f.* 6.

Sulz.

Sulz. hist. inf. t. 5. f. 30.
Schaeff. ic. t. 39. f. 2.
Habitat in Europæ *floribus.*

emarginata. 27. L. atra, elytrisque purpureis apice emarginatis nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 158. n. 6.*
Habitat in Cayenna, *rubra major, immaculata.*

villica. 28. L. ferruginea, antennis, elytris pectoreque fuscis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 246. n. 5. mant. inf. 1. p. 158. n. 8.*
Habitat in Anglia.

sanguinolenta. 4. L. nigra, elytris sanguineis. *Fn. suec. 679. Scop. ent. carn. 150. Fabr. sp. inf. 1. p. 246. n. 4. mant. inf. 1. p. 158. n. 7.*
Scop. ent. carn. p. 47. n. 151? Leptura dubia.
Shaeff. ic. t. 39. f. 9.

testacea. 5. L. nigra, elytris testaceis, tibiis rufis, thorace posterius rotundato. *Fn. suec. 680.* Fabr. sp. inf. 1. p. 246. n. 7. mant. inf. 1. p. 158. n. 10.*
Degeer inf. 5. p. 135. n. 11.
Schaeff. ic. t. 39. f. 3.
Habitat in Europa *boreali; an mas rubræ, cui sæpe copula juncta?*

reveflita. 6. L. testacea, elytris, pectore antennisque atris.
Habitat in Germania, *statura testacea.* Schreber.

pubescens. 29. L. nigra cinereo-villosa: costa alarum basi testacea. *Fabr. mant. inf. 1. p. 158. n. 11.*
Habitat in Suecia, *testaceæ affinis.*

virens. 7. L. fericeo-virescens, antennis fusco viridique variis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 247. n. 8. mant. inf. 1. p. 158. n. 12.*
*Syst. nat. XII. 2. p. 638. n. 7. Fn. suec. 682.**

Le-

Leptura viridi-flava, antennis luteo viridique variis.
Degeer inf. 5. *p.* 131. *n.* 6. Leptura flavo-viridis.
Habitat in Europa *boreali.*

atra. 30. L. corpore nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 247. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 13.
Poda muſ. gr. p. 28. Leptura æthiops.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 228. *n.* 10. Stenocorus totus niger.
Habitat in Europa *magis auſtrali, pedibus interdum teſtaceis.*

humeralis. 31. L. nigra, humeris abdomineque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 158. *n.* 14.
Habitat in Germania, *ſtatura quadriguttatæ, at duplo fere major.*

futuralis. 32. L. cinerea, elytris teſtaceis: ſutura nigra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 15.
Habitat Halæ Saxonum, *atra paulo major.*

ſcutellata. 33. L. nigra, ſcutello albo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 247. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 16.
Habitat in Italia, *atra major.*

femorata. 34. L. nigricans, femoribus baſi rufis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 17.
Scop. ent. carn. p. 47. *n.* 155? Leptura ruficrus.
Habitat Halæ Saxonum, *ſtatura & magnitudine nigræ.*

ruficornis. 35. L. nigra, antennis pedibusque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 18.
Habitat in Italia, *femoribus interdum apice nigris.*

marginata. 36. L. nigra, elytrorum margine tibiisque poſterioribus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 147. *n.* 12. *mant.*

mant. inf. 1. *p.* 159. *n.* 19.
Habitat in Norwegia, *ſtatura nigræ.*

fericea. 8. L. viridi-cærulea, elytris ſubfaſtigiatis. *Fn. ſuec.* 683. * *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 249. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 32.
Schaeff. ic. t. 84. *f.* 1.
Habitat in Europa *boreali.*

quadrimaculata. 9. L. nigra, elytris lividis: maculis quatuor nigris. *Fn. ſuec.* 684. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 248. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 25.
Schaeff. elem. t. 118. *f.* 2.
ic. t. 1. *f.* 7.
Habitat in Europæ *plantis.*

interrogationis. 10. L. nigra, elytris lividis: faſcia longitudinali arcuata maculisque quatuor nigris. *Fn. ſuec.* 685. *Uddm. diſſ.* 35. *t.* 1. *f.* 2. Leptura nigra, elytris fuſco-flavis: maculis octo nigris.
Habitat in Europa.

ſexmaculata. 11. L. nigra, coleoptris teſtaceis: maculis ſex nigris margine connexis. *Fn. ſuec.* 686. * *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 248. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 26.
Degeer inſ. 5. *p.* 133. *n.* 9. Leptura teſtaceo maculata.
Raj. inſ. p. 81. *n.* 18.
Habitat in Europæ *plantis.*

12-maculata. 37. L. nigra, elytris flavis: maculis ſex nigris. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 248. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 27.
Habitat in Sibiria, *ſtatura ſexmaculatæ, at paulo major.*

quadrifaſciata. 12. L. nigra, elytris teſtaceis: faſciis quatuor nigris.

gris. *Fn. fuec.* 687. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 248. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 29.
Degeer inſ. 5. *p.* 132. *n.* 8. *t.* 4. *f.* 11. Leptura octomaculata.
Scop. ent. carn. n. 172. Cerambyx faſciatus.
Schaeff. ic. t. 59. *f.* 6.
Habitat in Europa, *attenuatæ affinis, an femina?*

attenuata. 13. L. elytris attenuatis flavis: faſciis quatuor nigris, pedibus teſtaceis. *Fn. fuec.* 688. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 248. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 28.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 99. *n.* 66. Prionus attenuatus.
Mull. zool. dan. prodr. p. 93. *n.* 1046? Leptura faſciata.
Schaeff. ic. t. 39. *f.* 6.
Habitat in Europa.
Femora *poſteriora apice nigra.*

dubia. 38. L. nigra ſubvilloſa, elytris teſtaceis nigro-punctatis, pedibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 249. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 30.
Habitat in Sibiria, *attenuatæ nimis affinis.*

ſexguttata. 39. L. nigra, elytris maculis tribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 249. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 160. *n.* 31.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. *p.* 102. *n.* 13. *t.* 26. *f.* 25.
Habitat in Germania.

nigra. 14. L. elytris attenuatis, corpore nigro nitido, abdomine rufo. *Fn. fuec.* 689. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 247. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 159. *n.* 20. *Degeer inſ.* 5. *p.* 144. *n.* 24.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 227. *n.* 9. Stenocorus niger nitidus, abdomine fuſco-rubente.

Schaeff.

Schaeff. ic. t. 39. *f.* 7.
Habitat in Europæ *floribus.*

adusta. 40. L. aureo-pubescens, capite elytrorumque apicibus nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 21.
Habitat Halæ Saxonum, *nigra paulo minor, pedibus rubris.*

4-guttata. 41. L. fusca, elytris nigris, punctis duobus basceis ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 22.
Habitat Halæ Saxonum, *magnitudine & statura nigræ.*

rostrata. 42. L. obscure ænea, pedibus flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 159. *n.* 23.
Habitat in Africæ *ammi majori, nigra minor.*

similis. 43. L. nigra, elytris spadiceis: apice fasciaque suturali nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 101. *n.* 2. *t.* 26. *f.* 22.
Habitat rarior Berolini, *melanuræ perquam similis.*

armata. 44. L. thorace nigro spinoso, antennis pedibusque ferrugineis, elytris flavis: punctis duobus, macula cordata, fasciisque tribus nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 101. *n.* 11. *t.* 20. *f.* 24.
Habitat Berolini, *attenuatæ affinis, antennarum articulis apice, capite, tarsis, & posterioribus pectore moribus tibiisque nigris, pedum posteriorum apice in altero sexu lobato.*

ceram-bycifor-mis. 45. L. nigra, elytris flavis: fasciis tribus nigris, prima ex punctis transversim positis. *Schrank. austr. p.* 154. *n.* 290.

Huic tribui adscribenda quoque videntur 4 species a Schaefero Leptur. affinis ic. t. 101. *f.* 5. *figurata ic. t.* 151. *f.* 7. *cinctata ic. t.* 103. *f.* 8. *& t.* 108. *f.* 1. *& aneo-punctulata ic. t.* 201. *f.* 6.

Scop. ent. carn. n. 154. Leptura quadrimaculata. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 102. *n.* 16. *t.* 26. *f.* 26.
Habitat in Ungaria & Auſtria, 4½ *lineas longa.*

ruſſica. 46. L. nigra albido-villoſa, elytris flaveſcentibus: maculis quinque lineaque media nigris. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 102. *n.* 17. *t.* 26. *f.* 27.
Habitat in Ruſſia.

lævis. 47. L. nigra, ſubtus villoſo-ſericea, antennis ex luteo fuſcis, pedibus anterioribus ferrugineis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 103. *n.* 18.
Habitat in Pomerania, *nigra dimidio minor.*

ſolſtitialis. 48. L. nigra, antennis baſi ferrugineis, pedibus elytrisque luteis: his margine nigris. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 103. *n.* 19.
Habitat Berolini, *vix* 3 *lineas longa.*

ſplendida. 49. L. nigra flavo-villoſa, elytris apice glabris, pedibus fulvis, antennis fuſcis, baſi ferrugineis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 103. *n.* 20.
Habitat in Marchia, 2½ *lineas longa, ad necydalin accedens.*

quadrinotata. 50. L. nigra flavicanti-ſubtus albido-villoſa, antennis baſi fuſcis, femoribus baſi ferrugineis, elytris punctatis: maculis duabus aurantiis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 7. *p.* 171. *n.* 22. *t.* 45. *f.* 13.
Habitat Berolini.

plumipes. 51. L. fuſca punctata, femoribus ſubclavatis, pedibus poſtremis longiſſimis: tibiis apice floccoſis. *Pall. ſpic. zool.* 9. *p.* 4. *t.* 1. *ff.* 2. 2.
Habitat - - - melanura minor, gracillima.

Tarsi *sparsa lanugine villosi; floccus in apice tibiarum posteriorum e villis nigris sericeis, in septem versus per longitudinem dispositis constat.*

rufipes. 52. L. nigra, pedibus rufis: femoribus basi nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 298. *Schaeff. ic. t.* 55. *f.* 7.
Habitat in rhamni cathartici, corni sanguineæ, crataegi oxyacanthæ *floribus*, Maio *frequens.*

octomaculata. 53. L. nigra, elytris testaceis: maculis sex apicibusque nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 299. *Schaeff. ic. t.* 6. *f.* 9.
Habitat in Saxonia.

Schalleri. 54. L. fusca, elytrorum basi maculis quatuor rufis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 299. *Schaeff. ic. t.* 182. *f.* 4.
Habitat, rarior, in rhamni cathartici, pruni spinosæ *floribus.*

ustulata. 55. L. nigra, thorace elytrisque testaceis, apice nigris, pedibus testaceis. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 298.
Habitat, rarior, in floribus Halensibus, *Fumio conspicua, cerambycis prausti statura & magnitudine.*

pumila. 56. L. fusca, pedibus anterioribus testaceis: femoribus superne nigris. *Schaller Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 299.
Habitat Halæ Saxonum, *in floribus, cerambycis prausti magnitudine.*

parisina. 56. L. tota nigra, femorum antenarumque basi rufescente. *Thunb. nov. act. Upsal.* 4. *p.* 16. *n.* 28.
Habitat Lutetiis, *melanura duplo minor, oblonga, angusta.* bi-

bipustulata. 57. L. elytris nigris striato-punctatis : maculis duabus testaceis. *Thunb. nov. act. Upsal.* 4. *p.*17. *n.* 29.
Habitat Upsaliæ, *magnitudine melanuræ* ; *an prisnæ tribus ?*

Scopolii. 58. L. abdominis thoracisque margine posteriore rubro, elytris testaceis pellucidis attenuatis: apice & margine infra medium nigro. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 100, *n.* 72.
Habitat in Carniola.

verna. 59. L. nigra, tibiis anterioribus fulvis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 94. *n.* 1055.
Schaeff. ic. t. 55. *f.* 9.
Habitat in Dania.

nigripes. 60. L. nigra, elytris obscure flavo-testaceis, pedibus nigris. *Degeer ins.* 5. *p.* 136. *n.* 12.
Habitat - - - 7 *lineas longa.*

maculosa. 61. L. nigra, elytris testaceo-lividis, antennis flavo maculatis. *Degeer ins.* 5. *p.* 139. *n.* 16.
Habitat - - - 4 *lineas longa.*

lunulata. 96. L. nigra, thorace posterius fascia angusta flava, elytris lunulis duabus ferrugineis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 18.
Habitat ad Caput bonæ spei, *melanuræ facie, at paulo major.*

bicolor. 97. L. pallide ferruginea, oculis, elytris, alis & ano supra nigris. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 19.
Habitat in America *septentrionali, attenuatæ simillima, at paulo minor.*

vittata. 98. L. pallide testacea, antennis fusco annulatis,

elytris nigris punctatis: vittis quatuor flavis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 20.
Habitat in America *septentrionali, facie & magnitudine sexmaculatæ.*

†† *thorace subglobosso nec anterius attenuato, elytris apice obtusis nec truncatis.*

virginea. 15. L. thorace globoso nigro, elytris violaceis, abdomine rufo. *Fn. suec.* 690. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 249. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 34.
Degeer inf. 5. *p.* 144. *n.* 23. Leptura violacea.
Gadd diss. 26. Leptura nigra, elytris cæruleſcentibus, toto abdomine rubro.
Schaeff. ic. t. 58. *f.* 8.
Habitat in Europa *boreali.*

collaris. 16. L. thorace globoso abdomineque rubris, elytris nigris. *Fn. suec.* 691. *Scop. ent. carn.* 159. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 249. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 160. *n.* 33.
Degeer inf. 5. *p.* 143. *n.* 22. Leptura ruficollis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 228. *n.* 11. Stenocorus niger, thorace rubro.
Schaeff. ic. t. 58. *f.* 9.
Habitat in Europa.

decempunctata. 62. L. atra, thorace subglobosso, elytris decempunctatis. *Lepechin it.* II. *t.* 10. *f.* 2.
Habitat in monte Ural.

varia. 63. L. villosa cana, thorace subglobosso, elytris nigris: punctis octo & fasciis interruptis quatuor albis. *Lepech. it.* II. *t.* 10. *f.* 4.
Habitat in monte Ural.

viridis. 64. L. viridiuscula, thorace subovato: lineolis duo-

duabus longitudinalibus obſcurioribus, dorſo nigro. *Lepech. it.* II. *t.* 10. *f.* 11.
Habitat in Sibiria.

linearis. 25. L. thorace ovato, corpore cyaneo lineari, antennis longioribus. *Muſ. Lud. Ulr.* 77. *
Habitat in India, *femoribus nunc clavatis, nunc linearibus.*

maſſilienſis. 65. L. nigra, thorace ſubgloboſo, elytris faſciis ſubtribus albis introrſum fractis. *Syſt. nat.* XII. *add. p.* 1067. *n.* 8.
Habitat in Luſitania, & Maſſilia, *facie cerambycis ruſtici, ſed triplo minor; an cerambyx?*

piloſa. 66. L. nigra cinereo-pubeſcens, thorace globoſo, elytris faſtigiatis. *Forſt. nov. inſ.* 1. *p.* 44. *n.* 44.
Habitat in Hiſpania *ad* calpen freti Gaditani: *magnitudine circiter cerambycis myſtici.*

nitens. 67. L. thorace globoſo & abdomine nigris flaveſcenti-tomentoſis nitentibus, elytris atris: faſciis quatuor latis tranſverſis flavis, pedibus ferrugineis. *Forſt. nov. inſ.* 1. *p.* 45. *n.* 45.
Habitat in America *ſeptentrionali, magnitudine melanuræ.*

bilineata. 68. L. fuſco-nigricans, thorace lineis binis, elytris punctis ſparſis flaveſcentibus. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 102. *n.* 76.
Habitat in Carniola, *habitu cerambycis cardui, nonne cerambyx?*

cærulea. 69. L. cærulea, tibiis anterioribus rufis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 102. *n.* 78.
Habitat in Carniola.

ſqualida. 70. L. nigra, elytris baſi & margine interiori teſta-

ſtaceis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 102. *n.* 79.
Habitat in Carniola, *antennis brevibus.*

bipartita. 71. L. nigra, thorace ferrugineo: linea nigra longitudinali, elytris macula communi ferruginea.
Schranck Beytr. z. Naturg. p. 68. §. 15.
Habitat in Germania *ſuperiori.*

ferruginea. 72. L. nigra, elytris ferrugineis, extrorſum la nigris. *Schranck Beytr. z. Naturg. p.* 68. §. t. 3. *f.* 14.
Habitat in Germania.

Lamda. 73. L. nigro, elytris faſciis tribus albis. *Schran Beytr.* 1. *Naturg. p.* 67. §. 13. *t.* 3. *f.* 13.
Habitat in Germania.

aurea. 74. L. viridi-aurea, thorace ſpinoſo, elytris fa ſciis binis longitudinalibus nigris, femoribus fis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 145. *n.* 1.
Habitat - - - 8½ *lineas longa.*

Genii. 75. L. nigra, elytris fuſco-teſtaceis apice nigri pedibus flavis. *Degeer inſ.* 5. *p.* 139. *n.* 17.
Schaeff. icon. t. 39. *f.* 5.
Habitat in Europa, *tabaci colore*, 3½ *lineas long*

maculata. 76. L. nigra, maculis villoſo-flavis, thorace g boſo, antennis corpore dimidio brevioribu
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 211. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

nævia. 77. L. nigra villoſo-flava, elytris maculis dua glabris nigris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 211. *n.* 8.
Habitat in Gallia.

punctulata. 78. L. nigricans, capite thoraceque rubro nigro punctato. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 212. *n.* 9.
Habitat in Gallia.

strigosa. 79. L. villoso flava, elytris lineis tribus transversis nigris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 216. *n.* 14.
Habitat in Gallia.

gallica. 80. L. cærulea, tibiis rufis, thorace subgloboso. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 217. *n.* 16.
Habitat in Gallia.

crassipes. 81. L. atra, femoribus crassis rufis. *Geoffr. inf.* 1. *par.* 5. *p.* 219. *n.* 20.
Habitat in Gallia.

bimaculata. 82. L. rufa, thorace cylindrico, elytris punctatis: macula & striga undulata albis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 95. *n.* 1073.
Schaeff. ic. t. 158. *f.* 1.
Habitat in Europa.

villosa. 83. L. nigra villosa thorace cylindrico: linea longitudinali pallida. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 95. *n.* 1072.
Habitat in Dania. *

306. NECYDALIS. *Antennæ* setaceæ vel filiformes.
Palpi quatuor filiformes.
Elytra alis minora, breviora vel angustiora.
Cauda simplex.

* *antennis setaceis, elytris ala & abdomine brevioribus*, Lepturæ Fabricii.

major. 1. N. elytris ferrugineis immaculatis, antennis brevioribus. *Fn. suec.* 838. *

De-

Specierum 64-83 locus in hoc genere dubius.

Degeer inſ. 5. *p.* 148. *n.* 1. *t.* 5. *f.* 1. Necyda[lis] ichneumonea.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.*250. *n.* 25. *mant. inſ.*1. *p.*16[9] *n.* 35. Leptura abbreviata.
Schaeff. monogr. 1753. *f.* 1. 2. Muſca Ceramb[yx] major.
elem. t. 13. *f.* 2.
ic. t. 10. *f.* 10. 11.
Habitat in Europa.

variegata. 12. N. abdomine atro : faſciis fulvis.
*Fabr. ſp. inſ.*1. *p.*250. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.*1[69] *n.* 36. Leptura variegata.
Habitat in nova Hollandia.

minor. 2. N. elytris teſtaceis : apice lineola alba, ante[nn]is longioribus. *Fn. ſuec.*837. * *Scop. ent. carn.* 179.
It. oeland. 74. Necydalis elytris flavis lineola alb[a]
Degeer inſ. 5. *p.*151. *n.*2. Necydalis ceramboide[s]
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 250. *n.*27. *mant. inſ.* 1. *p.*16[9] *n.* 37. Leptura dimidiata.
Schaeff. monogr. 1753. *f.* 6. 7. Muſca Ceramb[yx] minor.
icon. t. 95. *f.* 5.
*Sulz. hiſt. inſ. t.*7. *f.* 51.
Habitat in Europa, *imprimis boreali.*

umbellatarum. 3. N. elytris teſtaceis immaculatis, antennis lon[gis].
Schreb. inſ. 4. Necydalis elytris apice nigris.
Scop. ent. carn. 180. Necydalis minima.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 250. *n.* 28. Leptura umbella[ta]rum.
Schaeff. ic. t. 95. *f.* 4.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 1.
Habitat in Germaniæ *umbellatis.*

** an[tennis]

** *antennis filiformibus, elytris subulatis longitudine abdominis.*

viridissima. 13. N. thorace teretiusculo, corpore viridi. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 263. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 1. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 650. *n.* 23. *Fn. suec.* 717. Cantharis viridissima.

Degeer inf. 5. *p.* 15. *n.* 3. *t.* 1. *f.* 13. Cantharis viridi-ænea nitida.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 177. *n.* 14. Cicindela viridi-cærulea.

Habitat in Europæ *hortis frequens.*

cæruleſcens. 14. N. thorace teretiusculo, corpore cæruleo subopaco. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 263. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 2.

Syst. nat. XII. 2. *p.* 650. *n.* 22. Cantharis cærulea.

Degeer inf. 4. *p.* 76. *n.* 8. Telephorus villosus violaceo-cæruleus.

Habitat in Europa *boreali.*

ſanguinicollis. 15. N. thorace teretiusculo rufo, corpore fusco. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 3.

Habitat Halæ Saxonum, *magnitudine & ſtatura cæruleſcentis.*

ruficollis. 16. N. thorace teretiusculo abdomineque rufis, capite elytrisque viridi-æneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 263. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 4.

Habitat in Italia, *ſtatura & magnitudine cæruleſcentis.*

cærulea. 4. N. cærulea, femoribus posterioribus clavatis arcuatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 264. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 11.

Forſt. nov. inf. 1. *p.* 47. *n.* 47. Necydalis cerambοides.

Scop. ent. carn. 145. Cantharis nobilis.

Geoffr.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 342. *n.* 3. Cantharis viridi-cærulea.
Sulz. hist. inf. 48. *t.* 6. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 94. *f.* 7.
Habitat in Europa *magis australi* & Oriente, *pedibus interdum simplicibus.*

triſtis. 17. N. nigra, thorace teretiuſculo femorumque baſi rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 5.
Habitat in terra van Diemen, *ſtatura atræ.*

atra. 5. N. nigra, femoribus omnibus clavatis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 263. *mant. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 6.
Habitat in Europa *auſtrali, femoribus in altero ſexu ſimplicibus.* Aſcanius.

humeralis. 18. N. elytris nigris baſi flavis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 263. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 7.
Forſt. nov. inf. ſp. 1. *p.* 48. *n.* 48. Necydalis (muralis) elytris ſubulatis fuſca, humeris flavis, pedibus ſimplicibus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 342. *n.* 2. Cantharis nigra, &c.
Habitat in Anglia.

uſtulata. 19. N. nigra, elytris baſi futuraque lata teſtaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 8. *Schranck inf. auſtr. n.* 319. *Herbſt apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 109. *n.* 8.
Habitat in Germaniæ *plantis, ſtatura humeralis.* Femina *major, thorace fulvo.*

melanura. 20. N. nigra, thorace elytrisque teſtaceis: his apice nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 170. *n.* 9.
Habitat in Hiſpaniæ *plantis, ſtatura & magnitudine ruficollis.*

rufa. 6. N. nigra, femoribus omnibus clavatis, elytris an-

antennisque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 263. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 10.
Geoffr. inſ. par. 2. *p.* 220. *n.* 22. Leptura nigra, &c.
Schaeff. ic. t. 94. *f.* 8.
Habitat in Europa.

glaucescens. 7. N. elytris glaucis, corpore nigro, abdominis incisuris albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 13.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 642. *n.* 7. Necydalis elytris glauco flavescentibus, femoribus clavatis.
Syſt. nat. X. *p.* 399. *n.* 17. Leptura necydalea.
Schaeff. ic. t. 94. *f.* 6.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

flavescens. 8. N. elytris teſtaceis, corpore nigro, femoribus poſterioribus clavatis arcuatis.
Scop. ent. carn. 145. Cantharis femorata.
Schaeff. ic. t. 85. *f.* 7.
Habitat in Europa; *an mera n. podagrariæ varietas?*

podagrariæ. 9. N. elytris teſtaceis, corpore nigro, femoribus poſterioribus clavatis baſi teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 264. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 12.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 343. *n.* 4. Cantharis nigra, &c.
Habitat in ægopodio podagraria, *elytrorum apice nigro, antennarum baſi, palpis, & pedibus quatuor anterioribus teſtaceis.* Schreber.

ſimplex. 10. N. elytris teſtaceis, pedibus ſimplicibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 264. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 171. *n.* 14.
Scop. ent. carn. 144. Cantharis phthyſica.
Habitat in Europa, *an ſorſan n. podagrariæ varietas?*

bre-

brevicornis. 11. N. elytris minutiſſimis, capite thoraceque ſcis: linea longitudinali flava, antennis brevi mis craſſiuſculis.
Habitat in Guinea, *majoris magnitudine, elongat elytris ex rufo fuſcis, pedibus teſtaceis.*

ſtriata. 21. N. vireſcens, elytris lineis quatuor elevati *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 109. *n.* 5.
Habitat Berolini.

melanocephala. 22. N. elytris teſtaceis, capite epigaſtrio aliſque nigris, antennis fuſcis. *Schall. Abh. der hal Naturf. Geſ.* 1. *p.* 306.
Habitat Halæ Soxonum *in umbellatis.*

glauca. 23. N. nigra, thorace elytrisque cyaneis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 109. *n.* 6.
Habitat rarior Berolini, 5 *lineas longa.*

collaris. 24. N. atra, thorace bipunctato teſtaceo, pedibus ſimplicibus. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 46. *n.* 46.
Habitat in America *ſeptentrionali, cæruleæ magnitudine.*

exuſta. 25. N. fuſca, elytris ſubulatis teſtaceis margine exuſtis, pedibus ſimplicibus. *Muſ. Lesk. p.* 31. *n.* 664.
Habitat in Europa.

clavipes. 26. N. nigra, elytris ſubulatis teſtaceis margine exteriore fuſcis, femoribus poſterioribus clavatis arcuatis. *Muſ. Lesk. p.* 31. *n.* 665.
Habitat in Europa.

207. LAMPYRIS. *Antennæ* filiformes.
Palpi quatuor.
Elytra flexilia.
Thorax planus, semiorbiculatus, caput subtus occultans cingensque.
Abdominis latera plicato-papillosa.
Femina aptera plerisque, larvæ phytiphagæ similis.

* *palpis subclavatis.*

noctiluca. 1. L. oblonga fusca, clypeo cinereo. *Fn. suec.* 699. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.*251.*n.*1. *mant. inf.* 1. *p.*161. *n.* 1.
Degeer inf. 4. *p.* 31. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 19. 20. Lampyris noctiluca communis.
Leche nov. sp. 23. *n.* 47. Cantharis mas coleopterus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 167. *t.* 2. *f.* 7.
Habitat in Europæ *borealis juniperetis graminosis*, *etiam in* Calabria.

coruscа. 2. L. obscure nigra, clypeo utrinque lunula rosea. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 251. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 3.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 644. *n.* 2. *Uddm. diss.* 47. Lampyris oblongiuscula fusca, clypeo utrinque intra marginem fulvo.
Habitat in America *boreali.*

splendidula. 3. L. oblonga fusca, clypeo apice hyalino. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 251. *n.* 2. *mant. inf.* 1, *p.*161. *n.*2.
Syst. nat. XII. 2. *p.*644. *n.* 3. Lampyris oblongiuscula fusca, clypeo supra oculos fenestrato.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 166. *n.* 1. Lampyris femina aptera. *Scop.*

Scop. ent. carn. n. 118. Cassida noctiluca.
Poda inf. 39. Cantharis noctiluca.
Raj. inf. p. 78. *n.* 15.
Guen. de Montbeill. nov. act. Divion. 1782. *sem.* 2.
Column. ephr. 1. 38. *t.* 36.
Aldr. inf. 492.
Mouff. inf. p. 109. *f.* 1. & 2.
Jonst. inf. t. 14. *f.* 2.
Bradl. nat. t. 26. *f.* 3. A. B.
Schaeff. elem. t. 74.
Habitat in Europæ *silvaticis*, *an a noctiluca satis distincta, tempestate imprimis pluvia lucem spargens, femina majorem, gravida maximam, in aere vitali adhuc majorem.*

obscura. 19. L. nigra, clypeo utrinque macula rufa. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 251. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 4.
Habitat in tierra del Fuego.

Pyralis. 4. L. clypeo rufo medio nigro, elytris nigris: marginibus abdomineque albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 251. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 5.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 644. *n.* 4. *Mus. Lud. Ulr.* 78. * Lampyris oblongiuscula fusca, elytris margine rufescentibus, clypeo intra marginem purpurascente.
Degeer inf. 4. *p.* 52. *n.* 7. *t.* 17. *f.* 7. Lampyris oblonga.
Habitat in America *meridionali.*

cincta. 20. L. fusca, thorace elytrorum margine omni abdominisque apice fulvis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 161. *n.* 6.
Habitat in Pulicander, *pyralidi proxime affinis.*

margi- nata. 5. L. oblonga nigra, thoracis elytrorumque margine omni, scutello abdominisque posteriore flavis.

vis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 252. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 7.
Habitat in America *meridionali*, *magnitudine noctilucæ.*

Heſperia. 6. L. ovata, elytris fuſcis: macula marginali triangulari flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 252. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 10.
Degeer inſ. 4. *p.* 48. *n.* 1. *t.* 17. *f.* 1. Lampyris ſurinamenſis.
Habitat in America *meridionali* Rolander.

ignita. 7. L. ovata, elytris fuſcis: macula marginali ovata lutea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 252. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 11.
Degeer inſ. 4. *p.* 49. *n.* 2. *t.* 17. *f.* 2. Lampyris ovata.
Habitat in America *meridionali*, *fuſca*, *ſubtus flava*, *alis nigris.* Rolander.

lucida. 8. L. oblonga, elytris fuſcis: margine exteriore luteo, abdomine flavo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 253. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 12.
Degeer inſ. 4. *p.* 51. *n.* 5. *t.* 17. *f.* 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 22.
Habitat in America *meridionali*, *noctilucæ ſimilis*, *ſed pallidior*, *capite antennisque nigris.*

nitidula. 21. L. oblonga fuſca, thorace flaveſcente: macula media nigra, abdomine apice maculis duabus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 253. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 13.
Habitat in Africa *æquinoctiali.*

phoſphorea. 9. L. oblonga ſubteſtacea, abdomine atro, poſterius flaviſſimo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 253. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 14.
Degeer inſ. 4. *p.* 51. *n.* 6. *t.* 17. *f.* 6. Lampyris oblonga, &c.

Ha-

Habitat in America *meridionali*, *antennis nigris* Rolander.

japonica. 22. L. flava, segmento abdominis antepenultimi nigro. *Thunb. nov. inf. fp.* 4. *p.* 79. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 162. *n.* 16.
Habitat in Japonia, *Maio & Junio copiosissima vesperi lucem egregiam e vesiculis binis caudalibus aere repletis spargens, oculis, antennis alisque nigris.*

compressa. 23. L. testacea, antennis pedibusque compressis. *Thunb. nov inf. fp.* 4. *p.* 80.
Habitat in India, *oblonga, linearis, glabra, abdomine cæruleſcente, capite, pectore, pedibus antennisque nigris.*

capensis. 24. L. livida, thorace flaveſcente, abdomine posterius flaviſſimo. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 253. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 162. *n.* 16.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

australis. 25. L. flavicans, capite elytrisque fuſcis. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 253. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 162. *n.* 17.
Habitat in nova Hollandia.

mauritanica. 10. L. elytris lividis, corpore flavo. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 254. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 162. *n.* 18.
Habitat in Africæ *plantis, ſplendidula duplo, femina triplo major.*

depressa. 26. L. fuſca, clypei elytrorumque margine dilatato plano. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 254. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 162. *n.* 19.
Herbſt apud Fuessli arch. inf. 7. *p.* 171. *n.* 2. *t.* 46. *f.* 7.
Habitat in Coramandel, *magna.*

ita-

italica. 11. L. elytris fuſcis, thorace tranſverſo rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 253. *n.* 16.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 645. *n.* 11. Lampyris elytris fuſcis, clypeo antice tranſverſo rufo medio nigro.
Degeer inſ. 4. *p.* 53. *n.* 9. *t.* 17. *f.* 9. 10. Lampyris oblonga, &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 3.
Habitat in Italiæ, & Helvetiæ *arboribus, congeneribus minor, fuſca, abdominis ſegmentis 2 ultimis flavis, pectore pedibusque luteis; femina nigra.*

chinenſis. 12. L. elytris teſtaceis apice nigris. *Osb. it.* 224.*
Habitat in Aſia.

minuta. 13. L. teſtacea, abdomine alisque nigricantibus.
Habitat in Europa, *vix pediculo major, ex ovali oblonga.*

pectinata. 27. L. atra, clypei lateribus baſi exteriore, elytrorum abdominisque apicibus albis, antennis pectinatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 252. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 8.
Degeer inſ. 4. *p.* 57. *n.* 11. *t.* 17. *f.* 13. Lampyris atra, &c.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 649. *n.* 17. Cantharis pectinata.
Habitat in America *meridionali.*

flabellicornis. 28. L. nigra, clypeo ante marginem, elytris lineola marginali baſeos abdomineque apice albis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 252. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 161. *n.* 9.
Habitat in Braſilia, *magna.*

piloſa. 29. L. oblonga nigra, thorace ſanguineo: lineis duabus longitudinalibus nigris, antennarum articulis tribus extimis pectinatis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 49. *n.* 49.

Habitat in America *ſeptentrionali*, *nuctilucæ ſa*
magnitudine; *an ex hac tribu?*

** *palpis ſubfiliformibus*, Pyrochroæ Fabrici

faſciata. 30. L. atra, thoracis margine flaveſcente, elytr
faſcia lata alba. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.*
Habitat in Cayenna, *ſtatura reticulatæ.*

reticulata. 31. L. atra, thoracis margine flavo, elytris flavi
faſcia apiceque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 25
n. 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 8.
Habitat in America *boreali.*

bicolor. 16. L. ſanguinea, elytris poſterius violaceis. *F*
br. ſp. inſ. 1. *p.* 255. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 16
n. 7.
Amœn. acad. 6. *p.* 395. *n.* 21. Cantharis bicolo
Habitat in Africa, *antennis compreſſis.*

puſilla. 32. L. atra, antennarum apicibus elytrisque ſa
guineis.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 163. *n.* 6.
Degeer inſ. 4. *p.* 36. *n.* 3. Lampyris nigro-rubr
Habitat in Norwegia, *ſanguinea duplo major.*

nigripes. 33. L. ſanguinea, antennis pedibusque nigris
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 163. *n.* 5.
Habitat in Siam, *ſtatura & magnitudine ſanguine*

ſanguinea. 17. L. nigra, thoracis lateribus elytrisque ſangui
neis. *Fn. ſuec.* 704. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 25
n. 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 4.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 168. *n.* 3. Lampyris, elytri
rubris.
Degeer inſ. 4. *p.* 452. *t.* 2. *f.* 1. Lampyris ſan
guinea.
Scop. ent. carn. 119. Caſſida ſanguinea.

Raj.

Raj. inſ. p. 101. *n.* 4.
Friſch inſ. 12. *p.* 40. *n.* 3. *t.* 7. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 7. *f.* 1.
Habitat in Europæ *lapidoſis.*

pectinicornis. 34. L. atra, thorace elytrisque teſtaceis, antennis pectinatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 3. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 650. *n.* 20. *Fn. ſuec.* 715. Cantaris pectinicornis.
Habitat in Germania, *coccinea major.*

rubens. 35. L. nigra, capite, thorace elytrisque rubris, antennis pectinatis.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 301. *Schranck inſ. auſtr. p.* 174. *n.* 324. Pyrochroa Satrapa.
Habitat Halæ Saxonum, *Maio & Junio conſpicua, ſtatura coccineæ, at dimidio minor.*

flabellata. 36. L. coccinea, antennis elytrisque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 162. *n.* 2.
Habitat in America, *ſtatura & magnitudine coccineæ, antennis ferratis.*

coccinea. 18. L. nigra, thorace elytrisque ſanguineis immaculatis. *Fn. ſuec.* 705. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 254. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 1.
Degeer inſ. 4. *p.* 47. *n.* 4. Lampyris villoſa.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 338. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 4. Pyrochroa.
Schaeff. ic. t. 90. *f.* 4.
Habitat in Europæ *ſepibus, capite aliquando rufo, elytris interdum ſtriatis.*

Aurora. 37. L. nigra, thorace rubro cancellato, elytris ſpadiceis: lineis quatuor elevatis; interſtitiis ſeriatim punctatis. *Herſt apud Fuesslii arch. inſ.* 5. *p.* 105. *n.* 4.

Habitat in Pomerania.

nitens. 38. L. oblonga, elytris fuſceſcentibus: macul
marginali oblonga fuſca, abdomine ſubtus ruſc
poſterius flavo: ſegmento unico nigro. *Degee*
inſ. 4. *p.* 50. *n.* 3. *t.* 17. *f.* 3.
Habitat in Surinamo, 4½ *lineas longa.*

macu- 39. L. ovata teſtacea, thorace faſcia elytrisq
lata. macula nigris. *Degeer inſ.* 4. *p.* 50. *n.* 4. *t.* 1
f. 4.
Habitat - - - ſex lineas longa.

penſyl- 40. L. oblonga, elytris pallide ex griſeo teſtaceis
vanica. thorace intra marginem nigro: maculis bin
ruſis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 52. *n.* 8. *t.* 17. *f.* 8.
Brown jam. *p.* 431. *t.* 44. *f.* 9. a. b. Pyralis m
nor ſubcinerea longa, alis & oculis nigrican
bus?
Habitat in Penſylvania.

**** palpis articulo ultimo craſſiori truncat*
Lyci Fabricii.

latiſſi- 14. C. flava, elytris macula marginali poſteriusq
ma. nigris, margine laterali maximo dilatato. *Fab*
ſp. inſ. 1. *p.* 255. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.*
Habitat in Sierra Leon Africæ, *ſtatura & magn*
tudine ſilphæ cujuſdam minoris, antrorſum a
guſta, retrorſum latiſſima, antennis ſerratis.

pallia- 41. L. elytris coriaceis latiſſimis teſtaceis apic
ta. nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 255. *n.* 6. *mant. in*
1. *p.* 163. *n.* 2.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

roſtra- 16. L. nigra, thoracis lateribus elytrisque dilatat
ta. flavis anterius poſteriusque nigris. *Fabr. ſp. in*
1.

1. *p.* 255. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 163. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 646. *n.* 15. *Muſ. Lud. Ulr.* 78. Lampyris elytris teſtaceis antice poſticeque nigris.
Degeer inſ. 7. *p.* 622. *n.* 19. *t.* 46. *f.* 11.
Habitat in Africæ *plantis.*

proboſcidea. 42. L. nigra, thoracis lateribus elytrisque flavis, poſterius nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 255. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 4.
Habitat in Africa *æquinoctiali, roſtratæ proxime affinis.*

ferraticornis. 43. L. nigra, thorace elytrisque rufeſcentibus, elytris apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 256. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 5.
Habitat in nova Hollandia.

atra. 44. L. atra, thorace orbiculato elytrisque rubris, dorſi macula impreſſa nigra. *Muſ. Leſk. p.* 29. *n.* 626.
Habitat in Europa.

HORIA. *Antennæ* moniliformes.
Palpi quatuor extrorſum craſſiores.
Labium lineari, apice rotundatum.

teſtacea. 1. H. rufa, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 1.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 256. *n.* 1. Lymexylon teſtaceum.
Habitat Tranquebariæ.
Mari *femora poſteriora incraſſata, ſubtus canaliculata dentata.*

dermeſtoides. 2. H. teſtacea, oculis, alis pectoreque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 2.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 650. *n.* 25. *Fn. ſuec.* 702. *

Can-

Cantharis teſtacea, oculis, alis pectoreque nigris, antennis longitudine thoracis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 256. *n.* 2. Lymexylon dermeſtoides.
Herſt apud Fuessli arch. inſ. 6. *p.* 145. *n.* 5. *t.* 3. *f.* 4. Lytta francofurtana.
Habitat in Europa *media.*

CUCUJUS. *Antennæ* filiformes.
Palpi quatuor æquales: articulo ultimo truncato, craſſiori.
Labium breve, bifidum: laciniis lineribus, diſtantibus.
Corpus depreſſum.

monilis. 1. C. ſupra niger, thorace quadrato mutico margine, elytris macula ferruginea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 9.
Habitat in Germania, *antennis moniliformibus ad horiam accedens, vix hujus generis.*

muticus. 2. C. thorace mutico nigro, puncto utrinque impreſſo, elytris ſtriatis ſuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 257. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 8.
Habitat in Germania, *niger.*

teſtáceus. 3. C. teſtaceus, thorace ſubquadrato mutico, femoribus compreſſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 7.
Habitat ſub betulæ *cortice.*

dubius. 4. C. thorace denticulato ruſo, elytris nigris, antennis filiformibus longitudine corporis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 257. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 5.
Habitat in America *boreali.*

clavipes. 5. C. ruber, thorace ſulcato, femoribus clavatis ru-

rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 257. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 4.
Habitat in America *boreali.*

cæruleus. 6. C. niger, thorace ſulcato, elytris ſtriatis cæruleis, abdomine rufo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 166. *n.* 3. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 2. *p.* 6. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 5. 6.
Habitat in Germania, *depreſſo major.*

ſulcatus. 7. C. niger, thorace ſulcato, elytris crenato-ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 2.
Habitat in Croatiæ *ligno putreſcente, elongatus, mediæ magnitudinis.*

depreſſus. 8. C. thorace denticulato elytrisque rufis, pedibus ſimplicibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 257. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 647. *n.* 1. Cantharis (ſanguinolenta) ſupra rubra, elytris bimarginatis.
Friſch inſ. 13. *c.* 24. 3. *t.* 7. *f.* 1.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 2. *p.* 4. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1-4.
Habitat in Germania & Ruſſia, *lampyridi ſanguineæ affinis.*

quadratus. 9. C. niger, thorace quadrato poſterius dentato, medio tuberculato, margine externo rugoſo, anterius elevato, antennis fuſcis, pedibus ſimplicibus elytrisque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 29. *n.* 629. b.
Habitat in Europa.

rufus. 10. C. rufeſcens, mandibulis validis, antennis, palpis pedibusque nigris, capite gibboſo, elytris molliuſculis. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 21.
Habitat in Sumatra.

ma-

maculatus. 11. C. fordide flavus, thorace quadrangulo inæquali, mandibulis validis, pedibus, elytrorumque maculis subquadratis nigris. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 22. *t.* 8. *f.* 8.
Habitat in Noveboraco, *congenerum maximus, subdepressus.*

208. CANTHARIS. *Antennæ* filiformes.
Thorax (plerisque) marginatus, capite brevior.
Elytra flexilia.
Abdominis latera plicato-papillosa.

* *palpis quatuor securiformibus.*

viridescens. 1. C. thorace testaceo: macula nigra, elytris viridibus, antennis pedibusque testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 167. *n.* 3.
Habitat ad Caput bonæ spei, *magna, capite nigro, pectore fusco, abdomine testaceo.*

fusca. 2. C. thorace rubro: macula nigra, elytris fuscis. *Fn. suec.* 700. * *It. oel.* 38. *Scop. ent. carn.* 120. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 257. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 167. *n.* 1.
Raj. inf. p. 84. *n.* 29. & *p.* 101. *n.* 2. Cantharis sepiarius major, elytris nigricantibus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 170. *n.* 1. *t.* 2. *f.* 8. Cicindela elytris nigricantibus, &c.
Degeer inf. 4. *p.* 60. *n.* 1. *t.* 2. *f.* 12. Telephorus fuscus.
Poda inf. 40. *n.* 4.
Frisch inf. 12. 3. *t.* 6. *f.* 5.

Sulz.

Cantharides *declaratæ aliis vitiantibus insectis, sola lymexyli tribus, tum larvæ, tum imago, ligno recenti.*

Sulz. hiſt. inſ. t. 5. f. 33.
Schaeff. elem. t. 123. f. 1. 2.
ic. t. 16. f. 10. & t. 26. f. 9-12.
Habitat frequens in Europæ *ſepibus*, *rapaciſſima*, *in propriam ſpeciem ſæviens.*

marginella. 73. C. teſtacea, abdomine nigro marginato capite poſterius pectore oculisque flavis. *Muſ. Lesk. p. 29. n. 631.*
Habitat in Europa.

media. 74. C. fuſca, thorace, capite, antennarum baſi, abdominis margine & apice pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p. 29. n. 632.*
Habitat in Europa.

hæmatoſtoma. 75. C. nigra, ore abdomineque rufo. *Muſ. Lesk. p. 29. n. 633.*
Habitat in Europa.

punctata. 76. C. livida, oculis truncoque fuſcis, abdominis ſegmentis utrinque puncto fuſco. *Muſ. Lesk. p. 29. n. 638.*
Habitat in Europa.

dichroa. 77. C. nigra, fronte, thorace, abdomine pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p. 29. n. 639.*
Habitat in Europa.

multicolor. 78. C. capite nigro, fronte thoraceque luteis, elytris fuſcis, abdomine pedibusque lividis. *Muſ. Lesk. p. 29. n. 640.*
Habitat in Europa.

livens. 79. C. thoracis macula nigra poſterius triloba, utrinque punctis duobus impreſſis fuſcis, capite poſterius nigro, elytris fuſcis. *Muſ. Lesk. p. 30. n. 642.*
Habitat extra Europam.

di-

distin-cta. 80. C. nigra, maxillis thoracis abdominisque marginibus externis lividis. *Muſ. Lesk. p.* 30 *n.* 643.
Habitat in Europa.

exuſta. 81. C. fuſca, capite thoraceque nigris, elytris teſtaceis apice exuſtis, antennis pedibusque luteis. *Muſ. Lesk. p.* 30. *n.* 644.
Habitat in Europa.

livida. 3. C. toto teſtacea. *Fn. ſuec.* 701. * *Scop. ent. carn.* 122. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 258. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 2.
Raj. inſ. p. 84. *n.* 28. Cantharis ſepiarius major e rufo flavicans.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 171. *n.* 2. Cicindela thorace rubro immaculato, &c.
Degeer inſ. 4. *p.* 70. *n.* 2. Thelephorus flavus.
Habitat in Europa *& boreali* America.

rufa. 4. C. tota rufa, epigaſtrio alisque nigris. *Fn. ſuec.* 703. *
Habitat in Europa.

obſcura. 5. C. thoracis marginibus rubris, corpore nigro. *Fn. ſuec.* 706. *Act. nidroſ.* 3. *p.* 396. *t.* 6. *f.* 5. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 258. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 4.
Schaeff. ic. t. 16. *f.* 8.
Habitat in Europa, *thoracis margine aliquando fuſcescente, pedibus interdum rubris, fuſcæ ſimilis, at duplo minor.*

limbata. 20. C. fronte elytrorumque marginibus rufis, corpore nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 258. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 5.
Habitat in Jamaica, *mediæ magnitudinis.*

la-

laterali. 6. C. thorace rubro, corpore fuſco, elytris margine exteriore flaveſcentibus. *Fn. ſuec.* 707. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 258. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 6.
Habitat in Europa *boreali.*

ſmaragdula. 22. C. thorace flavo: macula viridi, elytris viridibus nitidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 6.
Habitat in Braſilia, *mediæ magnitudinis.*

biguttata. 11. C. thorace medio atro, elytris abbreviatis nigris apice flavis. *Fn. ſuec.* 712. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 261. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 24.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 176. *n.* 11. Cicindela fuſca, elytris apice flavis, thorace fuſco.
Degeer inſ. 4. *p.* 77. *n.* 10. Thelephorus niger, femoribus flavis, elytris apice luteis.
Habitat in Europæ *nemoribus, hortis.*

minima. 12. C. thorace rufo: macula nigra, corpore fuſco, elytris apice flavis. *Fn. ſuec.* 713. * *Scop. ent. carn.* 128. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 260. *n.* 18. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 22. *Lesk. it. p.* 47. *t.* A. *f.* 14. *Fn. ſuec.* 598. * Necydalis elytris apice puncto flavo.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 176. *n.* 10. & *p.* 372. *t.* 7. *f.* 2. Necydalis elytris puncto flavo.
Habitat in Europæ *hortis.*

cardiacæ. 13. C. thorace ſubmarginato, corpore atro, antennis pectinatis, elytris apice puncto ſanguineo. *Fn. ſuec.* 720. *
Habitat in Europæ *leonuro cardiaca.*

albicans. 14. C. thorace orbiculato, margine luteo, corpore nigro, fronte flava.
Habitat in Germania, *ſtatura c. cardiacæ, magnitudine pediculi, tibiis anterioribus anterius flavis.* Forskähl.

te-

testa-cea. 15. C. thorace flavo : macula nigra , corpore nigro , elytris pedibusque lividis. *Fn. fuec.* 714. *Scop. ent. carn.* 123. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 261. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 23.
Fn. fuec. 593. Cantharis nigra , elytris lividis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 173. *n.* 6. b. Cicindela nigra , thoracis margine flavo , &c.
Degeer inſ. 4. *p.* 71. *n.* 4. Thelephorus niger, thorace rufeſcente , &c.
Schaeff. ic. t. 52. *f.* 8.
Habitat in Europæ *hortis.*

atra. 16. C. corpore toto atro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 8.
Habitat in Europa *boreali.*

margi-nata. 23. C. nigra , thoracis elytrorumque marginibus rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 9.
Habitat in America.

bima-culata. 25. C. thorace ferrugineo : macula nigra , elytris teſtaceis : macula apicis nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 10.
Habitat in America *ſeptentrionali , nigra.*

palli-pes. 28. C. atra , elytris pallidis apice fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 167. *n.* 11.
Habitat in Germania , *ſtatura atræ.*

pallida. 29. C. atra , elytris pedibusque pallide teſtaceis.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 167. *n.* 12.
Habitat Kilonii , *parva.*

ruficol-lis. 30. C. atra , thorace abdomineque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 13.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 6.
Habitat in Anglia.

fla-

flavipes. 31. C. teſtacea, capite thoracis macula media elytrisque dimidiato-nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 259. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 14.
Habitat in Sina, *magna.*

melanocephala. 32. C. teſtacea, capite elytrorum apicibus tibiisque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 260. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 15.
Habitat in Coromandel, *magna.*

bipunctata. 33. C. thorace punctis duobus nigris, elytris teſtaceis apice nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 260. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 16.
Habitat Lipſiæ.

angulata. 34. C. teſtacea, thorace angulato ſpinoſo, elytris apice cyaneis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 17.
Habitat in oceani auſtralis inſula Amſterdam, *ſtatura & magnitudine melanuræ.*

nigra. 35. C. pubeſcens, corpore nigro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 20.
Scop. ent. carn. 131. Cantharis piloſa.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 564. *n.* 28. *Fn. ſuec.* 439. Dermeſtes (niger) oblongus piloſus niger, elytris molliuſculis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 71. *n.* 5. Anobium nigrum.
Habitat frequens in Europæ *floribus.*

pulicaria. 36. C. thorace rufo: macula nigra, elytris atris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 260. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 21.
Habitat in Germania, *atra.*

caneſcens. 37. C. thorace luteo, epigaſtrio elytrisque obſcure cinereis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 302.

Ha-

Habitat gregaria Halæ Saxonum, *in betulis, quer*
cubus, Maio & Junio conſpicua, fuſcæ affinis.

coccinea. 38. C. thorace rubro: macula nigra, corpore ni
gro, elytris ſanguineis. *Schall. Abh. der ha*
Naturf. Geſ. 1. *p.* 303.
Habitat, rarior, Hallæ Saxonum, *bipuſtulatæ af*
finis.

bicolor. 39. C. lutea, elytris dimidiato-cæruleis. *Thunb.*
nov. inſ. ſp. 4. *p.* 81.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *glaberrima, ſtatur*
& magnitudine melanuræ.

biline- 40. C. thorace flavo: macula punctisque quatuor
ata. fuſcis, elytris flavis: linea fuſca. *Thunb. nov.*
inſ. ſp. 4. *p.* 81.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magnitudine teſtaceæ*

triline- 41. C. thorace flavo: maculis duabus nigris, ely
ata. tris flavis: linea futuraque nigris. *Thunb. nov.*
inſ. ſp. 4. *p.* 82.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magnitudine teſtaceæ*

Altica. 42. C. thorace rufo, elytris violaceis immaculatis.
Thunb. nov. inſ. ſp. 4. *p.* 82.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magnitudine & ſtatu*
ra pulicariæ, glaberrima, violacea, pedibus ru
feſcentibus.

oculata. 43. C. thorace flavo: punctis duobus nigris, ely
tris corporeque cyaneis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4.
p. 83.
Habitat - - - *bipuſtulata paulo minor, capite pedi*
busque flavis, elytris interdum violaceis.

collaris. 44. C. thorace ſanguineo: macula nigra, elytris
cyaneis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 83.

Ha-

Habitat - - - ptini mollis magnitudine, nigra.

cuprea. 45. C. subtus cyanea, supra ænea. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 83.
Habitat - - - ptini mollis magnitudine, nitida, pilosa.

argentea. 46. C. thorace plano elytrisque viridibus, abdomine fericeo-argenteo. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 84.
Habitat ad Caput bonæ spei, *magnitudine & facie fuscæ, capite nigro, ano pedibusque luteis, tarsis fuscis.*

janthina. 47. C. thorace flavo, macula punctisque quatuor fuscis, elytris viridibus. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 84.
β) Cantharis antennis flavis: extremis tribus articulis fuscis.
γ) Cartharis thoracis macula fusca, posterius bifida, punctum nigrum includente.
Habitat ad Caput bonæ spei, *magnitudine & facie fuscæ, pectore oculisque nigris, capite, antennis, abdomine pedibusque flavis.*

americana. 48. C. thorace flavo: macula nigra, elytris flavis: macula apicis trientali oblonga nigra. *Forst. nov. inf. sp.* 1. *p.* 50. *n.* 50.
Habitat in Noveboraco, *fuscæ magnitudine, nigra, antennis fuscis.*

rufipes. 49. C. capite thoraceque rubris immaculatis, pedibus fulvis: posterioribus apice nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 107. *n.* 2.
Habitat Berolini, *fuscæ affinis, sed minor.*

berolinensis. 50. C. nigra, antennis basi elytrisque flavescentibus: his apice nigris, pedibus ferrugineis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 108. *n.* 10.
Habitat Berolini, *lividæ affinis, sed minor.*

ful-

fulva. 51. C. fulva, capite, elytris & antennis dimidiato-nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. p. 108. n. 11.*
Habitat Berolini, *fuscæ similis, sed quadruplo minor.*

ferrata. 18. C. flavescens, elytris striatis: fusciis tribus nigris, antennis ferratis.
Habitat in America, *antennis nigris, longitudine corporis; an hujus generis?*

tropica. 19. C. thorace lateribus rubro, elytris nigris: fascia alba, antennis pectinatis. *Mus. Lud. Ulr.* 80. * *Gron. zooph.* 515. *t.* 14. *f.* 7.
Habitat in America *australi, an hujus generis?*

fonchi. 52. C. atra, elytris fimbria lineaque longitudinali intermedia albis. *Lepechin it.* I. *p.* 264.
Habitat in Sibiriæ *foncho; an hujus tribus?*

caspica. 53. C. viridis, elytris maculis duabus apicis flavis rhombeis. *Lepechin it.* I. *t.* 16. *f.* 11.
Habitat ad mare caspium, *parva; an huc referenda?*

flaveola. 54. C. subtus flava, capite antennisque nigris, thorace ferrugineo: maculis duabus fuscis, elytris ex luteo fuscis apice flavis. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. p. 171. n. 12.*
Habitat Berolini, *biguttatæ affinis.*

violacea. 21. C. violacea, thorace teretiusculo, antennis pectinatis, femoribus anterioribus crassissimis dentatis.
Habitat in Guinea, *denmestis magnitudine, ano pedibusque ferrugineis.*

virescens. 24. C. thorace teretiusculo, corpore virescenti-fusco,

ſco, femoribus poſterioribus clavatis.
Habitat in Europa, *antennis nigris, elytris trilineatis.*

lepturoides. 55. C. lutea, thorace convexo, elytrorum apice corporeque nigris. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 81.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *melanuræ affinis, magnitudine lividæ.*

nigripes. 56. C. lutea, thorace rotundato, abdomine, pedibus elytrorumque apicibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 260. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 18.
Habitat in Europa *boreali, etiam* Calabria, *melanuræ proxime affinis, an ſatis a lepturoide diſtincta?*

melanura. 27. C. thorace rotundato, corpore luteo, elytris apice nigris. *Fn. ſuec.* 719. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 260. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 168. *n.* 19.
Raj. inſ. p. 84. *n.* 27. Cantharis ſepiarius, elytrorum apicibus nigris.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 1773. *n.* 5. Cicindela rubra, &c.
Schaeff. ic. t. 16. *f.* 14.
Habitat in Europæ *hortis.*

Hiſtrio. 82. C. nigra, thorace, antennarum baſi, abdominis ſegmentorum baſi poſteriori pedibusque luteis, thoracis macula fuſca. *Muſ. Lesk. p.* 30. *n.* 645.
Habitat in Europa.

picea. 83. C. picea, thorace poſterius utrinque puncto rubro, antennarum baſi pedibusque luteis, femoribus baſi atris. *Muſ. Lesk. p.* 30. *n.* 646.
Habitat in Europa.

chalybea. 84. C. nigro-violacea pubescens. *Mus. Lesk. p.* 30. *n.* 648.
Habitat in Europa.

tricolor. 85. C. nigra, elytris dimidio nigris, apicem versus albis, summo apice geniculisque luteis. *Mus. Lesk. p.* 30. *n.* 649.
Habitat in Europa.

** *palpis filiformibus: articulo ultimo setaceo.* Malachii.

ænea. 7. C. corpore viridi-æneo, elytris extrorsum undique rubris. *Fn. suec.* 708. * *Scop. ent. carn. n.* 126. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 261. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 1.
Degeer inf. 4. *p.* 73. *n.* 6. *t.* 2. *f.* 16. 17. Thelephorus æneus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 174. *n.* 7. Cicindela viridi-ænea, elytris extrorsum rubris.
Raj. inf. p. 77. *n.* 12.
Schaeff. monogr. 1754. *t.* 2. *f.* 10. 11.
icon. t. 18. *f.* 12. 13.
Sulz. hist. inf. t. 6. *f.* 5.
Habitat in Europæ *plantis, tentaculis duobus obtusis sanguineis basi connatis ad basin abdominis aliisque duobus ad apicem thoracis exferendis instructa, aliquando minor, elytris totis sanguineis.*

bipustulata. 8. C. æneo-viridis, elytris apice rubris. *It. oel.* 127. *Fn. suec.* 709. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 262. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 169. *n.* 2. *Scop. ent. carn. n.* 127.
Raj. inf. p. 101. *n.* 8. Cantharis vix $\frac{3}{8}$ unciæ longa.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 175. *n.* 8. Cicindela æneo-viridis, elytris apice rubris.

De-

Degeer inſ. 4. *p.* 75. *n.* 7. Thelephorus viridi-æneus nitidus.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 10. 11. *t.* 19. *f.* 14.
Habitat in Europa *frequens.*

hæmorrhoidalis. 86. C. nigra, thorace elytrorumque apicibus rubris. *Muſ. Lesk. p.* 30. *n.* 660.
Habitat in Europa.

viridis. 57. C. æneo-viridis, ore flaveſcente. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 3.
Habitat in Scania, *ſtatura & magnitudine bipuſtulatæ.*

ſanguinolenta. 58. C. nigro-ænea, thoracis margine elytrisque ſanguineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 4.
Habitat Kilonii, *ſtatura æneæ, ſed duplo minor.*

cyanea. 59. C. cyanea, thorace abdomineque rubris, *Fabr. mant.* 1. *p.* 169. *n.* 5.
Habitat in Hiſpaniæ *umbellatis, ſtatura ſanguinolentæ.*

pediculatia. 9. C. atra, elytris apice rubris. *Fn. ſuec.* 710. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 262. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 6.
Habitat in Europæ *hortis, pediculo paulo major.*

nemoralis. 60. C. nigra, thorace margine, elytrisque apice rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 262. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 7.
Habitat Kilonii *in nemoribus.*

faſciata. 10. C. thorace ſubrotundo vireſcente, elytris nigris: faſciis duabus rubris. *Fn. ſuec.* 711. * *Fabr.*

An ad primam tribum referendi Thelephori Schaefferi *bifaſciatus ic. t.* 205. *f.* 9. a. 9. b. *& bipunctatus ic. t.* 41. *f.* 15. 16.

br. ſp. inſ. 1. *p.* 262. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 8.
Raj. inſ. p. 102. *n.* 22. Cantharis valde exigua.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 177. *n.* 12. Cicindela elytris nigris : faſciis duabus rubris.
Degeer inſ. 4. *p.* 76. *n.* 9.
Schaeff. ic. t. 189. *f.* 3.
Habitat in Europæ *muſcis.*

equeſtris. 61. C. viridi-ænea, elytris rubris : faſcia viridi-ænea. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 500. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 9.
Habitat in Italia, *ſtatura & magnitudine faſciatæ.*

ochropus. 62. C. nigra, antennarum baſi tibiisque flavis. *Fabr. br. mant. inſ.* 1. *p.* 169. *n.* 10.
Habitat Halæ Saxonum, *parva nitida.*

chryſomeloides. 63. C. thorace rubro immarginato, elytris cyaneis lævibus, antennis pedibusque nigris. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 17. *n.* 30.
Habitat Lutetiis, *magnitudine pediculi majoris, ita acta ſub pectore caput & corpus contrahens & libere celerrime fugiens.*

cæruleocephala. 64. C. thorace rubro, immarginato, elytris fuſcis, capite anterius rubro, poſterius ex cæruleo nigro. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 18. *n.* 31.
Habitat circa Holmiam, *magnitudine teſtaceæ, lineali ſimilis, ſed anguſtior & minor.*

ſuecica. 65. C. thorace flavo immarginato : punctis duobus nigris, elytris flavescentibus apice nigris. *Thunb. nov. act. Upſ.* 4. *p.* 18. *n.* 32.
Habitat in Suecia, *melanuræ affinis, lividæ magnitudine, ſtatura lepturæ, an cum* 63 *&* 64 *hujus tribus?*

Her-

Herbſtii. 66. C. elytris rubris : macula nigricante. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 108. *n.* 4.
Habitat Berolini , *faſciatæ magnitudine.*

erythromelas. 67. C. nigra , thoracis margine elytrisque rubris , ſegmentis abdominis tribus margine fulvis. *Herbſt apud Fuessli arch.* 5. *p.* 108. *n.* 5.
Habitat Berolini , 3 *fere lineas longa.*

**** palpis anterioribus porrectis : articulo penultimo appendice magna ovata fiſſa aucto , ultimo arcuato acuto* , Lymexyla.

abbreviata. 68. C. nigra , thoracis linea dorſali , elytris breviſſimis fornicatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 164. *n.* 1.
Habitat in Sierra Leon Africæ , *ſpecibus hujus tribus major , elongata.*

proboſcidea. 69. C. nigra , elytris teſtaceis apice nigris , palpis hamato-irregularibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 256. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 2.
Habitat in Germaniæ *lignis.*

barbata. 70. C. fuſca , antennis tibiisque piceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 3.
Schaller Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. *p.* 322. *t.* 1. *f.* 7. Mordella (barbata) fuſca , palpis enſiformibus trilobis : lobis lateralibus latiſſimis.
Schaeff. ic. t. 279. *f.* 7. a. b.
Habitat in Germaniæ *lignis , proboſcideæ affinis , tomento aureo fugaci nitens.*

navalis. 26. C. thorace teretiuſculo , corpore luteo , elytris margine apiceque nigris. *Fn. ſuec.* 718. * *It. wgoth.* 153. *t.* 2. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 256. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 4.
Friſch. inſ. 13. *p.* 24. *t.* 20.
Schaeff. ic. t. 59. *f.* 1.

Ha-

Habitat in ligno querno, *quod deſtruit.*

saxonica. 71. C. nigro, elytris baſi, abdomine apice pedibusque flavis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 165. *n.* 5.
Habitat in Saxoniæ *ligno*, *ſtatura & magnitudine navalis.*

morio. 72. C. nigra, pedibus anterioribus flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 165. *n.* 6.
Habitat in Saxoniæ *lignis*, *ſaxonica duplo major.*

SERROPALPUS. *Antennæ* ſetaceæ.
Palpi quatuor inæquales; anteriores longiores profunde ſerrati: articulis quatuor; ultimo maximo, truncato, compreſſo apice patelliformi: poſteriores ſubclavati.
Thorax marginatus, anterius caput excipiens: angulo utrinque prominente.
Caput deflexum.
Pedes foſſorii.

ſtriatus. 1. S. corpore fuſco, elytris ſtriatis. *Hellenius nov. act. Stockh.* 1786. 4. *p.* 273. *t.* 8. *f.* 3-5.
Habitat in inſulæ Runſalæ *ædificiis ligneis vetuſtis, auctumno veſpere ad parietes conſpicuus, elatere aterrimo vix major.*

lævigatus. 2. S. corpore atro, elytris lævibus. *Hellenius act. Stockh.* 1786. 4. *p.* 280.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 656. *n.* 37. *Fn. ſuec.* 742. Elater (bupreſtoides) thorace caput recipiente, antennis pectinatis, corpore toto nigro.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 175. *n.* 55. Elater (bupreſtoides)

des) cylindricus niger immaculatus, capite retracto.
Habitat in Europa.

209. ELATER. *Antennæ* filiformes.
Palpi quatuor securiformes.
Corpus dorso impositum exsiliens mucrone pectoris e foramine abdominis resiliente.

flabellicornis. 1. El. fuscus, antennarum fasciculo flabelliformi. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 651. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 1.
Drury inf. 3. *t.* 47. *f.* 1.
Habitat in India, *inter maximos hujus generis, antennis brevibus, a tertio inde articulo ingenti ex* 8 *lamellis conflato flabello ornatis.*

fascicularis. 37. El. thorace murino, elytris pallidis fusco undatis, antennarum fasciculo flabellicorni. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 2.
Habitat in America, *æneo paulo major, murinus, antennis nigris.*

speciosus. 2. El. albus, lineis punctis maculisque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 265. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 3. Elater albus nigro maculatus.
Habitat in India, *noctiluco major.* Bruniche.

luridus. 39. El. cinereo-tomentosus, elytris substriatis, plantis fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 265. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 4.
Habitat in Coromandel, *magnus.*

oculatus. 3. El. thorace ocellis binis atris: iridibus albis, corpore nigricante. *Mus. Lud. Ulr.* 81.*
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 265. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 171. *n.*

n. 5. Elater thorace ocellis duobus atris, corpore nigro albo-maculato.

Degeer inf. 4. *p.* 159. *n.* 1. *t.* 17. *f.* 28. Elater niger, thorace maculis binis ovatis villosis aterrimis.

Petiv. gaz. t. 10. *f.* 4. Scarabæus elasticus major capite bimaculato.

Act. angl. 246. *p.* 396. *n.* 13. & 271. *p.* 842. *n.* 32.

Habitat in America *meridionali.*

lusc. 40. El. thorace ocellis binis atris, corpore nigro immaculato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 265. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 171. *n.* 6.

Habitat in America.

cæcus. 41. El. ater, thorace maculis duabus ocellaribus, elytris strigis duabus arcuatis punctoque posteriore ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 265. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 7.

Habitat in Africa.

noctilucus. 4. El. thoracis lateribus macula flava glabra. *Mus. Lud. Ulr.* 82. * *Gron. zooph.* 474. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 265. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 8.

Degeer inf. 4. *p.* 160. *n.* 2. *t.* 18. *f.* 1. Elater fuscus, thoracis lateribus macula flava glabra convexa nitida.

Brown. jam. 432. *t.* 44. *f.* 10. Elater major fuscus phosphoricus.

Sloan. jam 2. *p.* 206. *t.* 237. *f.* 1. Scarabæus medius fuscus, &c.

Mouff. inf. 112. Cocujus.

Habitat in America *meridionali, thoracis ocellis lampyridum & fulgurarum more, noctu, ut fertur, pro arbitrio lucem tantam spargens, ut lecturo sufficiat; abdomen diffractum intus lucet.*

phosphoreus. 5. El. fuscus, thorace posterius maculis duabus fla-

flavis glabris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*266. *n.*8. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 9. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 110. *n.* 1. *t.* 27. *f.* 2.

Degeer inſ. 4. *p.* 161. *n.* 3. *t.* 18. *f.* 2. Elater fuſco caſtaneus.

Habitat in America *meridionali*, *noctiluco affinis*, *at duplo minor*, *quamvis europæis ſpeciebus multo major*; *thoracis maculis noctu pariter lucentibus.*

ignitus. 42. El. fuſcus, thorace nigro: margine flavo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 10.

Habitat in Cayenna, *phoſphorea minor.*

fuſcipes. 43. El. ater, antennis pedibusque fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 266. *n.*9. *mant. inſ.* 1. *p.*172. *n.*11. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 110. *n.* 3. *t.*27. *f.* 4.

β) Elater elytris crenato-ſtriatis, *Muſ. Lesk. p.*31. *n.* 684.

Habitat in India, β) *in* Europa.

rubiginoſus. 44. El. nigricans griſeo maculatus, thoracis limbo elytrorumque macula magna pallidis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 12.

Habitat in Sierra Leon Africæ, *magnus.*

porcatus. 6. El. viridi-æneus, elytris ſulcatis: ſulcis villoſo-albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 266. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 15.

Syſt. nat. XII. 2. *p.* 652. *n.* 6. Elater fuſcus elytris nigris porcatis: ſulcis elevatis glabris.

Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 7.

Drury inſ. 3. *t.* 47. *f.* 6.

Habitat in America *meridionali*, *europæis ſpeciebus major*, *pectoris ſutura atra nitida.*

ligneus. 7. El. ferrugineus, elytris mucronatis, antennis nigris. *Amœn. acad.* 6. *p.* 395. *n.* 24. *Fabr. ſp. inſ.*

inf. 1. *p.* 266. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 1
Gron. zooph. 477 ? Elater teſtaceus, thorace ant
truncato, elytris poſtice acuminatis.
Habitat in America *meridionali.*

ſulcatus. 45. El. villoſo-albidus, elytris ſtriis tribus ele
tis glabris atris. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 266. *n.* 1
mant. inf. 1. *p.* 172. *n.* 16.
Habitat in America *meridionali.*

virens. 46. El. villoſo-viridis, antennis ſerratis nigr
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 172. *n.* 17.
Habitat in inſulis Americæ *oppoſitis, ſtatura porc*

ſtriatus. 8. El. niger opacus, elytris ſtriatis: ſtriis ſubp
beſcentibus, ano villoſo.
Gron. zooph. 475. Elater virescens, elytris atr
ſulcis albis ſtriatis, ano barbato.
Habitat Surinami, *magnitudine fere oculati.*

bipuſtulatus. 9. El. niger nitidus, elytris puncto baſeos nigr
Fabr. ſp. inf. 1. *p.* 243. *n.* 47. *mant. inf.*
p. 175. *n.* 59.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 136. *n.* 15. Elater nige
elytrorum baſi maculis rubris.
Herbſt apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 27. *f.* 8.
Habitat in Germaniæ *graminoſis, mediæ magnit*
dinis.

brunneus. 10. El. thorace rufo medio nigro, elytris corpor
que ferrugineis. *Fn. ſuec.* 721. *Fabr. ſp. inf.*
p. 271. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 38.
Herbſt apud Fuessli arch. inf. 5. *p.* 112. *n.* 17. *t.* 2
f. 6.
Habitat in Europæ *hortis.*

ſyriacus. 11. El. thorace rufo, elytris faſcia duplici alba
corpore nigro. *Muſ. Lud. Ulr.* 83. * *Fabr.*
inf.

inf. 1. *p.* 269. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.*26.
Habitat in Oriente. Haffelquiſt.

crucia-tus. 12. El. thorace nigro lateribus ferrugineo, coleoptris flavis: cruce margineque nigris. *Fn. ſuec.* 722.* *Gadd ſat.* 27. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 268. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 25.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 133. *n.* 6.
Degeer inf. 4. *p.* 149. *n.* 9.
Sulz. hiſt. inf. t. 6. *f.* 10.
Habitat in Europæ *graminoſis.*

linea-ris. 13. El. thorace rufo medio fuſco, elytris teſtaceis linearibus. *Fn. ſuec.* 723. * *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 269. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 29.
Fn. ſuec. 1. *n.* 582. Elater thorace rubro, elytris griſeis.
Uddm. diſſ. 46. Elater canthariformis niger, ano rufo, elytris ex rufo pallide fuſcis ſtriatis.
Degeer inf. 4. *p.* 154. *n.* 17.
Pontopp. atl. dan t. 16.
Habitat in Europa *boreali.*

ruficol-lis. 14. El. niger, thorace poſterius rubro nitido. *Fn. ſuec.* 724. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 270. *n.* 33. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 37.
Fn. ſuec. 576. Elater niger, thorace rubro.
Scop. ent. carn. 290. Elater gramineus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 132. *n.* 5.
Degeer inf. 4. *p.* 153. *n.* 16.
Raj. inf. p. 92. *n.* 8.
Schaeff. ic. t. 31. *f.* 3.
Habitat in Europæ *graminoſis.*

linea-tus. 15. El. niger, elytris obſcure lividis fuſco ſublineatus.
Habitat in Germania, *mediæ magnitudinis, antennis ſubferrugineis.*

me-

mesomelas. 16. El. thorace margineque elytrorum ferrugineis, corpore elytrisque nigris. *Fn. suec.* 725. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 270. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 137. *n.* 3.
Habitat in Europa *boreali*, *lineato paulo major*, *larva hexapus filiformis duriuscula*, *caudæ scuto corneo lateribus dentato*, *subtus tuberculo conico pediformi tubuloso*, *in ligno putrescente.*

thoracicus. 47. El. niger, thorace toto rufo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 270. *n.* 32. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 36.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 132. *n.* 5. Elater niger, thorace rufo.
Habitat prope Hemly Anglorum, *ruficolli affinis.*

aterrimus. 17. El. thorace atro nitido, elytris striatis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 267. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 18.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 653. *n.* 17. *Fn. suec.* 726. * *Uddm. diss.* 45. Elater ater, thorace opaco punctato, elytris striatis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 136. *n.* 13. Elater totus niger nitidus.
Habitat in Europa *boreali.*

castaneus. 18. El. thorace testaceo pubescente, elytris flavis apice nigris, corpore atro. *Fn. suec.* 727. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 269. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 27.
Degeer inf. 4. *p.* 153. *n.* 15. Elater flavo-pectinicornis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 132. *n.* 4.
Raj. inf. p. 192. *n.* 6.
List. lequ. 387.
Schaeff. ic. t. 11. *f.* 9. & *t.* 31. *f.* 4.
Habitat in Europæ *campis.*

virescens. 48. El. thorace viridi: sulco medio, elytris flavis mucronatis: apice macula virescenti-nigra ob-
long-

longa. *Schranck Schr. der berl. Naturf. Fr.* 2. *p.* 317.
Scop. ent. carn. n. 286. *Schranck inf. auſtr. n.* 237. Elater caſtaneus.
Poda muſ. p. 41. *n.* 1. Elater pectinicornis.
Habitat in Auſtria & Carniola, *viridi-æneus.*

livens. 19. El. niger, thorace glaberrimo rubro, elytris teſtaceis. *Fn. ſuec.* 728. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 269. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 28.
Schaeff. ic. t. 11. *f.* 8.
Habitat in Europa *boreali.*

ferrugineus. 20. El. thorace elytrisque ferrugineis, corpore thoracisque margine poſteriore nigris. *Fn. ſuec.* 729. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 266. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 172. *n.* 14.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 130. *n.* 1. *t.* 2. *f.* 4. Elater thorace elytrisque rubris.
Schaeff. ic. t. 19. *f.* 1.
Habitat in Europa.

hæmatodes. 48. El. niger, thorace pubeſcente fulvo, elytris ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 271. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 39.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 9. Elater ſanguineus.
ε) Elater thorace nigro. *Schaeff. ic. t.* 2. *f.* 6.
Habitat in Germania & Calabria.

ſanguineus. 21. El. ater, elytris ſanguineis. *Fn. ſuec.* 731. *Scop. ent. carn.* 287. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 271. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 40.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 131. *n.* 2. *Degeer inſ.* 4. *p.* 151. *n.* 13. Elater niger, elytris rubris.
Schaeff. el. t. 60. *f.* 2.
ic. t. 31. *f.* 7.
Bergſt. nomencl. t. 10. *f.* 16.
Habitat in Europæ *graminoſis, elytrorum ſumme apice nigro.*

bal-

balteatus. 22. El. niger, elytris anterius dimidiato-rufis. *Fn. suec.* 732. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 271. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 41.
Degeer inf. 4. *p.* 152. *n.* 14.
Raj. inf. p. 78. *n.* 23.
Schaeff. ic. t. 77. *f.* 2.
Habitat in Europæ *arvis.*

elongatus. 49. El. ater, elytris teſtaceis apice nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 42.
Habitat in Auſtria, *balteato proxime affinis.*

melanocephalus. 50. El. ſanguineus, capite, thoracis linea dorſali elytrorumque apice nigris. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 272. *n.* 38. *mant. inf.* 2. *p.* 174. *n.* 43. *Thunberg nov. inf. ſp.* 3.
Habitat in Coromandel *&* *ad* Caput bonæ ſpei. *balteato paulo minor, ceterum ejuſdem ſtaturæ.*

marginatus. 23. El. thorace ſubfuſco, elytris teſtaceis: margine undique nigro. *Fn. ſuec.* 733. * *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 270. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 34. *Act. nidroſ.* 3. *p.* 16. *t.* 6. *f.* 6.
Habitat in Europa *boreali.*

ſputator. 24. El. thorace fuſco nitido, elytris teſtaceis, corpore nigro. *Fn. ſuec.* 734. * *Scop. ent. carn.* 285. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 272. *n.* 39. *mant. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 44.
Degeer inf. 4. *p.* 151. *n.* 11. Elater fuſcus flavipes.
Schaeff. ic. t. 19. *f.* 11.
Habitat in Europa *boreali.*

piloſus. 51. El. fuſcus cinereo-ſubvilloſus, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 45. *Lesk. it.* 1. *p.* 11. *n.* 1. *t.* A. *f.* 1.
Habitat in Luſatiæ *montibus, parvus.*

pal-

pallipes. 52. El. fuscus, elytris striatis, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 172. *n.* 46.
Habitat Tranquebariæ, *parvus.*

fuecicus. 53. El. niger, elytris lineatis fuscis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 272. *n.* 40. *mant. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 47.
Habitat in Sueciæ *graminosis.*

minutus. 34. El. thorace atro nitido, elytris nigris. *Fn. suec.* 744. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 272. *n.* 41. *mant. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 48.
Habitat in Europæ *plantis, parvus, niger, immaculatus.*

limbatus. 54. El. thorace atro nitido, elytris testaceis limbo nigro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 272. *n.* 42. *mant. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 49. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 64.
Habitat Kilonii *& ad* Caput bonæ spei.

advena. 55. El. ater, elytris striatis pedibusque obscure cinereis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 50.
Habitat prope Ellertam Hispaniæ, *parvus.*

marginellus. 56. El. thorace nigro: margine ferrugineo, elytris testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 372. *n.* 43. *mant. inf.* 1. *p.* 174. *n.* 51.
Habitat in Germania, *limbato simillimus, at paulo major.*

obscurus. 25. El. piceus thorace elytrisque obscure nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 269. *n.* 26. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 30.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 655. *n.* 25. *Fn. suec.* 735. Elater thorace fusco obscuro, elytris obscure testaceis,
Habitat frequens in Europæ *borealis plantis.*

flavipes. 57. El. thorace obscure nigro, elytris striatis fuscis, pe-

pedibus teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 31.
Habitat in inſulis Americæ *oppoſitis.*

filiformis. 58. El. ex cinereo fuſcus immaculatus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p* 173. *n.* 32.
Habitat in Italia, *filiformis, obſcuro duplo minor.*

triſtis. 26. El. thorace atro nitido, elytris baſi margineque exteriori lividis. *Fn. ſuec.* 736. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 270. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 33.
Schaeff. ic. t. 194. *f.* 1.
Habitat in Europæ *ligno putreſcente.*

faſciatus. 27. El. thorace nigro pallidoque vario, elytris nigricantibus: faſcia alba undulata. *Fn. ſuec.* 737. *Scop. ent. carn.* 281. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 267. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 21.
Habitat in Europæ *hortis.*

murinus. 28. El. thorace obſcure cinereo, elytris cinereo nebuloſis, plantis rufis. *Fn. ſuec.* 738. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 267. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 19.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 135. *n.* 10. Elater niger, elytris villoſo-murinis.
Degeer inſ. 4. *p.* 150. *n.* 10. Elater rufipes.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 6.
Habitat in Europa.

teſſellatus. 29. El. thorace obſcure æneo, elytris æneis: maculis pallidioribus confertis, unguibus rubris. *Fn. ſuec.* 739. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 267. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 20.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 135. *n.* 9. Elater niger villoſo-undatus.
Degeer inſ. 4. *p.* 148. *n.* 7. Elater rufo-unguiculatus.

Scop.

Scop. ent. carn. 282. Elater thoracicus.
Gadd fat. 80. Elater niger, pilis minimis flavo-æneis junctim intermixtis.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 7.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *p.* 111. *n.* 7. *t.* 22. *f.* 5.
Habitat in Europæ *hortis, scutello pallido.*

germanus. 30. El. thorace elytrisque atro-cæruleis, corpore toto pedibusque nigris. *Fn. suec.* 730. *
Scop. ent. carn. 279. *Schranck inf. austr. p.* 183. *n.* 340? Elater nitens.
Sulz. hist. inf. t. 6. *f.* 8. Elater latus.
Habitat in Europa, *an mera ænei varietas?*

æneus. 31. El. thorace elytrisque æneis, antennis nigris simplicibus. *Fn. suec.* 740. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 267. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 22.
Fn. suec. 578. Elater viridi-æneus, pedibus fulvis.
Degeer inf. 4. *p.* 149. *n.* 8. Elater æneus rufipes.
Act. Nidrof. 3. *t.* 4. *f.* 6.
ε) Elater fuscus latior. *Mus. Lesk. p.* 31, *n.* 681.
Habitat in Europæ *memoribus.*

pectinicornis. 32. El. thorace elytrisque æneis, antennis maris pectinatis. *Fn. suec.* 741. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 268. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 173. *n.* 23. *Scop. ent. carn.* 278.
Fn. suec. 575. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 133. *n.* 7. Elater fusco-æneus.
Degeer inf. 4. *p.* 145. *n.* 2. *t.* 5. *f.* 3. Elater æneo-pectinicornis.
Raj. inf. p. 92. *n.* 7.
List. angl. p. 387. *n.* 19.
Poda inf. t. 1. *f.* 4.
Sulz. hist. inf. t. 5. *f.* 36.
Schaeff. el. t. 11. *f.* 1. & *t.* 60. *f.* 3. *ic. t.* 2. *f.* 4.

Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 13. *f.* 11.
Habitat in Europæ *nemoribus.*

cupreus. 59. El. cupreus, elytris dimidiato-flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 268. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 173. *n.* 24.
Schaeff. ic. 1. *t.* 38. *f.* 2.
Habitat in Anglia, *antennis nigris pectinatis, tarſis ſimplicibus.*

niger. 33. El. thorace lævi, elytris pedibusque corporeque nigris. *Fn. ſuec.* 743. *
Fn. ſuec. 577. Elater totus nigro-fuſcus.
Liſt. mut. t. 17. *f.* 14.
Raj. inſ. p. 92. *n.* 1. 2. 3.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 134. *n.* 8.
Schaeff. ic. t. 174. *f.* 4.
β) Elater nigricans. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 33.
Habitat in Europa, β) *dimidio minor.*

niditulus. 60. El. ater, elytris ſtriatis: maculis duabus, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inſ. p.* 174. *n.* 52.
Habitat in Cayenna, *pulchello triplo minor.*

pulchellus. 35. El. capite thoraceque atris, elytris nigris maculis flavicantibus, pedibus flavis. *Fn. ſuec.* 745. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 272. *n.* 44. *mant. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 53.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. *p.* 112. *n.* 22. *t.* 27. *f.* 7. a.
Habitat in Europa *boreali.*

flavuncutatus. 61. El. lævis ater, elytris punctis tribus albis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 3. *p.* 65. *f.* 75. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 54.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *minimus, nitidus.*

te-

tetrasti-chon. 36. El. niger luteo maculatus, elytris maculis confluentibus, abdomine quadrifariam punctato.
Habitat in Africa, *mediæ magnitudinis.*

dermestoides. 38. El. subvillosus cinereus, elytris striatis, capite retracto. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 175. *n.* 56. *Syst. nat.* XII. 2. *p.* 656. *n.* 28. Elater subpubescens subfuscus, antennis subclavatis.
Habitat in Suecia, *dermestis facie, parvus.*

notatus. 62. El. thorace rufo nigro bimaculato, elytris basi rufis, apice nigris: maculis duabus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 273. *n.* 45. *mant. inf.* 1. *p.* 175. *n.* 57.
Habitat in Coromandel, *parvus, statura pulchelli.*

festivus. 63. El. thorace ferrugineo, elytris atris: fasciis duabus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 273. *n.* 46. *mant. inf.* 1. *p.* 175. *n.* 58. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 64. *f.* 74.
Habitat in Africa, *magnitudine balteati.*

deustus. 64. El. testaceus, linea thoracis elytrorumque posterius ramosa nigra. *Thunb. nov. inf. spec.* 3. *p.* 64.
Habitat in Zeylona, *melanocephalo duplo minor, tenuissime pubescens.*

clavicornis. 65. El. viridis, antennis clavatis. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 65.
Habitat in India, *pectinicorni major, glaberrimus, nitens, an hujus generis?*

ustulatus. 66. El. niger, elytris testaceis posterius fuscescentibus, antennis pedibusque castaneis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 303.
Schaeff. ic. t. 199. *f.* 8.
Habitat - - - - *magnitudine castanei, facie balteati.*

gigan-teus. 67. El. depreſſus, elytris viridi-æneis: macula flava, pectore abdomineque flavis. *Schall. Abhandl. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 304. *t.* 1. *f.* 5.
Habitat in America *buperſtis facie.*

indicus. 68. El. niger, thorace convexo punctato: margine fulvo, medio ſinuato, elytris atris punctato-ſtriatis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 110. *n.* 2. *t.* 27. *f.* 3.
Habitat in America, *phoſphoreo minor, & angu-ſtior.*

carbo-narius. 69. El. ater atro-farinoſus: punctis minutiſſimis albis interjectis, antennis ſerratis. *Schranck iter auſtr. p.* 184. *n.* 343.
Herb. Beſch. der berl. Naturf. Fr. 4. *t.* 7. *f.* 1. Elater punctatus.
Habitat in Germania.

undu-latus. 70. El. niger flavo undulatus pubeſcenti-nitens. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 111. *n.* 8. *Schaeff. ic. t.* 4. *f.* 7.
Habitat in Germania.

cærule-us. 71. El. chalybeus, antennis nigris ſimplicibus, pedibus ex atro fuſcis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 111. *n.* 10.
Habitat Berolini, *æneo proxime affinis.*

ſangui-nolen-tus. 72. El. ater elytris ſanguineis: margine interiori macula magna ovata atra communi. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 69. §. 16. *t.* 3. *f.* 15. *inſ. auſtr. p.* 184. *n.* 341. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 112. *n.* 24. *t.* 27. *f.* 9.
Habitat in Germania, *an mera ſanguinei varietas?*

purpu-reus. 73. El. niger, thorace atro: vellere raro purpureo; elytris purpureis: lineis duabus elevatis. *Schr-*

Schranck inſ. auſtr. p. 187. *n.* 350.
Herbſt apud Fuesſli arch. inſ. 5. *p.* 113. *n.* 25. *t.* 27. *f.* 10.
Habitat in Auſtria ; *ſanguineo affinis , at magis depreſſus.*

quercinus. 74. El. fuſcus , capite thoraceque granulatis : villis flavis undulatis , elytris faſcia flavo-villoſa.
Herbſt apud Fuesſli arch. inſ. 5. *p.* 113. *n.* 26. *t.* 27. *f.* 11.
Habitat in Ungaria & Germania , *in quercu.*

erythropus. 75. El. niger , elytris flavicanti-villoſis , punctato-ſtriatis , pedibus antennarumque articulis margine ſpadiceis.
Herbſt apud Fuesſli arch. inſ. 5. *p.* 113. *n.* 28. *t.* 27. *f.* 12.
Habitat in Berolini.

hirtus. 76. El. nitenti-niger pubeſcens , thorace punctato, elytris ſtriatis. *Herbſt apud Fuesſli arch. inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 30.
Habitat Berolini , *magnitudine erythropodis , at paulo latior.*

vulgaris. 77. El. niger , elytris fuſcis punctato-ſtriatis : futura nigra , pedibus pallidis. *Herbſt apud Fuesſli arch. inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 32.
Habitat Berolini.

griſeus. 78. El. obſcure griſeus , thorace convexo , elytris punctato-ſtriatis , ſubtus nigris , antennis pedibusque fuſcis. *Herbſt apud Fuesſli arch. inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 34.
Habitat Berolini.

cinereus. 79. El. niger pubeſcenti-canus , thorace convexo , tarſis ferrugineis. *Herbſt apud Fuesſli arch. inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 35.

Hu-

Habitat Berolini, *magnitudine & ſtatura griſei.*

equiſeti. 80. El. niger, thorace convexo, elytris ſtriatis pedibus flaveſcentibus. *Herbſt apud Fuesslii arch. inſ.* 5. *p.* 114. *n.* 36.
Habitat Berolini, 3 *lineas longus, ſtatura cinerei.*

pulverulentus. 81. El. niger vireſcenti-aureo irroratus, elytris lineatis, tibiis intus criſpo-piloſis. *Herbſt apud Fuesslii arch. inſ.* 7. *p.* 172. *n.* 38. *t.* 48. *f.* 1.
Habitat in America, *inter maximos hujus generis.*

ſocialis. 82. El. fuſcus, antennis elytrorumque margine bus ferrugineis. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 100 *n.* 9.
Habitat in Luſitania, *magnitudine pectinicornis.*

ferraticornis. 83. El. fuſcus, abdomine ſupra pedibusque fulvis. *Scop. ent. carn. n.* 280.
Habitat in Carniola.

montanus. 84. El. villoſulus niger nitens, antennis baſi tibiisque fulvis. *Scop. ent. carn. n.* 283.
Fuesslii Verz. ſchw. Inſ. p. 17. *n.* 334.
Habitat in Carniolæ & Helvetiæ *montibus.*

degener. 85. El. niger aureo punctatus variegatus, thorace poſterius dentato. *Scop. ent. carn. n.* 292.
Habitat in Carniola.

ſubfuſcus. 86. El. niger, elytris fuſcis, abdomine rubro
Mull. zool. dan. prodr. p. 59. *n.* 538.
Mull. Fn. Fridrichsd. p. 17. *n.* 169.
Habitat in Dania.

ſeptentrionalis. 87. El. ex purpureo æneus griſeo-villoſus, elytris ſtriato-punctatis nebulosis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 61. *n.* 550.

Fig.

Fn. Fridrichsd. p. 17. *n.* 170.
Habitat in Seelandia Daniæ.

sexmaculatus. 88. El. niger grifeo-villofus, thoracis margine elytrisque teftaceis: maculis fex fubfufcis glabris.
Mull. Fn. Fridrichsd. p. 17. *n.* 171. *zool. dan. prodr. p.* 60. *n.* 544.
Habitat in Dania.

obtufus. 89. El. corpore obtufo fubtus nigro, thorace nigro, elytris fufcis grifeo-villofis, antennis ruiis.
Degeer inf. 4 *p.* 147. *n.* 5. *t.* 5. *f.* 19.
Mull. Fn. Fridrichsd. p. 17. *n.* 172. *zool. dan. prodr. p.* 60. *n.* 540. Elater badius.
Habitat in Europa *boreali.*

pullus. 90. El. niger nitidus pubefcens, elytris punctatis, pedibus brunneis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 59 *n.* 537.
Habitat in Dania.

chrysomelinus. 91. El. niger, thorace rubro fulcato, elytris tarfisque flavis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 60. *n.* 539.
Habitat in Dania.

lugubris. 92. El. fupra ater, opacus, fubtus niger. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 60. *n.* 545.
Habitat in Dania.

Mulleri. 93. El. rufus pubefcens, pedibus luteis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 61. *n.* 551.
Habitat in Dania.

tuberculatus. 94. El. niger opacus, thorace bituberculato, elytris lævifiime ftriatis, punctis ferrugineis. *Pontopp. hift. nat. Dan. p.* 208. *n.* 13. *t.* 16.
Habitat in Dania, *magnitudine pectinicornis.*

gra-

gracilis. 95. El. teſtaceus, capite thoraceque linea longitudinali, macula laterali atra, elytris lævissimis margine atro. *Gron. muſ.* 1. *p.* 153. *n.* 478.
Habitat in America.

guineenſis. 96. El. viridi-æneus, thorace ſubpubeſcente, antennis nigris, elytris ſtriatis. *Gron. muſ.* 2. *p.* 153. *n.* 476.
Habitat in Guinea.

fimbriatus. 97. El. niger, thoracis margine rubro, elytris futuram lineis duabus longitudinalibus flavis interruptis. *Lepechin it.* I. *p.* 311. *t.* 16. *f.* 12.
Habitat in deſerto Sibiriæ Uralenſi.

auratus. 98. El. viridi-aureus, pedibus nigris. *Drury inſ.* 2. *p.* 65. *t.* 35. *f.* 3.
Habitat in Sina.

hiſtrio. 99. El. niger, elytris flavis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 131. *n.* 3. Elater nigro-flavus.
Habitat in Gallia.

vittatus. 100. El. niger, elytris fuſcis: faſcia longitudinali fulva.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 135. *n.* 11. Elater bicolor.
Raj. inſ. p. 78. *n.* 13.
Habitat in Gallia.

fuſcatus. 101. El. niger, elytris fuſcis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 136. *n.* 14. Elater bicolor.
Habitat in Gallia.

bicolor. 102. El. niger, pedibus rufis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 136. *n.* 14. Elater rufipes.
Habitat in Gallia.

me-

melano-phthal-mos. 103. El. rufus, oculis nigris. *Degeer inſ.* 4. *p.* 144 *n.* 1. *t.* 5. *f.* 18.
Habitat in Suecia, *pollicem longus.*

major. 104. El. nigro-fuſcus nitidus, pedibus fuſco-caſtaneis, abdomine ſupra rubente. *Degeer inſ.* 4. *p.* 146. *n.* 3.
Habitat in Europa, *magnus.*

minor. 105. El. elongatus capite thoraceque nigris, elytris antennis pedibusque fuſcis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 147. *n.* 4.
Habitat in Europa, *inter minores.*

inæqualis. 106. El. niger: maculis villoſis griſeis, elytris ſcabris, thorace cavitatibus impreſſis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 148. *n.* 6.
Habitat in Europæ *arboribus*, *magnus.*

undatus. 107. El. griſeo-marinus villoſus, elytris faſciis tribus undulatis, tranſverſis nigris. *Degeer inſ.* 4. *p.* 155. *n.* 18. *t.* 5. *f.* 26.
Habitat in Europa, 7 *lineas longus.*

maculoſus. 108. El. capite nigro, thorace rufo: maculis tribus oblongis nigris, elytris fuſceſcentibus. *Degeer inſ.* 4. *p.* 158. *n.* 19.
Habitat in Europa, *minor.*

nitidus. 109. El. nigro-viridi-æneus nitidus, pedibus nigris. *Degeer inſ.* 4. *p.* 159. *n.* 21.
Habitat in Europa, *puſillus.*

piceus. 110. El. totus ater nitidus, elytris læviſſimis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 162. *n.* 4. *t.* 18. *f.* 3.
Habitat in Penſylvania, *pollicem longus.*

lividus. 111. El. pallide fuſco-rufeſcens antennis rufis, pe-

pedibus flavo-teſtaceis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 162. *n.* 5. *t.* 18. *f.* 4.
Habitat in Penſylvania, *dimidium pollicem longus.*

ochropus. 112. El. nigro-fuſcus, pedibus antennisque flavo-teſtaceis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 163. *n.* 6. *t.* 18. *f.* 5.
Habitat Surinami, 4½ *lineas longus.*

maculatus. 113. El. obſcure teſtaceus, thorace anterius nigro, elytris maculis binis irregularibus nigris. *Degeer inſ.* 4. *p.* 163. *n.* 7. *t.* 18. *f.* 6.
Habitat Surinami, 3 *modo lineas longus.*

ſegetis. 114. El. niger, antennis tarſisque fuſcis, elytris lineis longitudinalibus nigris fuſcisque. *Bjerkander act. Holm.* 1779. 4. *n.* 4. *p.* 254. *t.* 10. *f.* 1-3.
Habitat in Sueciæ *ſegetis radicibus, agros haud devaſtante, præſertim ſiccos, tardam ſubeunte metamorphoſin.*

dubius. 115. El. viridi-æneus, thorace pedibusque nigris. *Mayer Abh. bohm. Geſ.* 4. *p.* 183.
Habitat in Bohemiæ *pratis, graniyzizæ magnitudine, an propria ſpecies?*

punctatus. 116. El. elongatus fuſcus, thoraceque punctato elytris crenato-ſtriatis, ore pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 31. *n.* 671.
Habitat in Europa.

dichrous. 117. El. niger, thorace linea longitudinali, elytris baſi fulcatis apicem verſus complanatis, ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 31. *n.* 673.
Habitat in Europa.

pubeſcens. 118. El. piceus pubeſcens, elytris ſtriatis, ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 31. *n.* 674.
Habitat in Europa.

villo-sus. 119. El. fuscus cinereo-villosus, elytris lævissime striatis, antennis pedibusque rufescentibus. *Mus. Lesk. p.* 31. *n.* 682.
Habitat in Europa.

crena-tus. 120. El. niger, elytris crenato-striatis punctatisque, pedibus testaceis. *Mus. Lesk. p.* 31. *n.* 683.
Habitat in Europa.

ambi-guus. 121. El. niger, elytris rufo-testaceis striatis, plantis testaceis. *Mus. Lesk. p.* 32. *n.* 688.
Habitat - - -

linea-tus. 122. El. niger, thoracis linea longitudinali, elytris crenato-striatis. *Mus. Lesk. p.* 32. *n.* 689.
Habitat in Europa.

longi-cornis. 123. El. niger, elytris obsolete striatis, antennis longis. *Mus. Lek. p.* 32. *n.* 690.
Habitat in Europa.

concolor. 124. El. fuscus, thorace punctato, elytris leviſſime striatis, antennis pedibusque rufo-fuscis. *Mus. Lesk. p.* 32. *n.* 691.
Habitat in Europa.

varia-bilis. 125. El. fuscus flavo-villosus, pedibus rufis, elytris leviſſime striatis: maculis fuscis incerta directione lucis inconspicuis. *Mus. Lesk. p.* 32. *n.* 693.
Habitat in Europa.

rubigi-neus. 126. El. ferrugineus, thorace fusco punctato, elytris crenato-striatis. *Mus. Lesk. p.* 32. *n.* 694.
Habitat in Europa.

villo-sus. 127. El. fusco-ferrugineus griseo-villosus, thorace pe-

pectoreque fuscis, elytris leviſſime ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 695.
Habitat in Europa.

tricolor. 128. El. ferrugineis, capite thoraceque fuſco, thoracis marginibus externis, elytris punctato-ſtriatis, antennis pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 696.
Habitat in Europa.

hæmopterus. 129. El. niger, elytris ſanguineis: ſuturæ macula communi oblonga picea. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 697.
Habitat in Europa.

craſſipes. 130. El. niger, elytris leviſſime ſtriatis, femoribus craſſis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 699.
Habitat in Europa.

acupunctatus. 131. El. teſtaceus, thoracis dorſo fuſceſcente, elytris ſtriatis: ſtriis punctis diſtinctis impreſſis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 701.

gibbus. 132. El. fuſcus griſeo-villoſus, elytris leviſſime ſtriatis thoraceque gibbis, antennis pedibusque fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 698.
Habitat in Europa.

pubes. 133. El. ater pubeſcens, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 702. 703.
Habitat in Europa.

cinereaſcens. 134. El. teſtaceus cinereo-villoſus, thorace fuſceſcente, pedibus rufis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 704.
Habitat in Europa.

bicolor. 135. El. fuſco-ferrugineus, capite thoraceque fuſcis, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 705.
Habitat in Europa.

quadri-fulcus. 136. El. niger, elytris obſolete ſtriatis, baſi ſulcis quatuor impreſſis, antennis longis tibiis plantisque anticis fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 706.
Habitat in Europa.

ſtrigo-ſus. 137. El. teſtaceo-fuſcus, elytris ſtriatis, pedibus teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 708.
β) Elater elytris fuſcoſcentibus verſus apicem, elytris totis teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 32. *n.* 707.
Habitat in Europa.

futura-lis. 138. El. fuſcus, thoracis margine ferrugineo, elytris teſtaceis: ſutura fuſca. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 711.
Habitat in Europa.

denta-tus. 139. El. thorace atro: macula utrinque dentibusque rubris, elytris teſtaceis: marginibus externis nigris. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 713.
Habitat in Europa.

capuci-nus. 140. El. niger, elytris pedibus anticis tibiisque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 718.
β) Elater elytris apice fuſcoſcentibus pedibus teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 714.
Habitat in Europa.

gibbo-ſus. 141. El. teſtaceus, thorace gibboſo obſcuro, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 720.
Habitat in Europa.

forici-nus. 142. El. murinus, thorace gibbo, elytris teſtaceis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 721.
Habitat in Europa.

ruſipes. 143. El. niger, elytris ſtriatis, tibiis ruſis. *Muſ. Lesk. p.* 33. *n.* 723. β)

β) Elater elytris tibiisque rufescentibus. *Mus. Lesk. p.* 33. *n.* 722.
Habitat in Europa.

funereus. 144. El. testaceus, elytris striatis, capite fusco. *Mus. Lesk. p.* 33. *n.* 724.
Habitat in Europa.

chalybeus. 145. El. nigro-æneus nitidus, femorum anticorum basi tibiisque rufis. *Mus. Lesk. p.* 33. *n.* 725.
Habitat in Europa.

obscurus. 146. El. ferrugineus, capite thoraceque fuscis; hoc posterius, elytris pedibusque testaceis. *Mus. Lesk. p.* 33. *n.* 726.
Habitat in Europa.

fuliginosus. 147. El. piceus subpubescens, antennis, pedibus elytrisque testaceis: his margine fuscis. *Mus. Lesk. p.* 33. *n.* 728.
Habitat in Europa.

pusillus. 148. El. brunneus, antennarum articulis tribus ultimis lamellatis, elytris leviſſime striatis pubescentibus. *Mus. Lesk. p.* 33. *n.* 730.
Habitat in Europa, *statura dermestoidis, magnitudine pediculi.*

Limbellus. 149. El. thorace sordide flavo: disco fusco, elytris striatis nigro-fuscis: margine omni flavescente. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. 3. *n.* 3. 23.
Habitat ad Caput bonæ spei, *inter minores.*

210. CICINDELA. *Antennæ* setaceæ.
Palpi sex filiformes : posteriores pilosi.
Mandibula prominens, multidentata.
Oculi prominuli.
Thorax rotundato-marginatus.

** labio tridentato.*

longicollis. 15. C. cyanea, thorace elongato cylindrico, femoribus ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 1.
Habitat in Siam, *magna, elongata.*

grossa. 16. C. nigra, elytris acuminatis : maculis tribus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 282. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 2.
Habitat in Coromandel, *maxima.*

cyanea. 17. C. cyanea nitida, ore testacea. *Fabr. man. inf.* 1. *p.* 285. *n.* 3.
Habitat in India, *subtus nitidior, antennis fuscis.*

bicolor. 18. C. viridis nitida, elytris obscure cyaneis immaculatis, abdominis margine testaceo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 283. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 4.
Habitat in Italia, *magnitudine & statura campestris.*

campestris. 1. C. viridis, elytris punctis quinque albis. *Fn. suec.* 746. *
Scop. ent. carn. 181. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 283. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 5. *De-*

Cicindelæ *in locis petrosis, aridis, præsertim arenosis, habitant, insectorum alarum, larvarum quoque, etiam hirsutarum tigrides; larva mollis, alba, longa, hexapus, in foraminibus cylindricis sub terra latet, famelica prædem, insectis prætereuntibus inhians, mandibula serripata arripiens, & in foveam trahens, in qua etiam declaratur.*

Degeer inſ. 4. *p.* 113. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 1. Cicindela viridis nitida.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 153. *n.* 27. Bupreſtis inauratus ſupra viridis, &c.
Mouff. inſ. 145. *f. inſim.* Cantharis quarta.
Jonſt. inſ. t. 15. Cantharis Mouffeti minor quarta.
Liſt. ſaq. 386. *mut. t.* 17. *f.* 12. Scarabæus viridis, &c.
Sulz. hiſt. inſ. t. 5. *f.* 37.
Schaeff. ic. t. 34. *f.* 8. 9. & *t.* 228. *f.* 3.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 15. *n.* 8-11. *t.* 2. *f.* 8-11.
Habitat in Europæ *campis arenoſis.*

hybrida. 2. C. ſubpurpuraſcens, elytris faſcia lunulisque duabus albis. *Fn. ſuec.* 747. * *Scop. ent. carn.* 183. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 283. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 185. *n.* 6.
Degeer inſ. 4. *p.* 115. *n.* 3. *t.* 4. *f.* 8. Cicindela maculata.
Schaeff. elem. t. 43.
icon. t. 35. *f.* 10.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 26. *t.* 4. *f.* 5.
Habitat in Europæ *ſabuloſis.*

capenſis. 3. C. ſubænea, elytris albis: linea fuſca triramoſa. *Muſ. Lud. Ulr.* 84. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 285. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 14.
Degeer inſ. 7. *t.* 47. *f.* 3.
Voet. coleopt. t. 40. *f.* 5.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 11.
Herbſt apud Fuesli arch. inſ. 5. *t.* 27. *f.* 14?
Habitat ad Caput bonæ ſpei, & *in* Calabria.

germanica. 4. C. cuprea, elytris viridibus puncto lunulaque apicum albis. *Scop. ent. carn.* 182. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 285. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 186. *n.* 15.
Schreb. inſ. 10. *n.* 5. Cicindella obſcurior viridis, elytris punctis quatuor lineaque albis.

Geoffr.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 155. *n.* 29. Buprestis inauratus supra fusco-viridis, coleoptris punctis sex albis.
Poda inf. 42. *n.* 3.
Gron. zooph. 167.
Habitat in Germaniæ *arenosis*, *campestri simillima*, *sed triplo minor*, *colore viridi*, *nigro & cæruleo varians.*

tuberculata. 19. C. thorace fusco bituberculato, elytris fusco viridique variis: margine tridentato albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 285. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 16.
Habitat in nova Seelandia.

unipunctata. 20. C. subpurpurascens, labio elytrisque punctо albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 285. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 17.
Habitat in America.

sexpunctata. 21. C. viridi-ænea, elytrorum disco obscuriore: punctis tribus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 285. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 18.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. *t.* 46. *f.* 1.
Habitat ad littus Malabaricum.

quadrilineata. 22. viridi-ænea, elytris obscuris: margine lineaque media albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 285. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 19.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 27. *f.* 15.
Habitat in India, *magnitudine sexpunctatæ.*

biramosa. 23. C. obscure ænea, elytrorum margine biramoso albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 286. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 20.
Thunb. nov. inf. sp. 1. *p.* 26. *f.* 40. Cicindela (tridentata) purpurascenti-ænea, elytris linea marginali tridentata.

Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. p. 115. n. 7. t. 2. f. 16.
Habitat in India.

fexgut-tata. 24. C. viridis nitida, elytris punctis tribus marginalibus albis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 286. n. 19. mant. inſ. 1. p. 186. n. 21.*
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. t. 27. f. 17.
Habitat in Virginia, *labio ſuperiori flavo.*

Catena. 25. C. viridi-ænea, elytris albidis: punctis ſex viridibus concatenatis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 286. n. 18. mant. inſ. 1. p. 187. n. 22.*
Thunb. nov. inſ. ſp. 2. t. 1. f. 41-43. Cicindela viridi-ænea, elytris linea flava triramoſa.
Habitat in India.

margi-nata. 26. C. viridis, elytris margine faſcia undata punctisque duobus albis. *Fabr. ſp. inſ. p. 286. n. 10. mant. inſ. 1. p. 187. n. 23.*
Habitat in Virginia.

octo-guttata. 27. C. obſcura, elytris punctis quatuor diſci lunulisque duabus marginalibus albis. *Fabr. mant. inſ. 1. p. 187. n. 24.*
Habitat in America, *parva.*

trifa-ſciata. 28. C. obſcura, elytris ſtrigis tribus albis: ſecunda flexuoſa. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 286. n. 20. mant. inſ. 1. p. 187. n. 25.*
Habitat in America, *parva, ſubtus ænea nitida.*

virgi-nata. 5. C. nitida, ore antennis pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ. 1. p. 286. n. 21. mant. inſ. 1. p. 187. n. 27.*
Habitat in Virginia, *carolinæ ſimilis, violacea.*

caro-lina. 6. C. viridis nitida, elytrorum apicibus, ore, antennis

tennis pedibusque flavis. *Amæn. ac.* 6. *p.* 395. *n.* 23. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 286. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 187. *n.* 26.
Gron. zooph. 576. *
Degeer inf. 4. *p.* 120. *n.* 2. *t.* 17. *f.* 24.
Habitat in Carolina.

cayennensis. 29. C. supra fusca, subtus cyanea, ano tibiisque posterioribus testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 187. *n.* 28.
Habitat in Cayenna, *magnitudine carolinæ.*

aquinoctialis. 7. C. flava, elytris fasciis duabus nigris latis. *Amæn. ac.* 6. *p.* 395. *n.* 6. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 287. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 187. *n.* 29.
Habitat in Surinamo.

silvatica. 8. C. nigra, elytris fascia undata punctisque duobus albis. *Fn. suec.* 748. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 284. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 7.
Fn. suec. 1. *n.* 549. Cicindela atra, coleoptris maculis sex fasciaque albis.
Degeer inf. 4. *p.* 114. *t.* 4. *f.* 7. Cicindela supra nigra, subtus viridis nitida, &c.
Geoffr. inf. pa. 1. *p.* 155. *n.* 28. Buprestis inauratus supra fusco-viridis, &c.
Petiv. gazoph. t. 50. *f.* 5.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 27. *f.* 13.
Habitat in Europæ *pinetis.*

littoralis. 30. C. obscure ænea, elytris nigricantibus: punctis sex albidis; baseos lunato medio transverso. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 185. *n.* 8.
Habitat ad Barbariæ *littora, statura silvaticæ.*

tristis. 31. C. nigra, elytris macula media flava. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 284. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 9.
Habitat - - -

interrupta. 32. C. elytris fuscis : puncto baseos fasciis tribus interruptis lineolaque apicis flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 284. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 10.
Habitat in Sierra Leon Africæ.

lunulata. 33. C. nigra, elytris lunulis duabus maculisque duabus albis : anteriore transversa. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 284. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 11.
Habitat ad Caput bonæ spei, *magnitudine & statura hybridæ.*

lurida. 34. C. obscura, elytris punctis duobus lunulisque tribus : intermedia flexuosa. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 284. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 12.
Habitat ad Caput bonæ spei.

flexuosa. 35. C. obscura, elytris punctis quatuor lunulisque tribus albis : intermedia flexuosa. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 186. *n.* 13.
Habitat ad Hispaniæ *littora, luridæ proxime affinis.*

maura. 9. C. nigra, elytris punctis sex albis : tertio & quarto parallelo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 287. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 187. *n.* 30.
Habitat in Oriente, *statura campestris, fronte albo.*

japonica. 36. C. violacea, elytris basi, apice fasciaque cuneis : punctis duobus fasciaque luteis. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 25. *f.* 39.
Habitat in Japonia, *magnitudine silvaticæ, subtus e cyaneo & violaceo nitens.*

sexnotata. 37. C. capite virescente, thorace rubro, elytris testaceis: maculis sex nigris. *Lepech. it.* II. *p.* 203. *t.* 10. *f.* 12.
Habitat in Sibiriæ *fluviorum arena.*

austriaca. 38. C. viridis, pectore abdominisque basi subtus ru-

rubro-æneis, elytris margine aureo tenuiſſimo: punctis aliquot albis. *Schranck Beytr. zur Naturg. p.* 69. §. 17.
Habitat in Auſtria.

litterata. 39. C. metallica albo-villoſa, elytris cupreis: punctis cæruleis ſtriisque argenteis literas æquantibus. *Sulz. hiſt. inſ. p.* 55. *t.* 6. *f.* 12.
Fuessli Verz. ſchw. Inſ. p. 17. *n.* 338. Cicindela arenaria.
Habitat in Helvetiæ *arena.*

danica. 40. C. nigra ſupra fuſco-ænea, elytris ſtriis lateralibus remotis: dorſo ſpeculifero. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 80. *n.* 865.
Mull. Fn. Fridrichsd. p. 18. *n.* 178. Cicindela orichalcica, dorſo ſpeculifero.
Habitat in Dania.

punctata. 41. C. nigra, ſupra ſubænea, elytris ſtriatis: punctis impreſſis quatuor, pedibus flavo-fuſcis.
Mull. zool. dan. prodr. p. 80. *n.* 867.
Mull. Fn. Fridrichsd. p. 18. *n.* 179.
Habitat in Dania.

chinenſis. 42. C. ſubtus cæruleo-violacea nitida, elytris viridibus: maculis nigris punctisque quatuor albis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 119. *n.* 1. *t.* 17. *f.* 23.
Habitat in Sina.

cærulea. 43. C. cærulea nitens, ore albo. *Pall. it.* II. *app. n.* 65.
Habitat in deſertis arenoſis auſtralibus ad Irtim Sibiriæ *poſitis, fugaciſſima.*

gracilis. 44. C. nigro-ænea, elytris punctis duobus marginalibus albis: diſco poſterius rubente. *Pall. it.* II. *app. n.* 66.

Ha-

Habitat in Sibiriæ *arena ad* Solnulbam *fita , cor*
neribus gracilior , pedibus longiſſimis tenuiſſimis

ferrugi-nea. 49. C. ferruginea , pedibus, elytris , capite tho
ceque teſtaceis , hoc utroque poſterius , el
rum faſcia undata futuraque viridibus. *Muſ. L*
p. 34. *n.* 762.
Habitat in Europæ *aquis : coccinellæ ſtatura , c*
te poſterius bilobo , labio albo , maxillis nigris ,
race anterius exciſo , ſcutelo nullo , elytro utr
ſtriis punctatis 15 , *baſi maculis* 3 *margine an*
contiguis.

** *labio rotundato acuminato integro* , Elap
Fabricii.

atrata. 45. C. tota atra opaca. *Pall. it.* I. *app. n.* 42.
Habitat in Sibiriæ *lacu* Inderienſi , *magnitudin*
forma germanicæ ; an ex hac tribu ?

lateola. 46. C. elytris ex fuſco viridi-aureis : margine
terali undique late lacteo. *Pall. it.* II. *app. n.*
Habitat in lacu Sibiriæ Inderienſi ; *an huic tri*
accenſenda ?

ripa-ria. 10. C. viridi-ænea , elytris punctis latis excava
Fn. ſuec 741.* *It. oel.* 38. 121. *Fabr. ſp.*
1. *p.* 287. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. 187. *n.* 1.
Degeer inſ. 4. *p.* 117. *n.* 4. *t.* 4. *f.* 9. Cicind
viridi-ænea maculis rotundis excavatis griſeo-
ridibus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 156. *n.* 30. Bupreſtis vi
di-æneus , &c.
Liſt. loqu. 385. Scarabæus parvus inauratus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 13.
Schaeff. ic. t. 86. *f.* 4.
Habitat in Europæ *humentibus , colore ſæpius v*
rians.

flavipes. 11. C. obſcure ænea, elytris ſubnebuloſis, pedibus luteis. *Fn. ſuec.* 750.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 287. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 287. *n.* 2.
Degeer inſ. 4. *p.* 119. *n.* 6. Cicindela flavipes.
Habitat in Europæ *borealis ripis, elytris punctatis.*

rupeſtris. 12. C. nigra, coleoptris punctis duobus faſciaque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ. p.* 287. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 3.
Habitat in Sueciæ *rupibus, frequentius ſub lichenibus, pediculi majoris magnitudine.*

quadrimaculata. 13. C. nigra, elytris fuſcis: maculis duabus pallidis, tibiis rufis. *Fn. ſuec.* 751.*
Habitat in Europa.

aquatica. 14. C. ænea nitida, capite ſtriato. *Fn. ſuec.* 752.* *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 288. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 4.
Schreb. inſ. 6. Cicindela puſilla.
Geoffr. inſ. par. 1. 157. *n.* 31. Bupreſtis fuſco-æneus.
Liſt. mut. t. 31. *f.* 13.
Habitat ad Europæ *aquas, frequens.*

ſemipunctata. 47. C. ænea nitida, elytris punctatis, dorſo glaberrimo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 288. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 5.
Degeer inſ. 4. *p.* 118. *n.* 5. Cicindela ſtriata.
Habitat Halæ Saxonum & Berolini.

biguttata. 48. C. ænea, elytris nitidis apice flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 288. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 6.
Habitat ad Norwegiæ *aquas.*

211. BUPRESTIS. *Antennæ* filiformes, serratæ longitudine thoracis.
Palpi quatuor filiformes: articulo ultimo obtuso truncato.
Caput dimidium intra thoracem retractum.

unidentata. 31. B. elytris unidentatis æneis: margine aurato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 273. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 1.
Habitat - - -

bicolor. 32. B. elytris acuminatis viridi-æneis: macula flava, pectore abdomineque flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 273. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 175. *n.* 2.
Habitat in America *meridionali.*

gigantea. 1. B. elytris bidentatis, rugoſis, thorace lævi, corpore inaurato. *Muſ. Lud. Ulr.* 85. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 273. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 3.
Degeer inſ. 4. *p.* 134. *n.* 1. Buprestis gigantea.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 108. *n.* 84. Mordella gigantea.
Sloan. jam. 2. *p.* 210. *t.* 236. *f.* 1. 2. Cantharis maxima, elytris cuprei coloris ſulcatis.
Grew. muſ. 165. *t.* 13. Cerambyx Indiæ orientalis maximus.
Petiv. gaz. t. 147. *t.* 16. 17.
Merian. ſurin. t. 50. *f. infim.*
Seb. muſ. 3. *t.* 84. *f.* 12.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 28.
Herbſt apud Naturſ. arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 1.
Habitat in America & Aſia.

vit-

Larvæ *buprestis in ligno habitantes.*

vittata. 33. B. elytris bidentatis punctatis: lineis elevatis quatuor, viridi-ænea: vitta lata aurea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 4. *Sulz. hiſt. inſ. t.* 6. *f.* 14.
Habitat in India.

faſtuoſa. 34. B. elytris truncatis bidentatis punctato-ſtriatis viridibus, dorſo aureo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 5.
Habitat in America *ſeptentrionali.*

punctatiſſima. 35. B. elytris bidentatis cupreis: punctis violaceis numeroſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 6.
Habitat in Sierra Leon Africæ.

beroliniſis. 36. B. elytris bidentatis viridi nigroque variis, ano tridentato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 7.
Herbſt Beſchr. der berl. Naturf. Fr. 4. *t.* 7. *f.* 5. *& apud Fuessli arch inſ.* 5. *t.* 28. *f.* 5.
Pall. ic. inſ. ruſſ. 2. *t.* D. *f.* 10.
Habitat in Germania, *ſtatura & magnitudine obſcuræ.*

coruſca. 37. B. ænea nitidiſſima, elytris bidentatis apice abdomineque aureis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 8.
Habitat in Jamaica, *vittata minor, antennis cyaneis.*

decora. 38. B. elytris truncatis bidentatis viridibus: vitta cæruleſcente marginibusque aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 9.
Habitat in America.

lurida. 39. B. obſcura, elytris bidentatis, ano tridentato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 274. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 176. *n.* 10.
Habitat in America.

ob-

obscura. 40. B. obscure ænea : punctis elevatis obscur rioribus, elytris bidentatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 176. *n.* 11.
Habitat in America *boreali*, *parva*, *subtus nit.* *cuprea*.

punctata. 41. B. ænea, capite abdomineque testaceo-mac latis, elytris subbidentatis striatis. *Fabr.* *inf.* 1. *p.* 176. *n.* 12.
Habitat in Barbaria, *mediæ magnitudinis*.

fasciata. 42. B. elytris bidentatis viridi-æneis apice cyan fasciis duabus ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* *p.* 177. *n.* 13.
Habitat in America *boreali*, *magnitudine punctat* *viridi-ænea*, *antennis nigris*.

rauca. 43. B. obscure ænea immaculata, elytris bide tis substriatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 177. *n.*
Habitat in Barbaria, *parva*.

striata. 44. B. elytris truncatis subbidentatis cupreis neis elevatis quatuor. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 177. *n.* 15.
Habitat in Pensylvania.

rutilans. 45. B. elytris tridentatis viridibus nigro-macul margine aureo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 274. *n.* *mant. inf.* 1. *p.* 177. *n.* 16.
Jacquin miscell. austr. 2. *t.* 23. *f.* 2. Buprestis stuosa.
Habitat in Austria.

octoguttata. 2. B. elytris fastigiatis muticis, maculis qua albis, corpore cæruleo. *Fn. suec.* 753. *it. f.* 23. *Uddm. diss.* 42.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 278. *n.* 32. *mant. inf.* 1. *p.* *n.* 48. Buprestis elytris integris : maculis tuor albis, corpore cæruleo.

Degeer inſ. 4. *p.* 132. *n.* 5. *t.* 4. *f.* 20. Bupreſtis albo punctata.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 126. *n.* 2. Cucujus viridi-æneus : punctis quatuor impreſſis.
Schaeff. ic. t. 31. *f.* 1. & *t.* 204. *f.* 4.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 7. a. b.
β) Bupreſtis ſexpunctata ? *Lepech. it.* II. *t.* 10. *f.* 10.
Habitat in Europæ *nemoribus*, β) *in arena fluviorum* Sibiriæ.

ignita. 3. B. elytris ſerratis, thorace impreſſo, corpore inaurato, tibiis teretibus. *Muſ. Lud. Ulr.* 86. *
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 274. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 17. Bupreſtis elytris dentatis, thorace impreſſo, corpore inaurato.
Grew muſ. 166. *t.* 13. Beetle.
Kaempf. jap. 1. *p.* 132. *t.* 10. *f.* 7.
Pet. gaz. t. 20. *f.* 8.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 14.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 3.
Habitat in America *auſtrali*, India & Sina.

lineata. 46. B. elytris truncatis ſubtridentatis nigro-æneis: vittis duabus fulvis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 275. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 18.
Habitat in America *meridionali.*

ocellata. 47. B. viridi-nitens, elytris tridentatis : maculis duabus aureis ocellarique flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 275. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 19.
Sulz. hiſt. inſ. t. 6. *f.* 15.
Habitat in America *auſtrali* & India.

æroſa. 48. B. elytris tridentatis, corpore æneo immaculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 275. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 177. *n.* 20.
Habitat in Coromandel, *minor.*

ma-

maculata. 49. B. elytris tridentatis cyaneis flavo-maculat
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 275. *n.* 16. *mant. ins.*
p. 177. *n.* 21.
Habitat in Sibiria, *mediæ magnitudinis, subt*
ænea, capite cyaneo.

maculosa. 50. B. elytris truncatis striatis-dentatis nigris: m
culis quatuor flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 1
n. 22.
Degeer inf. 4. *p.* 137. *n.* 6. *& Herbst apud Fue*
arch. inf. 5. *p.* 118. *n.* 8. *t.* 28. *f.* 8. Bupre
flavo-punctata.
Habitat in Suecia, *mediæ magnitudinis; capite*
abdomine æneo-nigro; pedibus & thorace nigr
hujus margine flavo.

stricta. 4. B. elytris serratis sulcatis, tibiis angulatis,
domine glabro. *Mus. Lud. Ulr.* 87. *
Habitat in America *australi*, & India.

sterni-cornis. 5. B. elytri, serrato-tridentatis, thorace punctat
sterno porrecto, corpore inaurato. *Mus. L*
Ulr. 88. *
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 275. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 1
n. 23. Buprestis elytris serrato-tridentatis viri
bus: punctis cinereis impressis, sterno porrec
conico.
Grew mus. 167. *t.* 13. Carabus orientalis crassus.
Mouff. inf. 160. *f. inf.*
Herbst apud Fuessli arch. inf. 7. *t.* 46. *f.* 2.
Habitat in India & America.

Chrysis. 51. B. elytris serrato-tridentatis castaneis, ster
conico porrecto. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 275. *n.*
mant. inf. 1. *p.* 178. *n.* 24.
Degeer inf. 4. *p.* 136. *n.* 2. *t.* 17. *f.* 25. Buprestis
viridi-aurata, &c.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 2. *Sch*

Schroet. Abh. t. 2. f. 3. Buprestis splendida.
Habitat in India, Sina, *an satis distincta a sternicorni?*

violacea. 52. B. elytris, truncato-quadridentatis violaceis, corpore elongato cyaneo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 25.
Habitat in Sierra Leon Africæ, *immaculata.*

aegyptiaca. 53. B. elytris ferratis sulcatis, corpore depresso obscuro. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 276. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 26.
Habitat in Ægypto.

mariana. 6. B. elytris ferratis longitudinaliter rugosis: maculis duabus impressis, thorace sulcato. *Mus. Lud. Ulr.* 89. * *Fn. suec.* 754. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 276. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 27.
Fn. suec. 557. Buprestis æneo-nitida supra cinerea, coleoptris apice attenuatis.
Degeer inf. 4. *p.* 128. *n.* 1. *t.* 4. *f.* 18. Buprestis nitida supra fusco-ænea, subtus rubro-cuprea, &c.
Pet. gaz. t. 2. *f.* 2. Cantharis marianus.
Schaeff. ic. t. 49. *f.* 1.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 4.
Habitat in Europa, *& boreali* America.

farinosa. 54. B. elytris ferratis viridibus: sulco abbreviato suturali impresso. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 276. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 28.
Habitat in nova Hollandia.

fulminans. 55. B. æneo nitidissima, elytris ferratis apice anreis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 29.
Habitat in India, *magna.*

cyanipes. 56. B. elytris ferratis striatis viridi-æneis, thorace pla-

plano cæruleo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 178 *n.*
Habitat in America *meridionali, marianæ magnitudine.*

modesta. 57. B. elytris serratis corpore obscurioribus: maculis tribus impressis aureis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 276. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 31.
Habitat in Bratilia, *farinosæ magnitudine.*

blanda. 58. B. elytris attenuatis serratis sulcatis viridi-æneis: sulcis cupreis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 2[illegible] *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 32.
Habitat in America *meridionali, mediæ magnitudinis.*

aurata. 59. B. aurea, elytris serratis, thorace æneo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 178. *n.* 33.
Habitat in America, *magna.*

tripunctata. 60. B. elytris serratis striatis cupreis punctis tribus impressis aureis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 1[illegible] *n.* 39.
Habitat in America *meridionali, statura blandæ.*

elegans. 61. B. ænea nitida, elytris serratis, thoracis [illegible]neis duabus elytrorumque unica aureis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 277. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 1[illegible] *n.* 35.
Habitat ad Caput bonæ spei.

chrysostigma. 7. B. elytris serratis longitudinaliter sulcatis: maculis duabus aureis impressis, thorace punctato. *Fn. suec.* 755. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 277. *n.* 2[illegible] *mant. inf.* 1. *p.* 179. *n.* 39.
Fn. suec. 1. *n.* 556. Buprestis fusco-ænea, elytris maculis æneis impressis.
Degeer inf. 4. *p.* 129. *n.* 3. Buprestis fusca.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 135. *n.* 1. Cucujus aureus.
Sulz.

Sulz. hiſt. inſ. t. 6. f. 39.
Schaeff. elem. t. 31. f. 2.
Herbſt apud Fuesſli arch. inſ. 5. t. 28. f. 6.
Habitat in Europa.

dorſata. 62. B. obſcure ænea, elytris ſerratis, abdominis dorſo aureo, ano bidentato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 38.
Habitat in America *meridionali*, *chryſoſtigmate minor.*

impreſſa. 63. B. elytris ſerratis lævibus æneis: punctis tribus impreſſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 277. *n.* 27. *mant. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 40.
Habitat in America *auſtrali* & India, *modeſtæ affinis*, *at duplo minor.*

ornata. 64. B. elytris ſerratis obſcuris albo-maculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 277. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 41.
Habitat in Penſylvania.

fæniata. 65. B. cinereo-villoſa, elytris ſerratis nigris: faſciis duabus ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 42.
Habitat in Europa *magis auſtrali*, *parva*, *antennis nigris.*

cayennenſis. 66. B. viridi-ænea, elytris ſerratis atris: faſciis tribus lineolaque apicis viridibus, capite thoraceque fuſco maculatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 43.
Habitat in Cayenna, *parva*, *antennis nigris.*

cylindrica. 67. B. elytris ſerratis ſtriatis, thorace villoſo, corpore cylindrico nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 277. *n.* 29. *mant. inſ.* 1. *p.* 180. *n.* 44.
Habitat in Oriente.

ſca-

fcabra. 68. B. elytris integris, fronte fulcata, corpore fcabro aureo. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 277. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 180. *n.* 45.
Habitat in America *auftrali &* India.

Trochilus. 69. B. aurea nitidiffima, dorfo elytris integris punctisque viridibus. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 278. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 180. *n.* 46.
Habitat in Auftria.

decaftigma. 70. B. elytris integris elevato-ftriatis fufcis: punctis quinque flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 180. *n.* 47.
Habitat in Auftria, *ftatura chryfoftigmatis.*

ruftica. 8. B. elytris ftriatis faftigiatis, tharace punctato. *Fn. fuec.* 756.*
Fn. fuec. 1. *n.* 555. Buprestis viridi-ænea immaculata.
Fabr. fp. inf. 1. *p.* 279. *n.* 40. *mant. inf.* 1. *p.* 181. *n.* 57. Buprestis elytris emarginatis ftriatis obfcure æneis.
Degeer inf. 4. *p.* 130. *n.* 4. *t.* 4. *f.* 10. Buprestis violacea.
Scop. ent. carn. n. 188. Mordella ruftica.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 126. *n.* 3. Cucujus viridi-auratus oblongus.
Schaeff. ic. t. 2. *f.* 1.
Herbft apud Fuesslı arch. inf. 7. *p.* 174. *n.* 28.
Habitat in Europæ *nemoribus.*

canaliculata. 71. B. obfcura, elytris integris, abdomine fubtus canaliculato: ano quadridentato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 181. *n.* 58.
Habitat in Africa *æquinoctiali, magnitudine ruftica.*

acuminata. 72. B. elytris integris attenuato-acuminatis obfcuris, corpore cupreo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 181. *n.* 59.
Pall.

Pall. ic. inſ. ruſſ. 2. *t.* D. *f.* 10.
Habitat in Ruſſia *meridionali, ſtatura ruſticæ.*

plebeia. 73. B. elytris emarginatis cupreis fuſco maculatis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 280. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 182, *n.* 60.
Habitat in India.

tranquebarica. 74. B. nigra obſcura, elytris integerrimis, thorace macula baſeos utrinque impreſſa. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 61.
Habitat Tranquebariæ, *ſtatura ruſticæ.*

lugubris. 75. B. elytris integris obſcuris nigro-ſcabris, corpore ſubtus cupreo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 42. *mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 62.
Pall. ic. inſ. ruſſ. 2. *t.* D. *f.* 11. Bupreſtis oxyptera.
Herbſt apud Fuesſli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 14.
Habitat in Auſtria & Ungaria.
Feminæ *aculeus brevis ſerratus ani.*

carioſa. 76. B. atra, elytris integris: atomis albis, thorace variolofo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 63. *Pall. it.* III. *app. p.* 708. *n.* 52. *ic. inſ. ruſſ.* 2. *t.* D. *f.* 6.
Habitat in Ruſſia *magis auſtrali, ſtatura b. tenebrionis, at duplo major.*

undata. 77. B. viridi-ænea, elytris integris apice obſcuris: ſtrigis undatis albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 64.
Habitat in Germania, *b. rubi major.*

auſtriaca. 9. B. elytris ſtriatis æneis bidentatis, capite thoraceque viridibus, abdomine violaceo.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 279. *n.* 36. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.*

n. 53. Buprestis elytris integris fulcatis æneis capite thoraceque viridibus.
Scop. ent. carn. n. 187. Mordella gigantea.
Habitat Idriæ, *magnitudine rusticæ.*

sibirica. 78. B. elytris integerrimis atris: vittis duabus cinereo-tomentosis impressis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 279. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 181. *n.* 54.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 11.
Habitat Sibiriæ, *mediæ magnitudinis, latiuscula, scabra, subtus cinereo-villosa.*

splendens. 79. B. elytris integris viridibus: margine omni aureo lineisque tribus elevatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 279. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 181. *n.* 55.
Habitat in Sina.

fusca. 80. B. subtus ænea, elytris integris obscure fuscis, abdomine punctis lateralibus fulvis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 279. *n.* 38. *mant. inf.* 1. *p.* 181. *n.* 56.
Habitat ad Caput bonæ spei, *fusca, magnitudine & statura splendentis.*

aurulenta. 10. B. elytris fastigiatis bidentatis viridibus margine corporeque auratis, thorace subpunctato.
Habitat in Carolina, *oblonga, angusta.*

Tenebrionis. 11. B. atra, elytris integris lineato-punctatis, thorace varioloso dilatato. *Fn. suec.* 761. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 280. *n.* 43. *mant. inf.* 1. *p.* 182. *n.* 65.
Sulz. hist. inf. t. 6. *f.* 16.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 15.
Habitat in Europa, Africa.

fasciularis. 12. B. elytris integerrimis striatis: punctis fasciculato-viloſis, corpore inaurato hirſuto. *Mus. Lud.*

Lud. Ulr. 90. * *Gron. zooph.* 493. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 278. *n.* 33. *mant. inf.* 1. *p.* 180. *n.* 49.
Seb. mus. 2. *p.* 22. *t.* 20. *f.* 5. Scarabæus amboinensis.
Pet. gaz. 4. *t.* 13. *f.* 5. Scarabæus viridis aureus, pupillis pilis albis obtusis undique hirtus.
Sulz hist. inf. t. 6. *f.* 4.
Degeer inf. p. 7. *t.* 47. *f.* 6.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 9.
Habitat ad Caput bonæ spei, *rarius nigra, fasciculis pilorum nunc flavis, nunc fulvis.*

variolaris. 81. B. elytris integris obscuris: punctis impressis numerosis, thorace carinato. *Pall. it.* 1. *p.* 464. *n.* 37. *ic. inf. ruff.* 2. *t.* D. *f.* 2. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 278. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.* 181. *n.* 50.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 10.
Habitat in Russiæ *onopordo & echinopode, scabra, nigra, subtus hirta, magnitudine & statura fasciculari.*

Onopordi. 82. B. elytris integris cupreis: sulcis punctisque numerosis albo-villosis, thorace scabro. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 181. *n.* 51.
Habitat in Hispaniæ *onopordo, ænea, nitida, albo-villosa, fasciculari paulo minor.*

hirta. 13. B. hirta, elytris integerrimis, pedibus ferrugineis. *Mus. Lud. Ulr.* 91. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 278. *n.* 35. *mant. inf.* 1. *p.* 181. *n.* 52.
Habitat in Africa, *colore varians.*

rubi. 14. B. cylindrica nigra, elytris fasciis cinereis undulatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 280. *n.* 44. *mant. inf.* 1. *p.* 182. *n.* 66.
Habitat in Europæ *magis australis rubo, cichoreo.*

deaurata. 83. B. supra obscura viridis, elytrorum margine au-

aureo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 182. *n.* 67.
Habitat Halæ Saxonum, *mediæ magnitudinis, prea, antennis nigris.*

nitidula. 15. B. elytris integerrimis, thorace marginato utrinque depreſſo, corpore viridi nitido. *Fuec.* 757. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* 58. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 57.
Schaeff. ic. t. 50. *f.* 7.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 5. *t.* 28. *f.* 20.
Habitat in Europa *boreali.*

læta. 84. B. elytris integris viridibus, capite thoraceque aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* 59. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 88.
Habitat Halæ Saxonum, *an varietas nitidulæ?*

ſalicis. 85. B. viridis nitens, elytris integerrimis aureo-baſi viridibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* [illegible] *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 89.
Schranck inſ. auſtr. p. 195. *n.* 365. Bupreſtis elongantulus.
Schaeff. ic. t. 31. *f.* 12.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 7. *t.* 46. *f.* 5. a. b.
Habitat in Germaniæ *ſalice.*

cyanea. 86. B. elytris integerrimis rugoſis, corpore cyaneo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* 61. *mant.* 1. *p.* 184. *n.* 91.
Habitat Halæ Saxonum & Berolini.

diſcoidea. 87. B. ænea villoſa, elytris integris: diſco teſtaceo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 90.
Habitat in Barbariæ *umbellatis, parva.*

bimaculata. 16. B. elytris integerrimis ſtriatis: macula rubra, corpore fuſco-viridi. *Muſ. Lud. Ulr.* 92. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* [illegible] *n.* 68.

Sulz. hiſt. inſ. p. 17. *t.* 6. *f.* 15.
Habitat in India.

quadri-maculata. 88. B. viridis, thorace poſterius, elytrisque integris maculis duabus aureis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 181. *n.* 69.
Habitat in India.

novem-maculata. 17. B. elytris integerrimis: maculis tribus longitudinalibus, fronte thoracisque lateribus, luteis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 282. *n.* 62. Bupreſtis elytris integerrimis nigris, maculis tribus flavis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 16. *f.* 17?
Habitat in Barbaria, Calabria, *nigra*, *oblonga*, *mediæ magnitudinis.*

triſtis. 18. B. elytris integerrimis marginatis, corpore cupreo, abdominis punctis decem nigris. *Muſ. Lud. Ulr.* 93. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 70.
Habitat in America *auſtrali* & India.

ænea. 19. B. elytris emarginatis: punctis excavatis cicatricantibus apice ſtriatis. *Fn. ſuec.* 758. *
Habitat in Europa.

cuprea. 20. B. elytris integerrimis, thoracis lateribus ſcabris, ſcutello tuberculari, corpore cupreo lævi. *Muſ. Lud. Ulr.* 94. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 71.
Habitat in America.

nobilis. 21. B. elytris integerrimis: ſtrigis duabus undatis inauratis, corpore fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 280. *n.* 49. *mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 72.
Habitat in America *auſtrali* & India.

bar-

barbarica. 89. B. supra ænea, subtus cuprea, elytris integerrimis substriatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 183. *n.*
Habitat in Barbaria, *parva.*

umbellatarum. 90. B. elytris integerrimis lævibus, corpore c
fcure cupreo immaculato. *Fabr. mant. inf.* *p.* 183. *n.* 74.
Habitat in Barbariæ *umbellatis*, *statura & magnitudine quadripunctatæ.*

quadripunctata. 22. B. elytris integerrimis punctatis, thorace pu
ctis quatuor impressis, corpore obscuro.
Suec. 759. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 281. *n.* 50. *ma*
inf. 1. *p.* 183. *n.* 75.
Degeer inf. 4. *p.* 134. *n.* 8. Buprestis subviridi-ni
gra, thorace punctis quatuor impressis.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 17.
Habitat in Europæ *floribus*, *frequens in caltha p*
lustri.

crucigata. 91. B. coleoptris integerrimis aureis: punctis du
bus cruceque posteriore nigris. *Fabr. sp. inf.*
p. 281. *n.* 51. *mant. inf.* 1. *p.* 183. *n.* 76.
Habitat in nova Hollandia.

manca. 23. B. aurata, thoracis lineis duabus, elytrisq
fuscis. *Syst. nat.* XII. 2. *add. p.* 1067. *n.* 10.
Fabr. syst. ent. p. 222. *n.* 37. Buprestis bistriata.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 281. *n.* 52. *mant. inf.* 1. *p.* 18
n. 77. Buprestis elytris integris obscuris, tho
ce aureo: striis duabus nigris.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 127. *n.* 4. Cucujus æneus, &
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 18.
Habitat in Gallia & Germania.

pygmæa. 92. B. elytris integris cyaneis, capite thorace
que æneis nitidis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 18
n. 78.

Hab

Habitat in Barbariæ *umbellatis, statura & magnitudine minutæ.*

minuta. 24. B. elytris integerrimis transverse rugosis, thorace subtrilobo lævi, corpore ovato nigro. *Fn. suec.* 760. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 281. *n.* 53. *mant. inf.* 1. *p.* 183. *n.* 79.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 128. *n.* 6. Cucujus fusco-cupreus triangularis, &c.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 19.
Habitat in Europa.

meditabunda. 93. B. elytris integerrimis fusco-nitidis, capite thoraceque cupreis, corpore æneo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 183. *n.* 80.
Habitat in America *boreali, statura viridis, at paulo major.*

viridis. 25. B. elytris integerrimis sublinearibus punctatis, thorace deflexo, corpore viridi elongato. *Fn. suec.* 762. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 281. *n.* 54. *mant. inf.* 1. *p.* 184. *n.* 81.
Degeer inf. 4. *p.* 133. *n.* 6. *t.* 5. *f.* 1. Buprestis viridis.
Geoff. inf. par. 1. *p.* 127. *n.* 5. Cucujus viridi-cupreus oblongus.
Scop. ent. carn. 190. Mordella ferraticornis.
Schaeff. ic. t. 76. *f.* 9.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 21.
Habitat in Europæ *betula alba, foliorum margines exedens, corpore obscuriori & cupreo varians.*

biguttata. 94. B. elytris integerrimis linearibus viridibus: puncto albo, abdomine cyaneo: punctis tribus albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 281. *n.* 55. *mant. inf.* 1. *p.* 184. *n.* 82.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 5. *t.* 28. *f.* 22.
Habitat in Angliæ *plantis.*

atra.

atra. 26. B. elytris integerrimis ſublinearibus punctatis, thorace deflexo, corpore atro elongato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 83.
Habitat in Germania, *viridi proxime affinis.* Schreber.

elata. 95. B. elytris integerrimis linearibus, corpore elongato aureo nitido. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 183. *n.* 84.
Herbſt Schr. der berl. Naturf. Fr. 1. *p.* 99. *n.* 12. Bupreſtis elongata.
Habitat Berolini & Halæ Saxonum, *ſtatura atra, at minor.*

ruficollis. 96. B. nigra, elytris integerrimis linearibus, thorace cupreo. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 85.
Habitat in America, *parva, ſtatura elatæ.*

feſtiva. 27. B. elytris integerrimis: maculis ſex cæruleis, corpore elongato viridiſſimo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 282. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 184. *n.* 86.
Habitat in Africa, *viridis magnitudine.*

linearis. 28. B. lineari oblonga murino-ænea, thorace poſteriore trilobo.
Habitat in America. Rolander.

granularis. 29. B. æneo-nebuloſa, antennis elevatis. *Fn. ſuec.* 763. *
Habitat in Europa, *an hujus generis?*

depreſſa. 30. B. elytris ſubſerratis æneo-ferrugineis nervoſo-punctatis, thorace depreſſo. *Mant.* 2. *p.* 533. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 277. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 179. *n.* 37. Bupreſtis (porcata) elytris ſerratis porcatis, thorace angulato, corpore fuſco nitido.
Habitat in Oriente.

cal-

calcarata. 97. B. elytris bidentatis substriatis, tibiis intermediis dentatis, corpore cupreo. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 310.
Herbst Schrif. der berl. Naturf. Fr. 1. *p.* 91. *n.*2.
Buprestis æruginosa.
Schaeff. ic. t. 35. *f.* 7.
elem. t. 31. *f.* 11.
Habitat in Germania, *statura & magnitudine rusticæ, rarior; elytrorum striis quatuor, thoracis unica media ex atro cærulea.*

fuliginosa. 98. B. elytris integerrimis sublinearibus glabris pilosis, thorace deflexo, corpore fuliginoso.
Forst. nov. inf. sp. 1. *p.* 51. *n.* 51.
Habitat in Anglia, *lecta in floribus crataegi oxyacanthæ, magnitudine cantharidis testaceæ, antennis moniliformibus, an hujus generis?*

hæmorrhoidalis. 99. B. æneo-nitens, elytris subtridentatis novemsulcatis, abdominis annulo ultimo maculis duabus fulvis. *Herbst Schr. der berl. Naturf. Fr.* 1. *p.* 97. *& apud Fuessli arch. inf.* 5. *t.* 28. *f.* 12.
Habitat Berolini *in sepibus, octoguttatæ affinis.*

quercus. 100. B. viridi-nitens, thorace orbiculato: puncto impresso, elytris truncatis costatis. *Herbst Schr. der berl. Naturf. Fr.* 1. *p.* 90. *n.* 1. *& apud Fuessli arch. inf.* 5. *t.* 28. *f.* 13.
Schaeff. ic. t. 35. *f.* 6?
Habitat in Germaniæ *ligno querno, pollicem fere longa, pedibus cæruleis, antennis nigricantibus.*

hirsuta. 101. B. atra, villosa, elytris fasciculis sparsis villosis flavis, marginalibus rubris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 7. *t.* 46. *f.* 4.
Habitat in America, *fasciculari affinis.*

11-maculata. 102. B. cylindrica nigra nitens, frontis macula thoracis quatuor, elytrorum tribus flavis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *t.* 28. *f.* 23.
Habitat in Ungaria.

ſexmaculata. 103. B. cylindrica nigra nitens, capite thoraceque immaculatis, elytrorum maculis tribus flavis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 5. *p.* 121. *n.* 2.
Habitat in Ungaria, *an vere diſtincta ab* 11-*maculata?*

varicornis. 104. B. nigricans villoſa, thorace utrinque lobato elytris acutis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 59. *n.* 53.
Habitat in Dania.

acuta. 105. B. nigra, elytris punctatis pone acuminatis thorace lævi. *Degeer inſ.* 4. *p.* 133. *n.* 7.
Habitat in Europa, 4 *modo lineas longa.*

nævia. 106. B. atra, thorace albo nigroque vario. *Lepechin it.* I. *p.* 232. *t.* 17. *f.* 7.
Habitat in Ruſſiæ *regno*, *ruſticæ affinis.*

picta. 107. B. ænea nitens, elytris violaceo nigris: maculis ſymmetricis flaveſcentibus. *Pall. it.* II. *app. n.* 46.
Habitat in regionibus Uralenſibus *magis auſtralibus octoguttatæ fere magnitudine.*

inaurata. 108. B. viridi-aurea nitidiſſima, elytris obtuſis integerrimis deceműtriatis æneis. *Pall. it.* II. *app. n.* 45.
Habitat rarior in regionibus auſtralibus, *fluviis Ural & Volgæ finitimis*, *ignitæ magnitudine*, *ſed latior.*

tatarica. 109. B. nigra, ſubtus ænea, elytris lævibus æneis: vitta marginali lineaque margini parallela impreſſis tomentoſis. *Pall. it.* I. *app. n.* 10. *Ha-*

Habitat in Tataria, *marianæ magnitudine, at brevior, craſſior, & congeneribus magis obtuſa.*

Virginica. 110. B. thorace lato fuſco: punctis cupreis, elytris ſerratis atris: maculis cupreis futuraque metallica. *Drury inſ.* 1. *p.* 66. *t.* 30. *f.* 3.
Habitat in Virginia.

nana. 111. B. nigra nitida, elytris cæruleo-violaceis nitidiſſimis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 137. *n.* 4. *t.* 17. *f.* 27.
Habitat in Surinamo, *pulice vix major.*

margi-nata. 112. B. elytris integerrimis nigris: margine flavo. *Mull. Fn. Fridrichsd. p.* 18. *n.* 182.
Habitat in Dania, *an diſtincta ſpecies?*

nigra. 113. B. thorace elytrisque nigris, abdomine ſubtus albo-tomentoſo. *Mull. Fn. Fridrichsd. p.* 18. *n.* 183.
Habitat in Dania.

roſacea. 114. B. thorace pone marginato, elytris marginatis apice rotundatis, abdomine ſupra æneo fuſco.
Scop. ent. carn. n. 190. Mordella roſacea.
Habitat in Carniolæ *floribus.*

ungarica. 115. B. viridiſſima, ſubtus fronte & thoracis lateribus rubro-aureis.
Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 104. *n.* 85. Mordella hungarica.
Habitat in Ungaria, *ruſtica paulo minor, elytris apice rotundatis.*

nebuloſa. 116. B. ſupra nigra, ſubtus albicans, elytris integerrimis ſtriis tenuiſſimis punctatisque albidis nebuloſis.

Scop.

Scop. ann. hiſt. nat. 5. *p.* 104. *n.* 86. Mordella nebulosa.
Habitat in Ungaria, *pedibus nigris.*

bruttia. 117. B. nigra albido punctata, thorace variolo dilatato albidiore: maculis quinque nitidis nigris.
Petagn. inſ. Calabr. p. 22. *n.* 108. *f.* XX.
Habitat in Calabriæ lentiſco.

Stephanelli. 118. B. viridi-aurea nitens, thorace lineis duabus fuſcis, elytris integris. *Petagn. inſ. Calabr. p.* 23. *n.* 110.
Habitat in Calabriæ *monte* tre pizzi, *minor.*

rugoſa. 119. B. ænea punctata, thorace ſcabro: ſulco obliquo utrinque impreſſo, elytris ſtriatis fuſcis apice truncatis: rugis impreſſis interruptis. *Muſ. Lesk. p.* 34. *n.* 739.
Habitat - - - -

coccinea. 120. B. fuſco-ænea punctata, thorace ſulcato, elytris integris coccineis: rugis quatuor nigris, internis ad ſuturam ramoſis. *Muſ. Lesk. p.* 34. *n.* 744.
Habitat extra Europam, *thoracis ſulcis ſtriis villoſis griſeis repletis, elytris ſpatio rugis interjectis punctis concatenatis duplici ſerie ſtriatis.*

HYDROPHILUS. *Antennæ* clavatæ: clava perfoliata.
Palpi quatuor filiformes.
Pedes poſteriores villoſi, natatorii, ſubmutici.

piceus. 1. H. niger, ſterno canaliculato poſterius ſpinoſo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 288. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 238. *Den.* 1.

Degeer inf. 4. *p.* 371. *n.* 1. *t.* 14. *f.* 1. 2. Hydrophilus ruficornis.

Geoffr. inf. par. 1. 182. *n.* 1. *t.* 3. *f.* 1. Hydrophilus niger, elytris fulcatis, antennis fuscis.

Syst. nat. XII. 2. *p.* 664. *n.* 1. *Fn. suec.* 764. * *Scop. ent. carn.* 293. Dytiscus antennis perfoliatis, corpore lævi, sterno carinato postice spinoso.

Herbst Besch. der naturf. Berl. Fn. 4. *t.* 7. *f.* 2. Dytiscus hastatus.

Lyonn. Less. t. 1. *f.* 15-17.

Frisch inf. 2. *t.* 6.

Sulz. hist. inf. t. 6. *f.* 8.

Schaeff. el. t. 71.

ic. t. 33. *f.* 1. 2.

Bergstr. nomencl. 1. z. 6. *f.* 3. & *t.* 8. *f.* 1. & *t.* 9. *f.* 1.

Habitat in Europa, *nido eminenter mucronato natante.*

olivaceus. 6. H. olivaceus, sterno canaliculato posterius spinoso, coleoptris emarginatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 289. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 188. *n.* 2.

Habitat in Coromandel, *piceo paulo minor.*

caraboides. 2. H. niger nitidus, elytris substriatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 289. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 188. *n.* 3.

Degeer inf. 4. *p.* 516. *n.* 2. Hydrophilus nigricornis.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 183. *n.* 2. Hydrophilus niger, elytrorum punctis per strias digestis, antennis nigris.

Syst. nat. XII. 2. *p.* 664. *n.* 2. *Fn. suec.* 765. * Dytiscus antennis perfoliatis, corpore glabro, striis aliquot recurvis.

Raj. inf. p. 95. *n.* 7. Hydrocantharus niger subrotundus.

Frisch inf. 13. *p.* 24. *t.* 21.

Roes.

Roef. inf. 2. *aquat.* 1. *t.* 4. *f.* 1. 2.
Sulz. hift. inf. t. 6. *f.* 41.
Schaeff. ic. t. 53. *f.* 10.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 5. *f.* 8. 9. & (*larv. pupa*) *t.* 7. *f.* 8. 9.
Habitat in Europa.

lateralis. 7. H. niger nitidus, thoracis elytrorumque marginibus flavis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 289. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 188. *n.* 4.
Habitat in inſulis Americæ *oppoſitis.*

ſcarabæoides. 3. H. niger, elytris ſtriatis, pedibus piceis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 289. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 188. *n.* 5.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 664. *n.* 3. Dytiſcus ovalis convexus ater lævillimus, antennis filiformibus triarticulatis.
Syſt. nat. X. *n.* 56. Scarabæus (aquaticus) muticus piceus, elytris ſtriatis, antennis flavescentibus filiformibus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 85. Scarabæus piceus.
Habitat in Europa, *palpis, non antennis, filiformibus.*

picipes. 8. H. niger, pedibus piceis, elytris lævibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 188. *n.* 6.
Habitat in Germania, *utrum hujus an ſequentis mox generis?*

orbicularis. 9. H. ſubrotundus corpore glabro atro. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 290. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 188. *n.* 6.
Habitat in Germania.

collaris. 10. H. niger, ore thoracis lateribus lineisque elytrorum ferrugineis. *Fabr. ſp. inf. p.* 290. *n.* 7. *mant. inf. p.* 188. *n.* 8.
Habitat in America.

ſu-

fuſci-pes. 4. H. thorace atro: margine griſeo, elytris fuſcis: margine punctoque poſteriore albidis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 290. *n.* 10. *mant.* 1. *p.* 189. *n.* 12.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 664. *n.* 4. *Fn. ſuec.* 766. Dytiſcus antennis perfoliatis, elytris ſtriatis margine lividis, pedibus fuſcis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 184. *n.* 4. Hydrophilus.
Habitat Upſaliæ, *elytrorum punctis interdum obſoletis.*

luridus. 5. H. elytris ſtriatis, corpore cinereo fuſco. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 290. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 9.
Degeer inſ. 4. *p.* 378. *n.* 4. *t.* 15. *f.* 1. 2. Hydrophilus fuſcus.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 665. *n.* 5. *Fn. ſuec.* 767.* Dytiſcus antennis perfoliatis luridus, elytris punctis tribus fuſceſcentibus, thorace lateribus flavicante.
Habitat in Europa.

minu-tus. 11. H. ovatus niger, elytris pedibusque griſeis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 290. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 188. *n.* 10.
Forſt. nov. inſ. ſp. 53. *n.* 53. Dytiſcus dermeſtoides.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 85. *n.* 27? Scarabæus totus rufo-niger, maculis nigrioribus.
Habitat in Europa, *veſperi ſonorus*, *thorace interdum griſeo.*

griſeus. 12. H. ſupra cinereus, ſubtus fuſcus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 11.
Habitat in Saxonia, *ſtatura & magnitudine minuti.*

trico-lor. 13. H. niger, elytris piceis margine nigris & apice ochroleucis, pedibus ſpadiceis. *Herbſt apud Fuesſli arch. inſ.* 5. *p.* 122. *n.* 6. *t.* 28. *f.* A. b.
Habitat Berolini, *lineam longus.*

cor-

cordiger. 14. H. niger, thoracisque margine elytrisque fe rugineis: his macula communi cordata nigra. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 122. *n. t.* 28. *f.* A. a. b.
Habitat Berolini, *vix lineam longus, pedibus pic*

rufus. 15. H. rufus, elytris lævissimis obscurioribus: margine exteriore albido anterius bidentato. *Sch ent. carn. n.* 298.
Habitat in Carniola.

obscurus. 16. H. lividus, abdomine nigro, elytris nitidis confertim punctatis. *Mull. zool. dan. prod. p.* 69. *n.* 657.
Habitat in Dania, *an vere distinctus a lurido?*

pusillus. 17. H. niger, elytris lævissimis, antennis tarsisque fuscis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 69. *n.* 658.
Habitat in Dania.

Pilula. 18. H. ater, supra nitidus confertim punctatus. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 69. *n.* 659.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 184. *n.* 3. Hydrophilus punctatus.
Habitat in Europa.

niger. 19. H. niger nitidus, elytris punctis distantibus leviſſime ſtriatis, antennis plantisque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 35. *n.* 769.
Habitat in Europa, *ſtatura caraboidis, at quadruplo minor.*

ater. 20. H. ater glaber, antennis tibiisque rufescentibus. *Muſ. Lesk. p.* 35. *n.* 774.
Habitat in Europa.

212.

212. DYTISCUS. *Antennæ* setaceæ.
Palpi sex filiformes.
Pedes posteriores villosi, natatorii, submutici.

latissimus. 6. D. niger, elytrorum marginibus dilatatis: linea flava. *Fn. suec.* 768. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 290. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 189. *n.* 1.
*Mull. zool. dan. prodr. p.*69. *n.*663. Dytiscus amplissimus.
Degeer inf. 4. *p.* 390. *n.* 1. Dytiscus nigro-fuscus.
Frisch inf. 2. *t.* 7. *f.* 1. 2. Scarabæus aquaticus magnus niger, margine luteo.
Sulz. hist. inf. t. 6. *f.* 19.
Schaeff. ic. t. 217. *f.* 1. 2.
Bergstr. nomencl. 1. *t.* 5. *f.* 1. 2. & *t.* 9. *f.* 3.
Habitat in Europa *boreali*, *in propriam speciem sæviens*, *mas glaber*, *femina sulcata.*

costalis. 1. D. niger, capitis fascia, thoracis margine elytrorumque stria costali ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 291. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 189. *n.* 2.
Habitat in Surinamo. Femina *obscurior.*

marginalis. 7. D. niger, thoracis marginibus omnibus elytrorumque exteriori flavis. *Fn. suec.* 769. *Scop. ent. carn.* 294. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.*186. *n.*2. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 291. *n.*3. *mant. inf.*1. *p.*189. *n.*3.
Degeer inf. 4. *p.* 391. *n.* 2. *t.* 16. *f.* 2. Dytiscus nigro-fuscus nitidus.

Hydrophili & Dytisci *in aquis & humidis habitant, egregie natant, dorso impositi circumgyrando exsiliunt, in umbra quiescunt, noctu volitant, diutius in sicco servati difficilius submergi possunt; maribus pedum anteriorum planta semisphæricæ, feminis elytra sæpius sulcata, priores dermestidi, posteriores carabis affines; ceterum sexus discerni, species determinari difficulter possunt; larvæ subaquaticæ voracissimi aquatilium crocodili, pisces ipsos occidunt innumeros, uti Baruthi 1762. teste Schrebero neve Summi. 1763. 3. p. 689. de semistriato, alias de latissimo compertum est.*

Mouff. inf. 164. Hydrocantharis.
Raj. inf. p. 93. *n.* 1. Hydrocantharis noſtras.
Aldr. inf. 707.
Liſt. mut. t. 5. *f.* 2.
Roeſ. inf. 2. *aq.* 1. *t.* 1. *f.* 9. 11.
Sulz. hiſt. inf. t. 6. *f.* 42.
Schaeff. ic. t. 8. *f.* 8.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 1. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1. & *t.* [illegible] *f.* 1. 2. & (*larv. pupp.*) *t.* 7. *f.* 4. 5. ß) 1. *t.* [illegible] *f.* 1.
Habitat in Europa.

semi-striatus. 8. D. fuſcus, elytris ſulcis dimidiatis decem vel-loſis. *Fn. ſuec.* 772. * *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 185. *n.* 3. *t.* 3. *f.* 2.
Fn. ſuec. 1. *n.* 568. Dytiſcus ſupra fuſcus, ſubtus ater.
Raj. inf. p. 94. *n.* 2. Hydrocantharis elytris ſtriatis ſive canaliculatis.
Friſch. inf. 2. *t.* 7. *f.* 4.
Br[illegible]. nat. t. 26. *f.* 2.
Roeſ. inf. 2. *aq.* 1. *t.* 1. *f.* 10.
Degeer inſ. 4. *p.* 391. *n.* 2. *t.* 16. *f.* 1.
Schaeff. ic. t. 8. *f.* 7.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 2. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 2.
Fn. ſuec. 1. *n.* 567. Dytiſcus elytris ſtriis 20 dimidiatis.
Habitat in Europa, *enſe recurvo, acuto, recondito, inſtrumentus, ova oblonga, magna, alba pariens, marginalis, ut videtur, femina.*

punctu-latus. 2. D. niger, clypeo thoracis elytrorumque margine exteriori albis, elytris ſtriis tribus punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 292. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 4.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 185. *n.* 1. Dytiſcus margine coleoptrorum thoracisque flavo.
Degeer inſ. 4. *p.* 396. *n.* 3. Dytiſcus laterali-marginatus. *Mull.*

Mull. zool. dan. prodr. p. 70. *n.* 664. Dytiſcus virens.
Roeſ. inſ. 2. *aq.* 1. *t.* 2.
Friſch inſ. 13. *t.* 1. *f.* 7.
Schaeff. elem. t. 7.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 31. *n.* 45. *t.* 6. *f.* 4. 5. *t.* 8. *f.* 4. & *t.* 9. *f.* 2.
β) *Bergſtr. nomencl.* 1. *t.* 8. *f.* 6. 7.
Habitat in Germaniæ *rivulis ſilvaticis.*
Femina *elytrorum ſulcis decem dimidiatis.*

imbatus. 3. D. niger, thoracis elytrorumque margine exteriori flavo, elytris lævissimis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 292. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 5.
Habitat in Siam, & India, *abdomine atro: punctis utrinque* 3 *ferrugineis.*

ruficollis. 4. D. niger, fronte thoraceque fulvis, elytris ſtriga baſeos margineque exteriori teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 189. *n.* 6.
Habitat in Siam, *ſulcati magnitudine.*

ſtriatus. 9. D. fuſcus, elytris tranſverſim ſubtiliſſime ſtriatis. *Fn. ſuec.* 770. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 9.
Degeer inſ. 4. *p.* 399. *n.* 5. *t.* 15. *f.* 16. Dytiſcus tranſverſe ſtriatus.
Habitat in Europa.

fuſcus. 10. D. fuſcus, elytris tranſverſe ſubſtriatis.
Habitat in Europa, *an ſpecie diſtinctus a ſtriato?*

Lanio. 5. D. niger, ore verticis punctis duobus thoracisque marginibus rufis, elytris fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 10.
Habitat in Madera.

cicurius. 24. D. ater lævis, ore verticis puncto thoracisque mar-

margine rufis, elytris flavo ſtriatis. *Fabr.* *inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 11.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magnitudine ſtria*

vittatus. 25. D. ater lævis, elytris vitta marginali flav macula baſeos atra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 12.
Habitat in India.

cinereus. 11. D. cinereus, elytrorum margine thoracisq medietate flavis. *Fn. ſuec.* 771. *Geoffr. inſ. par.* *p.* 188. *n.* 4. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* 11. *mant* *inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 13.
Degeer inſ. 4. *p.* 397. *n.* 14. Dytiſcus faſciatus.
Liſt. mut. t. 5. *f.* 1.
Petiv. gaz. t. 70. *f.* 3.
Act. Nidroſ. 425. *t.* 70. *f.* 3.
Huffn. inſ. 2. *t.* 12.
Roeſ. inſ. 2. *aq.* 1. *t.* 3. *f.* 6.
Schaeff. ic. t. 90. *f.* 7.
Habitat in Europa, *frequentiſſimus.*

griſeus. 26. D. cinereus, elytris faſcia dentata nigra. *Fa* *ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* *n.* 14.
Habitat in India, *cinereo paulo major.*

ſtictiſcus. 12. D. pallens, elytris griſeis: puncto oblongo terali impreſſo nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 15.
Habitat in Africa.

decempunctatus. 27. D. ater glaber, elytris punctis albis quinq *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 294. *n.* 14. *mant. inſ.* *p.* 190. *n.* 16.
Habitat in nova Hollandia.

ſulcatus. 13. D. elytris ſulcis decem longitudinalibus villo ſis.

fis. *Fn. suec.* 773. * *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 189. *n.* 5. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 292. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 7.
Raj. inf. p. 94. *n.* 3. & 10. Hydrocantharis minor, corpore rotundo plano.
Bradl. mut. t. 26. *f.* 2. A.
Frisch inf. 13. *p.* 13. *t.* 7.
Roes. inf. 2. *aq.* 1. *t.* 3. *f.* 7.
Schaeff. ic. t. 3. *f.* 3.
Bergstr. nomencl. 1. *t.* 5. *f.* 3-5. & *t.* 7. *f.* 6. 7.
Habitat in Europa & America, *maris elytris glabris.*

fasciatus. 28. D. elytris flavis: fasciis duabus punctoque apicis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 293. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 8.
Habitat in India.

erythrocephalus. 14. D. ovato-oblongus niger, capite pedibusque rufis. *Fn. suec.* 774. * *Degeer inf.* 4. *p.* 404. *n.* 12. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 29. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 31.
Habitat in Europa.

planus. 29. D. ovato-oblongus planus niger, tibiis tarsis rufis. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 501. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 32.
Habitat in Dania, *statura erythrocephali.*

varius. 30. D. thorace rufo, elytris cinereo nigroque striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 295. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 33.
Habitat in Patagonia.

notatus. 31. D. fuscus, thorace flavo: punctis quatuor nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 296. *n.* 26. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 34.
Bergstr. nomencl. 1. *t.* 5. *f.* 10.

Ha-

Habitat in Germania, *statura palustris, thorax interdum rufo, aut punctis fasciave abbreviata cinereis vario.*

depressus. 32. D. thorace ferrugineo: punctis duobus basi nigris, elytris fuscis ferrugineo maculatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 296. *n.* 27. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 35.
Habitat in Suecia.

dorsalis. 33. D. capite thoracis margine elytrorumque puncto baseos distincto margineque inæquali ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 36.
Habitat Kilonii, *sexpustulato affinis, at major.*

sexpustulatus. 34. D. ater, capite ferrugineo, elytris maculis tribus rufis: baseos majore. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 296. *n.* 28. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 37.
Habitat in Suecia *aquis stagnantibus.*

maculatus. 15. D. niger, thorace nigro: fascia pallida elytris albo nigroque variis. *Fn. suec.* 777. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 296. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 38. *Uddm. diss.* 43.
Habitat in Europa.

ferrugineus. 16. D. ferrugineus totus.
Habitat in Europa, *cimicis magnitudine.* Ascanius.

bipustulatus. 17. D. ater lævis, capite posterius punctis duobus rubris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 294. *n.* 15. *mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 17.
Degeer inf. 4. *p.* 401. *n.* 8? Dytiscus ater.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 189. *n.* 6.? Dytiscus totus niger lævis.
Schaeff. ic. t. 8. *f.* 9.
Habitat in Europa boreali.

cin-

cinctus. 35. D. capite thoraceque flavis, elytris nigris: margine omni albo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 294. *n.* 16. *mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 18.
Habitat in America.

bipunctatus. 36. D. ater thorace flavo: punctis duobus nigris, elytris flavo fuscoque variis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 19.
Habitat in Germania, *mediæ magnitudinis.*

fenestratus. 37. D. subtus ferrugineus, supra niger, elytris punctis duobus fenestratis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 294. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 20.
Habitat Hamburgi, *statura bipustulati.*

Hübneri. 38. D. lævis ater, ore thoracisque margine ferrugineis, elytris linea marginali flava. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 190. *n.* 21.
Habitat in Germania, *magnitudine & statura transversalis.*

lagnalis. 39. D. lævis niger, thorace anterius ferrugineo, elytris fuscis flavo lineatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 191. *n.* 22.
Habitat in Germania, *statura & magnitudine transversalis.*

transversalis. 40. D. ater, thorace anterius ferrugineo, elytrorum margine strigaque baseos abbreviata flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 294. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 191. *n.* 23.
Mull. zool. dan. prodr. p. 71. *n.* 668. Dytiscus niger, thorace utrinque fasciaque antica, elytris margine lineaque transversa baseos flava.
Pontopp. atl. Dan. 1. *t.* 29.
Bergstr. nomencl. 1. *t.* 5. *f.* 6.
Habitat in Europa.

Her-

Hermanni. 41. D. gibbus, capite thoracе elytrorumque basi ferrugineis, elytris truncatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 295. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 191. *n.* 24. *Fabr. syst. ent. p.* 232. *n.* 14. Dytiscus gibbus elytris fascia undata baseos ferruginea.
β) *Herbst. Besch. der berl. naturf. Fr.* 4. *t.* 7. *f.* 3. Dytiscus tardus.
γ) *Schranck enum. inf. austr. n.* 379. Dytiscus undulatus.
Habitat in Alsatiæ *aquis stagnantibus.*

abbreviatus. 42. D. niger elytris stria abbreviata baseos punctisque duobus flavescentibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 191. *n.* 25.
Habitat Kilonii, *statura transversalis, at duplo minor.*

gibbus. 43. D. gibbus ferrugineus, elytris nigris apice acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 295. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 191. *n.* 26.
Habitat Kilonii, *in aquis stagnantibus.*

hæmorrhoidalis. 44. D. niger, thorace elytrorumque basi apiceque ferrugineis.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 191. *n.* 27.
Habitat Kilonii, *magnitudine uliginosi.*

ovatus. 18. D. ovatus fuscus, capite thoraceque ferrugineis. *Fn. succ.* 2282. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 296. *n.* 30. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 39.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 191. *n.* 10. Dytiscus ovatus fuscus, capite thoraceque rubicundis.
Degeer inf. 4. *p.* 402. *n.* 9. *t.* 14. *f.* 17-19. Dytiscus sphæricus.
Habitat in Europæ *aquis stagnantibus, consueto interdum duplo major, margine elytrorum albo-maculato.*

pi-

picipes. 45. D. niger, thorace anterius ferrugineo, elytris flavo lineatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 40.
Habitat in Germania, *parvus*.

lituratus. 46. D. niger, elytris basi lituraque apicis pallidis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 296. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 41.
Habitat in Italia, *parvus*.

chrysomelinus. 47. D. supra cinereus subtus niger. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 42.
Habitat in Germania, *parvus*.

signatus. 48. D. niger, capite thoraceque rufis: signaturis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 296. *n.* 32. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 43.
Habitat in Patagonia.

halensis. 49. D. ater, thorace rufo: baseos medio nigro: puncto rufo, elytris cinereis nigro striatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 44.
Habitat in Germania, *parvus*, *planus*.

palustris. 19. D. niger laevissimus, elytris lituris duabus lateralibus albidis. *Fn. suec.* 775. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 296. *n.* 29. *mant. inf.* 1. *p.* 192. *n.* 38.
Habitat in Europa, *thorace ferrugineo*.

uliginosus. 20. D. ater nitidus, antennis, pedibus elytrorumque latere exteriore ferrugineis. *Fn. suec.* 776.* *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 295. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 191. *n.* 28.
Habitat in Europa.

irroratus. 50. D. testaceus nigro irroratus, capite pectoreque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 295. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 191. *n.* 29.
Habitat in America.

bi-

bimaculatus. 21. D. teſtaceus, elytris macula nigricante. *Habitat in* Gallia, *magnitudine feminis oryzæ, elytris ſubſtriatis.* Gouan.

granularis. 22. D. niger, elytris lineis duabus flaveſcentibus, pedibus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 296. *n.* 33. *mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 45.
Scop. ent. carn. n. 297. Dytiſcus minimus.
Habitat in Europæ *borealis aquis ſtagnantibus, lentis magnitudine.*

confluens. 51. D. niger, capite thoraceque ferrugineis, elytris pallidis: lineis quatuor diſci nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 46.
Habitat Kilonii, *parvus.*

obliquus. 52. D. ferrugineus, elytris maculis quinque obliquis fuſcis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 47.
Habitat Kilonii, *ſtatura granularis.*

impreſſus. 53. D. oblongus flaveſcens, elytris cinereis: punctis impreſſis ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 48.
Schall. Abh. der hall. naturf. Fr. 1. *p.* 312. Dytiſcus impreſſo-punctatus.
Habitat in Europa.

lineatus. 54. D. ferrugineus, coleoptris fuſcis: lineis flaveſcentibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 297. *n.* 34. *mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 49.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 32. *n.* 8. 9. *t.* 6. *f.* 8. 9.
Habitat in Alſatiæ *aquis ſtagnantibus.*

inæqualis. 55. D. ferrugineus, elytris nigris: lateribus inæqualiter ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 297. *n.* 35. *mant. inſ.* 1. *p.* 193. *n.* 50.
Habitat in Sueciæ *aquis ſtagnantibus.*

mi-

minutus. 23. D. elytris fuscis basi lateribusque pallidis, thorace flavo immaculato, corpore ovato. *Fn. suec.* 778. *

Fabr. sp. inf. 1. *p.* 297. *n.* 36. *mant. inf.* 1. *p.* 193. *n.* 51. Dytiscus flavescens, elytris fuscis, margine flavo maculato.

Degeer inf. 4. *p.* 404. *n.* 18. *t.* 16. *f.* 9. Dytiscus ruficollis.

Habitat in Europa.

crassicornis. 56. D. fuscus, capite thoraceque flavis, antennis medio incrassatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 193. *n.* 52. *Mull. zool. dan. prodr. n.* 779. Dytiscus crassicornis.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 193. *n.* 15.

Degeer inf. 4. *p.* 402. *n.* 10. Dytiscus clavicornis.

Habitat in Europæ *magis boreali*, *parvus.*

pictus. 57. D. ferrugineus, thorace ferrugineo, elytris pallidis, sutura maculaque laterali nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 194. *n.* 53.

Habitat in Germania, *minutus.*

pusillus. 58. D. ater, thorace elytrisque margine albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 297. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 194. *n.* 54.

Habitat in Italia, *vix pediculi magnitudine.*

ovalis. 59. D. elytris fuscis pallido lineatis, thorace ferrugineo, abdomine atro. *Thunb. nov. act. Upf.* 4. *p.* 19. *n.* 33.

Habitat Upsaliæ, *magnitudine nitidulæ aquaticæ*, *ovato major.*

intricatus. 60. D. flavicans, supra nigro-virens intricatus, elytris excavato-striatis: margine apice thoraceque flavis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Ges.* 1. *p.* 311.

Mull.

Mull. Naturf. 7. p. 99. Dytiſcus ſemiſulcatus.
Habitat Halæ Saxonum *in ſtagnis, ſtatura & magnitudine punctulati.*

verſicolor. 61. D. fulvus, elytris maculis oblongis nigris. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. p. 313.*
Habitat Halæ Saxonum *in ſtagnis, ovatus, magnitudine chryſomelæ nemorum.*

Schalleri. 62. D. niger, capite thorace pedibusque ferrugineis, elytris fuſcis: margine extimo ruſo. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. p. 313.*
Habitat Halæ Saxonum.

laminatus. 63. D. fulvus, elytris ſtriatis nigro punctatis, laminis duabus ad baſin abdominis. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ. 1. p. 314.*
Habitat, rarior, Halæ Saxonum, *magnitudine chryſomelæ nemorum.*

aciculatus. 64. D. thoracis elytrorumque margine maculisque tribus abdominis flavis, elytris ſtriis excavatis decuſſantibus abruptis. *Herbſt apud Fuesslii arch. inſ. 5. p. 123. n. 4.*
Habitat in India, *limbato affinis.*

fuſculus. 65. D. ater, elytris fuſcis lævibus, pedibus obſcure teſtaceis. *Schranck inſ. auſtr. p. 203. n. 382. Geoffr. inſ. par. 1. p. 190.*
Habitat in Auſtria *ſuperiore.*

oculatus. 66. D. capite cinereo: margine poſteriori maculisque duabus trigonis frontis nigris, elytris piceis: margine omni flavo. *Herbſt apud Fuesslii arch. inſ. 5. p. 125. n. 13.*
Habitat Berolini, *in paludibus, 5 fere lineas longus.*

or-

ornatus. 67. D. niger, subtus piceus, ore, maculis elytrorum, & duabus inter oculos rotundis, thorace & antennis ferrugineis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 125. *n.* 15. *t.* 28. *f.* B.
Habitat Berolini, 4 *lineas longus.*

unilineatus. 68. D. niger, elytrorum margine fisso lineaque dimidia flavescentibus. *Schranck inf. austr. p.*204. *n.* 384.
Habitat in Germania.

dispar. 69. D. niger; lævis, ore flavo, elytris variegatis thoraceque piceis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 126. *n.* 18.
Habitat Berolini, 1½-3 *lineas longus.*

sordidus. 70. D. niger, antennis ferrugineis apice nigris, pedibus piceis, elytris atris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 126. *n.* 19.
Habitat Berolini, 2 *lineas longus.*

insularius. 71. D. subtus spadiceus, capite thoraceque luteis, elytris nigris punctatis cancellatis: margine fulvo. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.*127. *n.*20.
Habitat Pomerania, *vix* 2 *lineas longus.*

aquaticus. 72. D. spadiceus, oculis, elytris thorace & ventre nigris, thoracis fascia media & margine spadiceis, elytrorum margine obsolete ferrugineo. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 127. *n.* 21.
Habitat Berolini, *ultra* 2 *lineas longus.*

parvulus. 73. D. subtus piceus, capite thoraceque fulvis, elytris nigris: margine striisque duabus dimidiatis flavis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 127. *n.* 22.
Habitat Berolini, *vix* 1½ *lineas longus.*

pi-

piceolus. 74. D. subtus niger, capite thoraceque spadiceis, elytris piceis: margine obsolete fulvo. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 127. *n.* 23.
Habitat Berolini, $3\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

simplex. 75. D. niger, capite, thoracis elytrorumque margine, antennis pedibusque piceis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 127. *n.* 24.
Habitat Berolini, *statura & magnitudine undulati.*

capricornis. 76. D. luteſcens, ventre oculisque nigris, antennarum articulis mediis multo latioribus, elytris fuſcis punctato-excavatis. *Fuessli apud Herbst arch. inf.* 5. *p.* 128. *n.* 25. *t.* 28. *f.* C. & b. c.
Habitat Berolini, 2 *lineas longus.*

variolosus. 77. D. flaveſcens, ſubtus ex fuſco luteis, oculis nigris, elytris ex viridi luteſcentibus, variegatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 128. *n.* 26.
Habitat Berolini, *statura & magnitudine capricornis.*

orbicularis. 78. D. niger, lævis, antennis pedibusque ferrugineis, thorace elytrisque ex luteo fuſcis pellucidis: maculis obſoletis nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 128. *n.* 27.
Habitat Berolini, *vix lineam longus.*

pediculatius. 79. D. lævis, ſubtus thorace elytrisque fuſcis, capite nigro, pedibus piceis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 5. *p.* 128. *n.* 28.
Habitat Berolini, $\frac{1}{2}$ *lineam longus.*

marginellus. 80. D. niger, thoracis margine flavo, elytris flaveſcentibus ſeriatim punctatis: maculis obſoletis nigricantibus. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 129. *n.* 29.
Habitat Berolini, 1-$1\frac{1}{2}$ *lineam longus.*

ſe-

seminulum. 81. D. niger lævis, elytris pellucidis ſpadiceis: apice rubro, pedibus ferrugineis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 6. *p.* 129. *n.* 30.
Habitat Berolini, *vix ultra lineam longus.*

oblongus. 82. D. obſolete niger, capite, antennis pedibusque ferrugineis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 6. *p.* 129. *n.* 31.
Habitat Berolini, *fuſculo affinis, 2 lineas longus.*

Zeylanicus. 83. D. niger, thorace elytrorumque margine flavo, ſterno mutilo. *Gron. muſ.* 2. *p.* 164. *n.* 552.
Habitat in Zeylon.

Gronovii. 84. D. niger lævis, antennis ferrugineis, capite poſterius maculis binis rubris. *Gron. muſ.* 2. *p.* 164. *n.* 555.
Habitat - - - *an diverſus a bipuſtulato?*

Scopolii. 85. D. niger, thoracis margine lineaque media tranſverſa rufis, elytris teſtaceis ſubpellucidis: poſterius faſcia abrupta punctisque plurimis atris. *Scop. ent. carn. n.* 295.
Habitat in Carniola.

glaber. 86. D. fuſcus, elytris glabris, ventre pedibusque ferrugineis. *Froſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 55. *n.* 55.
Habitat in Angliæ *aquis ſtagnantibus, ſiriato affinis.*

nebulosus. 87. D. lividus nigro-nebuloſus, antennis pedibusque ferrugineis ventre atro: margine ferrugineo. *Forſt. nov. inſ ſp.* 1. *p.* 56. *n.* 56.
Habitat in Angliæ *aquis ſtagnantibus, magnitudine uliginoſi.*

exſoletus. 88. D. lividus, antennis, capite, thorace, abdomine pedibusque pallidis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 57. *n.* 57.

Ha-

Habitat in Angliæ *aqua ſtagnante inter lemnum, cimicis fere magnitudine.*

danicus. 89. D. niger, margine thoracis extimo elytrorumque flavo. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 71. *n.* 669.
Habitat in Dania.

Mulleri. 90. D. elytris acuminatis glabris apice bipunctatis. *Mull. Fn. Fridrichſd. p.* 20. *n.* 194. *zool. dan. prodr. p.* 71. *n.* 670.
Habitat in Dania.

lacuſtris. 91. D. flavicans, thoracis margine flavo, elytris ſparſim punctatis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 71. *n.* 671.
Habitat in Dania.

piceus. 92. D. niger, corpore ſubtus & thoracis elytrorumque margine ferrugineo. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 71. *n.* 673.
Habitat in Dania.

fœtidus. 93. D. ferrugineus, ſupra niger, margine thoracis elytrorumque extimo flavo. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 71. *n.* 674.
Habitat in Dania.

Comma. 94. D. flavicans, ſupra nigro-æneus, elytrorum margine exteriore lineolaque luteſcente. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 71. *n.* 676.
Habitat in Dania.

quadripunctatus. 95. D. ferrugineus, elytris nigris: faſcia, maculaque quatuor albis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 71. *n.* 677.
Habitat in Dania.

biocellatus. 96. D. rufus, elytris æneis: maculis albis longitu-

tudinaliter disposítis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 72. *n.* 768.
Habitat in Dania.

erythro-melas. 97. D. niger, antennis trasisque rufis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 72. *n.* 770.
Habitat in Dania.

roridus. 98. D. flavus, thorace macula media, elytris nigro irroratis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 72. *n.* 771.
Habitat in Dania.

rubripes. 99. D. nigro-æneus nitidus, antennis, pedibus, elytrorum apice punctisque duobus ferrugineis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 72. *n.* 772.
Habitat in Dania.

quadricolor. 100. D. ovatus rufus, thoracis medio nigro, elytris fuscis: margine inferiore punctoque baseos flavis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 780.
Habitat in Dania.

cimicoides. 101. D. virens, elytris virescentibus: margine inferiore maculisque albis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 781.
Habitat in Dania.

velox. 102. D. ovatus rufus, elytris striis octo fuscis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 783.
Habitat in Dania.

nanus. 103. D. niger, thorace anterius flavo, elytris fulco abrupto, pedibus piceis. *Mull. zool. dan. prodr.* 73. *n.* 784.
Habitat in Dania.

rufifrons. 104. D. niger, thorace utrinque, elytris basi la-

lateribusque flavis, capite pedibusque rufis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 785.
Habitat in Dania.

tricolor. 105. D. rufus, elytris luteis: disco macula communi nigra sinuata. *Mull. prodr. zool. dan. p.* 73. *n.* 786.
Habitat in Dania.

exilis. 106. D. ovatus niger, antennis basi pedibusque ferrugineis, elytris lævibus. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 788.
Habitat in Dania.

quadripustulatus. 107. D. niger, elytris maculis quatuor flavis, pedibus rufis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 789.
Habitat in Dania.

flavicans. 108. D. ater, supra flavicans, thorace posterius, elytris striis maculisque nigris. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 74. *n.* 790.
Habitat in Dania.

nævius. 109. D. fulvus, maculis sparsis nigris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 189. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

fimbriatus. 110. D. fuscus, elytris anterius & exterius flavis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 190. *n.* 8.
Habitat in Gallia.

rufipes. 111. D. ovatus ater, pedibus antennarumque basi ferrugineis, elytris punctatis subpubescentibus. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 73. *n.* 782.
Fn. suec. 1. *n.* 568. 2. *p.* 216. *n.* 772. b.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 190. *n.* 9 ♀
Habitat in Europa.

gib-

gibbus. 112. D. flavicans, capite thoraceque virente, elytris obscure lævibus. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 72. *n.* 778.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 191. *n.* 11.
Habitat in Europa.

quadrimaculatus. 113. D. niger, thorace flavo, elytris lævibus: maculis limboque luteis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 192. *n.* 13.
Habitat in Gallia.

unistriatus. 114. D. niger, elytris maculis & limbo luteis: stria unica. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 192. *n.* 14.
Habitat in Gallia.

bilineatus. 115. D. elytris fuscis, corpore subtus fulvo, thorace fulvo: linea duplici nigra. *Degeer inf.* 4. *p.* 400. *n.* 6.
Habitat in Europa, 7 *lineas longus.*

seminiger. 116. D. corpore subtus toto nigro, thorace elytrisque obscure fuscis: margine rufo. *Degeer inf.* 4. *p.* 401. *n.* 7.
Habitat in Europa, 7 *lineas longus.*

nubilus. 117. D. niger, supra maculis striisque griseis, pedibus rufo-fuscis. *Degeer inf.* 4. *p.* 403. *n.* 11.
Habitat in Europa, *minutus.*

hyalinus. 118. D. virescens, elytris hyalinis: maculis lateralibus albidis. *Degeer inf.* 4. *p.* 406. *n.* 14. *t.* 15. *f.* 21-23.
Habitat in Europa, 2½ *lineas longus, velocissime natans.*

virescens. 119. D. testaceus supra virescens, thoracis elytrorumque marginibus externis flavis, his longitu-

dinaliter ſtriatis, pedibus poſterioribus craſſioribus. *Muſ. Lesk. p.* 35. *n.* 778.
Habitat in Europa.

teſtaceus. 120. D. teſtaceus, thoracis margine anteriori & poſteriori fuſcis, medio, elytrorum linea futurali atomisque marginalibus lividis. *Muſ. Lesk. p.* 35. *n.* 783.
Habitat in Europa.

niger. 121. D. niger, thorace margine antico externis latiore, elytrorum marginibus lividis longitudinaliter ferrugineo punctatis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 784.
Habitat in Europa.

carbonarius. 122. D. oblongo-ovatus niger, antennis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 778.
Habitat in Europa.

bilobus. 123. D. oblongo-ovatus niger, ore, verticis macula biloba, thorace, elytrorum linea futurali baſi marginibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 789.
Habitat in Europa, *thoracis diſco macula transverſa nigra picto.*

ferrugineus. 124. D. ferrugineus, capite thoracisque margine poſteriori nigris, illo antenas, maculis inter oculos duabus, thorace elytrorum linea futurali marginibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 790.
Habitat in Europa.

flavus. 125. D. flavus, ore, punctis inter oculos duobus, thoracis elytrorumque marginibus externis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 36. *n.* 791.
Habitat in Europa.

tri-

tricolor. 126. D. ferrugineus, capite, thorace elytrisque testaceo-fuscis, maculis inter oculos duabus ferrugineis, ore, thoracis elytrorumque marginibus pallidis. *Mus. Lesk. p.* 36. *n.* 792.
Habitat in Europa.

denigratus. 127. D. niger, ore, punctis inter oculos duobus & abdomine luteis: segmentis utrinque macula nigra, elytris fuscis: atomis marginibusque externis lividis. *Mus. Lesk. p.* 36. *n.* 793.
Habitat in Europa.

unipunctatus. 128. D. ater, antennis ferrugineis, elytris pone medium utrinque puncto testaceo. *Mus. Lesk. p.* 36. *n.* 795.
Habitat in Europa.

bigguttatus. 129. D. niger, pedibus, abdominis apice, antennis, ore punctis inter oculos duobus, thorace elytrisque testaceis, his fusco maculatis, thoracis medio guttis duabus nigris. *Mus. Lesk. p.* 36. *n.* 796.
Habitat in Europa.

octomaculatus. 130. D. lividus, thorace viridi-livido, elytris fusco-lividis: singulis maculis quatuor connatis striisque brevibus pone medium lividis. *Mus. Lesk. p.* 36. *n.* 802.
Habitat in Europa.

lividus. 131. D. lividus, capite angusto, thorace anterius angustiore, elytris punctis fuscis in strias seriatis. *Mus. Lesk. p.* 37. *n.* 805.
Habitat in Europa.

quadrilineatus. 132. D. niger, elytris profunde punctatis fuscescentibus: lineis quatuor marginibusque externis

nis flavescentibus ramosis, pedibus ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 37. *n.* 809.
Habitat in Europa.

denticulatus. 133. D. piceus, ore antennisque ferrugineis, elytris glabris: baseos fascia bidentata, maculisque tribus, & margine externo, thorace anterius pedibusque pallidis. *Mus. Lesk. p.* 37. *n.* 810.
Habitat in Europa.

213. CARABUS. *Antennæ* filiformes.
Palpi sex: articulo ultimo obtuso, truncato.
Thorax obcordatus, apice truncatus, marginatus.
Elytra marginata.

* *majores.*

maxillosus. 44. C. apterus ater, mandibulis exsertis longitudine capitis, thorace posterius producto bilobo. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 298. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 194. *n.* 1.
Thunb. nov. inf. sp. 4. *p.* 69. Carabus apterus ater, thorace postice producto bilobo unicolore.
Voet coleoptr. t. 39. *f.* 47. 48.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. *t.* 47. *f.* 3.
Habitat ad Caput bonæ spei, *congenerum maximus.*

thoracicus. 45. C. apterus ater, thorace posterius producto bilobo: lateribus elytrorumque marginibus albo-villosis. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 69. *f.* 82. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 195. *n.* 2. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. *t.* 47. *f.* 2.
Habitat ad Caput bonæ spei, *maxillosо proxime affinis.*

co-

coria-ceus. 1. C. apterus ater opacus, elytris connatis: punctis intricatis subrugosis. *Scop. ent. carn.* 265. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 298. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 195. *n.* 3.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 141. *n.* 1. Bupreſtis ater, elytris rugoſis.
Sulz. hiſt. inf. 1. *t.* 6. *f.* 44.
Poda inf. 45.
Pontopp. atl. Dan. 1. *t.* 29.
Degeer inf. 4. *p.* 9. *n.* 4.
Schaeff. ic. t. 36. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 38. *f.* 43.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 13. *f.* 7.
Habitat in Germaniæ *ſilvis*, *inter maximos europæos.*

variolo-ſus. 46. C. apterus ater, elytris punctis varioloſis impreſſis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 195. *n.* 4.
Habitat in Tranſylvania, *magnus.*

granula-tus. 46. C. apterus nigricans, elytris æneis ſtriatis: interjectis punctis elevatis longitudinalibus. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 301. *n.* 17. *mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 25.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 668. *n.* 2. *Fn. ſuec.* 780. Carabus apterus, elytris longitudinaliter convexe-punctatis.
Fn. ſuec. 511. Carabus ater, &c.
Degeer inf. 4. *p.* 82. *n.* 2. Carabus ſubapterus, &c.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 143. *n.* 3. Bupreſtis niger, &c.
Sulz. hiſt. inf. t. 7. *f.* 2.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 6.
Voet coleoptr. t. 37. *f.* 31.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 12. *f.* 4. 5.
β) Carabus niger, elytris ſubvireſcentibus convexe punctatis ſtriatisque. *Fn. ſuec.* 512.

γ)

γ) Carabus purpurascenti-niger, elytris convexis punctatis striatisque. *Fn. suec.* 513.
Hufn. inf. 2. *t.* 3.
Habitat in Europæ arvis.

hortensis. 3. C. apterus niger, elytris lævibus, punctis æneis excavatis triplici serie, margine cyaneo. *Fn. suec.* 783. *Strocm. act. Nidros.* 3. *p.* 401. *t.* 6. *f.* 7. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 300. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 196. *n.* 16.
Degeer inf. 4. *p.* 90. *n.* 5. *t.* 3. *f.* 1. Carabus striatus.
Raj. inf. p. 96. *n* 2. *List. mut. t.* 8. *f.* 4. Cerambix purpurea punctata.
Schaeff. ic. t. 11. *f.* 3.
Voet coleoptr. t. 37. *f.* 33.
Bergstr. nomencl. 1. *t.* 10. *f.* 4. 5.
Habitat in Europæ *hortis & silvis, elytrorum punctis interdum concoloribus.*

tædatus. 47. C. apterus niger, elytris sublævibus fuscis: punctis excavatis triplici serie. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 196. *n.* 17.
Habitat in America *boreali, statura & magni odine hortensis.*

arvensis. 48. C. apterus nigro-cupreus, elytris striatis: punctis excavatis triplici serie. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 196. *n.* 18.
Habitat in Germania, *statura tædati, at paulo minor.*

calidus. 49. C. apterus niger, elytris crenato-striatis punctisque aureis excavatis triplici serie. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 300. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 19.
Habitat in insulis, Americæ *meridionali oppositis.*

retusus. 50. C. apterus, elytris striatis virescentibus: punctis

ctis æneis excavatis triplici ſerie, baſi retuſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 20.
Habitat ad Patagoniæ *littora.*

Maderæ. 51. C. apterus ater, elytris baſi retuſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 301. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 21.
Habitat in inſula Madera.

convexus. 52. C. apterus convexus ater lævis, thorace poſterius emarginato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 301. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 22.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 6. *t.* 29. *f.* 2.
Habitat in Germaniæ *ſilvis.*

leucophtalmos. 4. C. elytris lævibus: ſtriis obſoletis octo. *Fn. ſuec.* 784. *
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 304. *n.* 29. *mant. inſ.* 14. *p.* 198. *n.* 41. Carabus elatus ater, elytris ſtriatis, thorace canaliculato.
Degeer inſ. 4. *p.* 96. *n.* 13. Carabus niger ſtriatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 146. *n.* 7. Bupreſtis ater, elytro ſingulo ſtriis 8 lævibus, pedibus nigris.
Liſt. ſcar. angl. p. 390. *n.* 23. Scarabæus ex toto niger.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 2.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 9. *n.* 13. *t.* 1. *f.* 13.
β) Carabus niger. *Schall. Abh. der hall. Naturf. Geſ.* 1. *p.* 315.
Habitat in Europæ *quiſquiliis frequens, magnitudine varius, thorace, quam in congeneribus, minore.*

attelaboides. 53. C. apterus ater, thorace anguſtiori, capite poſterius attenuato, elytris ſulcatis truncatis, *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 305. *n.* 30. *mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 42.
Habitat in Coromandel, *magnitudine leucophthalmi.*

tri-

trilineatus. 54. C. apterus ater, thorace posterius angustato: marginibus albis, elytris albidis: sutura lineaque atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 305. *n.* 31. *mant. inf.* 1. *p.* 198. *n.* 43. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 71. *f.* 85. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. *t* 47. *f.* 6.
Habitat in Coromandel, & *ad* Caput bonæ spei, *prioribus minor.*

cicindeloides. 289. C. apterus ater, thorace posterius angustato, elytris ovatis planis ferrugineis villosis: margine albo. *Swederus nov. act. Stockh.* 8. 1787. *n.* 3. 24.
Habitat ad Caput bonæ spei, *trilineato affinis*, *at paulo major, cicindelæ facie.*

elathratus. 5. C. apterus nigricans, elytris æneis porcatis interjectis punctis excavatis longitudinalibus. *Fn. suec.* 782. *
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 302. *n.* 18. *mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 26. Carabus apterus nigricans, elytris æneis striatis interjectis punctis excavatis cupreis.
Habitat in Europa.

porcatus. 55. C. apterus ater, elytris striatis apice granulatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 302. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 27.
Habitat in nova Hollandia.

reflexus. 56. C. apterus ater, thoracis margine rotundato reflexo, elytris sulcatis: maculis duabus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 302. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 179. *n.* 28.
Habitat in Coromandel.

angulatus. 57. C. apterus hirtus ater, thorace canaliculato, coleoptris sulcatis: fasciis duabus flavis interruptis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 302. *n.* 21. *mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 29.

Ha-

Habitat in Coromandel, *reflexo affinis.*

nitens. 6. C. apterus, elytris porcatis: ſtriis paſſim interruptis ſulcisque ſcabriuſculis inauratis. *Fn. ſuec.* 185. * *It. oel.* 96. *Scop. ent. carn.* 262. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*302. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 30. Carabus apterus, elytris porcatis ſcabris viridibus: margine aureo.
Degeer inſ. 4. *p.* 91. *n.* 6. Carabus aureus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 3.
Schaeff. ic. t. 51. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 38. *f.* 41.
Habitat in Europæ *ſilvis.*

auratus. 7. C. apterus, elytris porcatis: ſtriis ſulcisque lævibus inauratis. *Fn. ſuec.* 780. *
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 301. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.*197. *n.* 23. Carabus apterus, elytris auratis ſulcatis, antennis pedibusque rufis.
Degeer inſ. 4. *p.* 104. *n.* 1. *t.* 7. *f.* 20. Carabus ſulcatus.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 142. *n.* 2. *t.* 2. *f.* 5. Bupreſtis viridis, &c.
Raj. inſ. p. 96. *n.* 6. Cerambyx dorſo in longas regulas diviſo, omnium pulcherrimus.
Schaeff. ic. t. 202. *f.* 4.
Voet coleoptr. 1. *t.* 36. *f.* 21.
Berg ſtr. nomencl. 1. *t.* 12. *f.* 8. 9.
Habitat in Europæ *locis ſuffocatis, ſilvis.*

futuralis. 58. C. apterus, elytris ſtriatis viridibus: ſutura aurea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 301. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 24.
Habitat in Tierra del fuego.

violaceus. 8. C. alatus, elytris lævinſculis nigris: margine aureo, thorace ſubviolaceo. *Fn. ſuec.* 787. *
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 299. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.*195. *n.*

n. 5. Carabus alatus niger, thorace elytrorumque marginibus violaceis.

Degeer inf. 4. *p.* 89. *n.* 3. Carabus apterus æneo-niger nitidus.

Raj. inf. p. 96. *n.* 1. Scarabæus major e purpura nigricans.

Lift. fcar. angl. p. 389. *n.* 22. Scarabæus maximus e viola nigricans.

Frifch inf. 13. *t.* 23. Scarabæus terreſtris nigricans.

Schaeff. ic. t. 3. *f.* 1. & *t.* 88. *f.* 1.

Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 16. *n.* 14. *t.* 2. *f.* 14. & *t.* 10. *f.* 6.

Habitat in Europæ *ſilvis paſſim.*

purpurascens. 59. C. apterus ater, thoracis elytrorumque margine violaceo, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 6.

Habitat in Germania, *magnus, violaceo affinis.*

cyaneus. 60. C. apterus niger violaceo-nitens, elytris punctis intricatis rugoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 293. *n.* 4. *mant. inſ* 1. *p.* 195. *n.* 7.

Fn. ſuec. 780. Carabus (intricatus) violaceo-niger, elytris intricatis elevato-ſtriatis punctatisque.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 144. *n.* 4. Bupreſtis nigro-violaceus, elytris denſe ſtriatis.

Pontopp. atl. Dan. 1. *t.* 29.

Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 10. *f.* 7.

Voet coleoptr. t. 37. *f.* 30.

Habitat in Europa *boreali, rarior.*

hiſpanus. 61. C. apterus niger, thorace cyaneo, elytris rugoſis aureis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 8.

Ha-

Carabi *larvæ ſæpe intra ligna putrida, muſcas, terram, &c. degunt, imagines vero inſectorum, imprimis larvarum leones ſunt, curſu feſtinante.*

Habitat in Hiſpania, *ſtatura cyanei.*

cephalotes. 9. C. apterus, elytris atris lævibus, thorace exſerto oblongo. *Fn. ſuec.* 788.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 304. *n.* 27. *mant inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 39. Carabus apterus ater lævissimus, thorace orbiculato convexo.
Friſch inſ. 13. *p.* 25. *t.* 22. Scarabæus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 4.
Schaeff. ic. t. 17. *f.* 1.
Voet coleoptr. t. 33. *f.* 2.
Habitat in Europa *boreali.*

lævigatus. 62. C. alatus depreſſus ater, thoracis angulis poſterius rotundatis, thorace elytrisque lævissimis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 304. *n.* 28. *mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 40.
Habitat in Coromandel, *majuſculus, congeneribus magis planus.*

decemguttatus. 10. C. apterus ater, thorace anguſtato, coleoptris novemſulcatis: punctis decem albis. *Muſ. Lud. Ulr.* 96. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 299. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 9.
Forsk. Fn. arab. p. 77. *n.* 4. ? Carabus ferrator.
Habitat in Africa, *maximus.*

ſexguttatus. 63. C. apterus thorace poſterius angulato, elytris lævibus atris: punctis duobus griſeis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 195. *n.* 10.
Thunb. nov. inſ. ſp. 4. *p.* 70. *f.* 84. Carabus apterus ater, thorace maculis duabus, elytris quatuor tomentoſo-albis.
Habitat in Surate.

ſexmaculatus. 64. C. apterus ater, thorace poſterius anguſtato: margine albo, elytris ſubſtriatis: maculis tribus albis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 11.

Ha-

Habitat in Barbaria, *ſexguttato fere duplo minor.*

quadri-guttatus. 65. C. apterus, thorace poſterius attenuato, elytris ſulcatis: maculis duabus griſeis remotis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 190. *n.* 12.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

tabidus. 66. C. apterus ater, thorace poſterius anguſtato, elytris rugoſo-ſulcatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 13.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

variegatus. 67. C. apterus ater, elytris planis lævibus: margine ſinuato punctisque diſci albis. *Fabr. ſp. inſ.* 2. *app. p.* 501. *mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 14.
Forsk. ic. anim. t. 24. *f.* A. Cicindela.
Habitat in Oriente, *mediæ magnitudinis.*

gemmatus. 68. C. apterus niger, elytris ſtriatis: punctis æneis bilobis excavatis triplici ſerie. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 300. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 196. *n.* 15.
Habitat Hamburgi, *ſtatura hortenſis.*

inquiſitor. 11. C. alatus, elytris ſtriatis viridi-æneis: punctis triplici ordine. *Fn. ſuec.* 789. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 303. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 197. *n.* 31. *Roland. act. Stockh.* 1750. *p.* 292. *t.* 7. *f.* 3. Carabus alatus viridi-æneus, concave punctatus ſtriatusque, pedibus antennisque nigris.
Degeer inſ. 4. *p.* 94. *n.* 9. Carabus alatus, elytris ſtriatis margine æneis, &c.
Geoffr. inſ. par. 1. 145. *n.* 6. Bupreſtis elytris latis, ſingulo ſtriis ſedecim.
Voet coleoptr. t. 38. *f.* 39.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 12. *f.* 3.
Habitat in Europæ *locis ſuffocatis, elytris rarius totis nigris.*

ſcru-

scruta-tor. 69. C. alatus, elytris striatis viridibus: punctis triplici serie, thorace cyaneo: margine reflexo aurato. *Fabr sp. inf.* 1. *p.* 303. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 32.
Habitat in Virginia.

reticu-latus. 70. C. alatus niger, elytris reticulatis viridi-æneis, thoracis margine virescente. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 33.
Habitat in Europa, *statura & magnitudine inquisitoris.*

sycophanta. 12. C. aureo-nitens, thorace cæruleo, elytris aureo-viridibus striatis, thorace subatro. *Mus. Lud. Ulr.* 95. * *Fn. suec.* 790. *
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 303. *n.*25. *mant. inf.*1. *p.* 197. *n.* 34. Carabus alatus violaceo-nitens, elytris striatis aureis.
Degeer inf. 4. *p.* 105. *n.* 2. *t.* 17. *f.* 19.
Poda inf. 46.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 144. *n.* 5.
Reaum. inf. 2. *t.* 37. *f.* 18.
Rob. jun. t. 20. *f.* 2.
Sulz. hist. inf. t. 7. *f.* 1.
Schaeff. elem. t. 2. *f.* 1.
icon. t. 66. *f.* 6.
Bergstr. nomencl. 1. *t.* 12. *f.* 1. 2.
Voet coleoptr. t. 37. *f.* 32.
ε) Carabus punctato-sulcatus. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 357. *n.* 12. *t.* 7. *f.* 14.
Habitat in Europa, *maximus europæorum.*
Larva *nigra*, *noctu larvas phalænarum devastat.*

indaga-tor. 71. C. apterus ater, thoracis, margine rotundato, elytris lævissimis: punctis æneis triplici serie. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 197. *n.* 35.
Habitat in Barbaria, *sycophantæ propior quam hortensi.*

ro-

roſtratus. 72. C. apterus, elytris lævibus nigris, thorace angustiore, capite angustissimo. *Fabr. sp. inſ.* 1. *p.* 304. *n.* 26. *mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 36. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 577. *n.* 20. *Fn. ſuec.* 123. Tenebrio roſtratus.
Habitat in Europa *boreali, etiam in* Calabria, *elytris deflexis ad tenebriones accedens.*

elevatus. 73. C. apterus, thoracis margine rotundato deflexo, elytris violaceis, corpore atro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 37.
Habitat in America *meridionali, magnitudine & ſtatura roſtrati.*

unicolor. 74. C. apterus, thoracis margine rotundato reflexo, corpore atro, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 198. *n.* 38.
Habitat in America *meridionali, elevato proxime affinis.*

fimbriatus. 75. C. apterus ater, thorace ſimplici: lateribus elytrorumque marginibus albo-tomentoſis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 70. *f.* 83. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 8. *t.* 47. *f.* 1.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *lævis, magnitudine thoracici.*

alacer. 76. C. apterus ater immaculatus, thorace poſterius rotundato ſulcato. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 70.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *fimbriato proxime affinis.*

ſpinoſus. 77. C. apterus ater, elytris octo-ſulcatis punctato-rugoſis, poſterius ſpinoſis. *Thunb. nov. inſ. ſp.* 4. *p.* 70.
Voet coleoptr. 1. *t.* 38. *f.* 44. 45.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *leucophthalmi magnitudine, glaber.*

lu-

lunulatus. 78. C. apterus ater, thorace lunato, elytris striatis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 72. f. 86.*
Habitat ad Caput bonæ spei, *glaber, magnitudine violacei, at latior & magis depressus.*

difformis. 79. C. apterus ater, thorace transverso posterius truncato, elytris striatis. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 72.*
Habitat in interioribus regionibus pone Caput bonæ spei *sitis, statura & magnitudine hortensis.*

dorsalis. 80. C. ater, antennis elytrisque rubris: margine nigro. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 73.*
Habitat ad Caput bonæ spei, *glaber, magnitudine fere leucophthalmi.*

obtusus. 81. C. thorace elytrisque fuscis, capite antennis pedibusque rubris. *Thunb. nov. inf. sp. 4. p. 74.*
Habitat ad Caput bonæ spei, *magnitudine fere cephalotis, crepitanti similis.*

adspersus. 82. C. apterus, supra viridi-æneus obscurus, subtus niger, elytris punctis excavatis aureis quadruplici ordine sulcisque elevatis.
Degeer inf. 4. p. n. 1. t. 3. f. 12. Carabus æneo-punctatus.
Voet coleoptr. 1. t. 37. f. 35.
Habitat in Europæ *silvis, sub cespite; elytris interdum nigris.*

Herbstii. 83. C. elytris transversim undulatis: punctorum aureorum ordine triplici. *Herbst apud Fuessli arch. inf. 6. p. 131. n. 15.*
Habitat in Germania, *inquisitori simillimus, sed major, pollicem longus, nunc virescens, nunc niger.*

pomcranus. 84. C. cupreus subtus niger, elytris decussatim striatis: punctorum elevatorum serie triplici. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 132. *n.* 16. *Habitat in* Pomerania, *granulato affinis*, 9 *fere lineas longus.*

cylindricus. 85. C. ater cylindricus, thorace angustato, medio sulcato, elytris novemsulcatis: margine exteriore punctato. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 132. *n.* 17. *t.* 29. *f.* 3. *Habitat* - - - - *ultra* 9 *lineas longus.*

problematicus. 86. C. apterus niger cæruleo-nitens, elytris obsolete striatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. *p.* 177. *n.* 67. *t.* 47. *f.* 5. *Habitat in* Austria, *cyaneo intricatoque affinis, at brevior & latior.*

nemoralis. 87. C. niger, elytris æneis: lineolis intricatis subrugosis punctisque excavatis triplici serie. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 75. *n.* 809. *Fn. Fridrichsd. p.* 21. *n.* 211. *Habitat in* Dania; *an vere distincta species?*

rubicundus. 88. C. apterus, subtus niger, thorace violaceo, elytris rubicundis: futura atque marginibus albis. *Lepech. it.* II. *p.* 195. *t.* 10. *f.* 1. *Habitat in* Russiæ *fissuris montium.*

catenulatus. 89. C. elytris porcatis: punctorum elevatorum triplici serie tribus striis elevatis scabriusculis decussata. *Scop. ent. carn. n.* 264. *Habitat in* Carniola & Helvetia.

atomarius. 228. C. apterus ater glaber, elytris sublævibus: punctis minutissimis sparsis confluentibus, marginibusque subviolaceis. *Mus. Lesk. p.* 37. *n.* 818. *Habitat in* Europa.

mi-

miliarius. 229. C. apterus ater, elytris marginibus externis violaceo-æneis punctisque elevatis sparsis. *Mus. Lesk. p.* 37. *n.* 819.
Habitat in Europa.

rugosus. 230. C. apterus ater, elytris rugosis: rugis alternis confuse fractis. *Mus. Lesk. p.* 37. *n.* 820.
Habitat in Europa.

aerugi-nosus. 231. C. apterus ater, elytris confertim striatis: punctorum impressorum viridium serie triplici. *Mus. Lesk. p.* 37. *n.* 823.

cyprius. 232. C. apterus niger, capite, thorace elytrisque cupreis: his rugis quatuor singulis triplici punctorum elevatorum serie discretis. *Mus. Lesk. p.* 38. *n.* 824.
Habitat in Europa.

** *minores.*

afer. 90. C. niger, antennis pedibusque rufescentibus, elytris lævibus. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 73.
Habitat ad Caput bonæ spei *sub lapidibus montium, magnitudine vulgaris, subtus piceus, oblongus.*

capensis. 91. C. ferrugineus, thorace elytrorumque sutura linea longitudinali nigra. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 75. *f.* 88.
Habitat ad Caput bonæ spei, *statura marginati, sed paulo minor, glaber, abdomine nunc nigro, nunc ferrugineo.*

fasciatus. 92. C. ferrugineus fascia elytrorum nigra. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 75. *f.* 89.
Habitat ad Caput bonæ spei, *quadrimaculato affinis.*

striatulus. 93. C. niger, thoracis basi utrinque puncto impresso, elytris striatis medio glabris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 305. *n.* 32. *mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 44.
Habitat ad Patagoniæ *littora.*

caliginosus. 94. C. ater, thorace quadrato lævi, antennis piceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 305. *n.* 33. *mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 45.
Habitat in America, *capitis punctis duobus impressis.*

arenarius. 95. C. pallidus, elytris maculis duabus dorsalibus atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 305. *n.* 34. *mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 46.
Habitat in Cambriæ *arena mobili.*

fabulosus. 96. C. pallidus, capite coleoptrorumque macula dorsali nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 47.
Habitat in Saxoniæ *fabuletis, arenario affinis.*

ruficornis. 97. C. ater, elytris sulcatis lævibus, antennis pedibusque rufis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 305. *n.* 35. *mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 48.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 146. *n.* 8. Bupreſtis nigra, &c.
Lift. scarab. angl. p. 390. *n.* 24. Scarabæus niger, pedibus corniculisque croceis.
Mull. zool. dan. prodr. p. 78. *n.* 843. Carabus cursor.
Habitat in Europæ *silvis, frequens.*

bicolor. 98. C. supra niger, subtus ferrugineus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 306. *n.* 36. *mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 49.
Habitat in America *boreali.*

flavicornis. 99. C. niger, thoracis margine antenis pedibusque flavescentibus. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 50.

Ha-

Habitat Halæ saxonum, *mediæ magnitudinis.*

supre-oides. 13. C. niger, capite recepto, antennis palpisque ferrugineis, pedibus piceis.
Habitat in Europa *australi, mediæ magnitudinis.*

fastigia-tus. 14. C. ferrugineus, abdomine elytrisque fastigiatis nigris. *Mus. Lud. Ulr.* 97. *
Habitat ad Caput bonæ spei. Tulbagh.

lividus. 15. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris nigris: lateribus lividis. *Fn. suec.* 791. *
Habitat in Europa.

margi-natus. 16. C. niger, elytris margine tibiisque testaceis. *Fn. suec.* 804. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 310. *n.* 61. *mant. inf.* 1. *p.* 202. *n.* 84.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 162. *n.* 41. Buprestis viridis, pedibus elytrorumque margine exteriori pallidis.
Pontopp. atl. Dan. 1. *t.* 29.
Habitat in Europa, *aliquando viridis.*

cinctus. 100. C. fuscus, capite thoraceque viridi-æneis, elytrorum margine pedibusque pallidis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 510. *n.* 62. *mant. inf.* 1. *p.* 202. *n.* 85.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 6. *t.* 29. *f.* 7.
Habitat in Coromandel, *marginato major.*

palli-pes. 101. C. ater, thoracis rotundati coleoptrorumque limbo & pedibus pallidis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 202. *n.* 86.
Habitat in America, *marginato minor.*

limba-tus. 102. C. supra ferrugineus, thorace macula, elytris fasciis undatis viridi-æneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 310. *n.* 63. *mant. inf.* 1. *p.* 202. *n.* 87.

Her-

Herbſt Beſch. der berl. naturf. Geſ. 4. *t.* 7. *f.* 4.
Habitat in Germania *ſub lapidibus.*

nitidulus. 103. C. niger elytrorum margine æneo nitido.
Fabr. mant. inſ. 1. *p.* 202. *n.* 88.
Habitat in Camtſchatca, *ſtatura & magnitudine cuprei.*

complanatus. 17. C. pallidus, elytris faſciis duabus undulatis nigricantibus.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 306. *n.* 41. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 57. Carabus thorace orbiculato, rufus, elytris faſciis duabus nigris.
Habitat in inſula S. Dominici.

pilicornis. 104. C. thorace rotundato, elytris ſtriatis punctisque impreſſis, antennis piloſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 307. *n.* 48. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 65. *Lesk. it. p.* 18. *t.* A. *f.* 7.
Habitat in Anglia, *nunc niger, nunc æneus.*

ſpinibarbis. 105. C. cyaneus, thorace orbiculato, ore antennis tibiisque rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 307. *n.* 47. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 64.
Habitat in Anglia.

ſexpuſtulatus. 106. C. rufus, elytris nigris: punctis ſex rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 307. *n.* 46. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 63.
Habitat in America *meridionali.*

bimaculatus. 107. C. niger, faſcia communi flava interrupta, antennis pedibusque teſtaceis. *Mant. p.* 532.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 307. *n.* 45. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 62. Carabus niger, capite elytrisque truncatis puncto baſeos faſciaque media ferrugineis.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 5.
Voet. coleoptr. t. 34. *f.* 10. 11.
Habitat in India, *thorace mox flavo, mox nigro, mox maculato.* cre-

crepitatus. 18. C. thorace capite pedibusque ferrugineis, elytris nigris. *Fn. suec.* 272. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 307. *n.* 44. *mant. inf.* 1. *p.* 200. *n.* 61.
Degeer inf. 4. *p.* 103. *n.* 22. *t.* 3. *f.* 18. Carabus alatus ferrugineus, &c.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 151. *n.* 19. Bupreſtis capite, thorace pedibusque rubris, &c.
Rol. act. Stockh. 1750. *p.* 292. *t.* 7. *f.* 2. Cicindela capite, thorace pedibusque rufis, &c.
Schaeff. ic. t. 11. *f.* 13.
Voet coleoptr. 1. *t.* 36. *f.* 26.
Bergſtr. nomencl. 1. *t.* 13. *f.* 9.
Habitat in Europæ *nemoribus, perſequentes carabos majores crepitu ventris pellens.*

fumans. 108. C. ferrugineus, elytris nigro-cyaneis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 307. *n.* 43. *mant. inf.* 1. *p.* 200. *n.* 60.
Habitat in America, *crepitanti affinis, at triplo major.*

lateralis. 109. C. niger, thorace elytrorumque margine ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 200. *n.* 59.
Habitat Kilonii, *ſtatura & magnitudine americani.*

americanus. 19. C. niger, thorace pedibus antennisque ferrugineis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 306. *n.* 42. *mant. inf.* 1. *p.* 200. *n.* 58.
Degeer inf. 4. *p.* 107. *n.* 3. *t.* 17. *f.* 21.
Habitat in America, *crepitanti ſimilis, ſed quadruplo major.*

ſpinipes. 20. C. piceus, thorace linea excavata longitudinali, manibus ſpinoſis. *Fn. ſuec.* 793. *Scop. ent. carn.* 267.
Habitat in Europa, *ſuper tritici ſpicas frequens.*

cyanocephalus. 21. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque cyaneis. *Fn. ſuec.* 794. * *Fabr. ſp. inf.*

1.

1. *p.* 310. *n.* 65. *mant. inf.* 1. *p.* 203. *n.* 90.
Fn. fuec. 525. Carabus capite elytrisque cæruleis thorace rubro.
Degeer inf. 4. *p.*93. 100. *n.*17. *t.*3. *f.*17. Carabus alatus, capite elytrisque viridi-cæruleis, &c.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 149. *n.* 40. Buprestis capite elytrisque cæruleis, thorace rubro.
Raj. inf. p. 89. *n.* 1. Cantharis elytris & capite cæruleis, scopulis croceis.
Schaeff. ic. t. 10. *f.* 14.
Habitat in Europæ *silvis.*

ruficollis. 110. C. thorace obcordato ferrugineo, elytris truncatis striatis viridibus, capite plano atro.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 203. *n.* 91.
Habitat in America *meridionali*, *mediæ magnitudinis.*

amethystinus. 111. C. cyaneus, capite thoraceque æneis nitidis.
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 203. *n.* 92.
Habitat in Cayenna, *statura & magnitudine cyanocephali.*

flexuosus. 112. C. niger, elytris ferrugineis: macula media sinuata punctoque apicis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 311. *n.* 66. *mant. inf.* 1. *p.* 203. *n.* 93.
Habitat in India.

melanocephalus. 22. C. thorace pedibusque ferrugineis, elytris capiteque atris. *Fn. fuec.* 795. *
Fn. fuec. 1. *n.*526. Carabus capite elytrisque atris, thorace rubro.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 310. *n.*64. *mant. inf.* 1. *p.*204. *n.* 89. Carabus niger, thorace pedibusque ferrugineis.
Voet coleoptr. 1. *t.* 35. *f.* 15.
ε) *Fn. fuec.* 524. Carabus niger, thorace antennis pedibusque ferrugineis.

De-

Degeer inſ. 4. *p.* 93. *n.* 8. Carabus apterus niger nitidus, &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 162. *n.* 42. Bupreſtis nigro, &c.
Habitat in Europæ *locis ſuffocatis.*

vapora-riorum. 23. C. thorace fuſco, pedibus antennis elytrisque anterius & apice ferrugineis. *Fn. ſuec.* 796. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 312. *n.* 76. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 110.
Fn. ſuec. 1. *n.* 529. Carabus ater, elytris antice griſeis.
Muſſ. prodr. zool. dan. p. 78. *n.* 850. Carabus nigricans, antennis, thorace, pedibus elytrisque antice ferrugineis.
Voet coleoptr. 1. *t.* 35. *f.* 18.
Habitat in Europa, *frequens*, *meridiano quadruplo major.*

latus. 24. C. niger, elytris ſtriatis crenatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. ſuec.* 521. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 308. *n.* 54. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 73.
Degeer inſ. 4. *p.* 101. *n.* 18. Carabus alatus niger nitidus, &c.
Schaeff. ic. t. 194. *f.* 7.
Habitat in Europa *frequens.*

abdominalis. 113. C. niger, antennis, abdominis diſco pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 74.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura & magnitudine lati.*

Lineola. 114. C. thorace ſubæquali ferrugineus, elytris lineola nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 309. *n.* 55. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 75.
Habitat in America *ſeptentrionali.*

ferrugineus. 25. C. ferrugineus, thorace glaberrimo. *Fn. ſuec.* 798. * *Fa-*

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 309. *n.* 56. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 76. Carabus ferrugineus elytris ſtriatis obſcurioribus.
Degeer inſ. 4. *p.* 101. *n.* 19. Carabus alatus flavo griſeus nitidus, &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 162. *n.* 43. Bupreſtis ferrugineo-lividus, &c.
Herbſt apud Fuesslı arch. inſ. 6. *t.* 29. *f.* 6. c.
Habitat in Europæ *arvis.*

pallens. 115. C. pallidus, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 309. *n.* 57. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 77.
Habitat Dreſdæ, *an ſatis diſtinctus a ferrugineo?*

dorſiger. 116. C. ferrugineus abdomine coleoptrorumque lunula lata nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 78.
Habitat in Barbaria, *ſtatura pallentis.*

germanus. 26. C. cyaneus, capite, pedibus elytrisque teſtaceis, elytris apice violaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 317. *n.* 71. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 102.
Schaeff. ic. t. 31. *f.* 13.
Habitat in Germania, *interdum niger.*

vulgaris. 27. C. nigro-æneus, antennis pedibusque nigris. *Fn. ſuec.* 799.* *Scop. ent. carn.* 268. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 308. *n.* 52. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 70.
Degeer inſ. 4. *p.* 97. *n.* 14. Carabus alatus ſupra viridi-æneus nitidus, &c.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 158. Bupreſtis fuſco-æneus.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 2.
Habitat in Europæ *ſilvis frequens.*

azureus. 117. C. cyaneus, antennis pedibusque rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 308. *n.* 53. *mant. inſ.* 1. *p.* 201. *n.* 71.
Berg ſp. nomencl. 1. *t.* 10. *f.* 3.
Habitat in Lipſiæ *collibus arenoſis.*

ery-

erythrocephalus. 118. C. niger, capite rufo, antennis pedibusque flavis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 72.
Habitat Kilonii, *mediæ magnitudinis.*

cæruleſcens. 28. C. nigro-cæruleus, antennis baſi rubris. *Fn. ſuec.* 800. *
Fabr. ſp. inf. 1. *p.*308. *n.* 49. *mant. inf.*1. *p.*200. *n.* 66. Carabus nigro-cæruleſcens, elytris ſtriatis.
Mull. zool. dan. prodr. p. 76. *n.* 817. Carabus virens.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 3. 4.
Habitat in Europæ *hortis*, *viis.*

lepidus. 119. C. viridi-æneus, thorace quadrato poſterius utrinque biſtriato, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 200. *n.* 67. *Lesk. it.* I. *p.* 17. *n.* 8. *t.* A. *f.* 6.
Habitat in Luſatiæ *arenoſis*, *magnitudine & ſtatura cæruleſcentis.*

cupreus. 29. C. cupreus, antennis baſi rubris. *Fn. ſuec.* 801. * *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 308. *n.* 50. *mant. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 68.
Degeer inf. 4. *p.* 97. *n.* 13. *t.* 3. *f.* 15. Carabus alatus ſupra viridi-æneus, &c.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 161. *n.* 40. Bupreſtis totus viridi-cupreus, antennis nigris.
Habitat in Europæ *ſilvis.*

Carnifex. 120. C. alatus viridi-æneus, antennis pedibusque rufis, thorace anguſtato. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.*308. *n.* 51. *mant. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 69.
Habitat in Tierra del fuego.

piceus. 30. C. niger, pedibus antennisque piceis. *Fn. ſuec.* 802. * *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 306. *n.* 37. *mant. inf.* 1. *p.* 199. *n.* 51. Carabus thorace ob-

obcordato, antennis tibiisque piceis, elytris striatis.
Gron. zooph. 501. Carabus apterus niger.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 9.
Habitat in Europa *boreali.*

holoſericeus. 121. C. holoſericeo-niger, capite æneo nitido. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 52.
Habitat Kilonii, *ſtatura picei.*

femoralis. 122. C. capite thoraceque æneis, elytris ſtriatis obſcurioribus, femoribus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 306. *n.* 38. *mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 53.
Habitat in Sierra Leon Africæ.

madidus. 123. C. niger, thorace poſterius utrinque impreſſo, femoribus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 306. *n.* 39. *mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 54.
Habitat in Anglia.

binotatus. 124. C. ater, capite punctis duobus frontalibus rubris, antennis baſi flavis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 199. *n.* 55.
Habitat Kilonii, *ſtatura & magnitudine ruficornis.*

interruptus. 125. C. ater, thorace poſterius rotundato abbreviato mineque remotis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 306. *n.* 40. *mant. inſ.* 1. *p.* 200. *n.* 56.
Herbſt apud Fuesſli arch. inſ. 6. *t.* 29. *f.* 4. a.
Habitat in Oriente, *an forte tenebrio?*

velox. 31. C. nigricans, pedibus tibiisque pallidis. *Fn. ſuec.* 803. * *It. gotl.* 207.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 312. *n.* 72. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 103. Carabus nigricans, antennis pedibusque pallidis, elytris obtuſiſſimis.
Habitat in Europæ *arena volatili, agiliſſimus.*

ru-

rufescens. 126. C. ferrugineus, thorace rotundato, vertice anoque nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 312. *n.* 73. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 104.
Habitat in Anglia.

viridanus. 127. C. viridi-æneus, elytris ferrugineis: macula communi nigro-ænea. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 105.
Habitat in Germaniæ *quiſquiliis*, *ſtatura c. vaporariorum*, *thorace interdum nigro.*

bipuſtulatus. 128. C. thorace orbiculato elytrisque nigris: maculis duabus rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 312. *n.* 74. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 106.
Habitat in Anglia.

æquinoctialis. 129. C. flavus, thorace cordato, elytris fuſcis: maculis duabus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 312. *n.* 57. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 107.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 6. *t.* 29. *f.* 8. d.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *parvus.*

lunatus. 130. C. niger, capite thoraceque viridi-æneis, elytris flavis: maculis tribus nigris. *Fabr. ſyſt. ent. p.* 247. *n.* 60. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 108.
Habitat in - - -

praſinus. 131. C. niger, capite thoraceque viridi-æneis, elytris macula magna communi poſteriore nigra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 109.
Thunb. nov. inſ. ſp. 4. *p.* 74. *f.* 87. Carabus thorace capiteque cyaneis, elytris rubris: poſtice macula communi fuſca.
Habitat Hafniæ *& ad* Caput bonæ ſpei, *ſtatura c. vaporariorum*, *at paulo major.*

multipunctatus. 32. C. ſubæneus, elytris punctis vagis plurimis impreſſis. *Fn. ſuec.* 805. * *Fabr. ſp. inſ.* 1.

p.

p. 309. *n.* 58. *mant. inf.* 1. *p.* 201. *n.* 79. *Habitat in* Europæ *fabulosis.*

hafniensis. 132. C. niger, elytris striatis: punctis dorsalibus plurimis impressis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 202. *n* 80.
Habitat Hafniæ, *mediæ magnitudinis.*

æneus. 133. C. ferrugineus, thorace elytrisque æneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 309. *n.* 59. *mant. inf.* 1. *p.* 202. *n.* 81.
Habitat in Lipsiæ *hortis.*

nigricornis. 134. C. niger, thorace cupreo, elytris striatis viridibus, pedibus piceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 202. *n.* 82.
Habitat in Dania, *statura sexpunctati, at paulo major.*

bipunctatus. 33. C. subæneus, elytris punctis duobus impressis. *Fn. suec.* 806.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 313. *n.* 86. *mant. inf.* 1. *p.* 205. *n.* 121. Carabus æneus, antennis nigris, tibiis pallidis.
Habitat in Europæ *quisquiliis.*

angustatus. 135. C. thorace cylindrico cyaneo, elytris testaceis apice nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 205. *n.* 122.
Habitat in Germania, *parvus, an hujus generis?*

quadripustulatus. 34. C. capite ferrugineo, thorace atro, elytris maculis duabus flavis. *Fn. suec.* 811. *
Habitat in Europa.

sexpunctatus. 35. C. subæneus, elytris punctis longitudinalibus sex impressis. *Fn. suec.* 807. *
Fn. suec. 1. *n.* 519. Carabus nitens, capite thoraceque cyaneo, elytris purpureis. *Fa-*

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 309. *n.* 60. *mant. inſ.* 1. *p.* 202. *n.* 83. Carabus capite thoraceque viridibus, elytris cupreis.

Degeer inſ. 4. *p.* 99. *n.* 16. Carabus alatus, capite thoraceque viridi-aureis, &c.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 149. *n.* 14. Bupreſtis nitens, capite thoraceque viridibus, &c.

Goed. inſ. 2. *p.* 126. *t.* 31.

Schaeff. ic. t. 66. *f.* 4.

Voet coleoptr. 1. *t.* 33. *f.* 4.

Habitat in Europa & *boreali* America.

meridianus. 36. C. niger, elytris anterius pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 312. *n.* 77. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 111.

Habitat in Europa, *parvus.*

Comma. 136. C. niger, thorace fuſco, elytris griſeis: macula lineari nigra. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 312. *n.* 78. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 112.

Habitat in America.

teſtaceus. 37. C. pallide teſtaceus, elytris glabris. *Fn. ſuec.* 812. *

Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 313. *n.* 84. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 119. Carabus capite thoraceque ferrugineis, elytris teſtaceis.

Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 153. *n.* 25. Bupreſtis teſtaceus, capite nigro.

Habitat in Europa.

abbreviatus. 137. C. thorace rotundato rufo, elytris abbreviatis teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 313. *n.* 85. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 20.

Habitat in Norwegiæ *rupibus.*

uſtulatus. 38. C. thorace nigro, elytris obſcuris pallido-bifaſciatis. *Fn. ſuec.* 810. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 313. *n.*

n. 81. *mant. inf.* 1. *p.* 205. *n.* 115.
Fn. fuec. 528. Carabus niger, coleoptris pone fascia ferruginea; lateribus macula ferruginea.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 151. *n.* 20.
Voet coleoptr. 1. *t.* 34. *f.* 7.
Habitat in Europæ *quifquiliis*, *maculis interdum magnis obfoletis rubro-pallidis varius.*

kilonienfis. 138. C. thorace rotundato nigro, coleoptris pallidis: macula magna dorfali nigra. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 205. *n.* 116.
Habitat Kilonii, *parvus.*

Crux major. 139. C. thorace capiteque nigro-rubefcente, coleoptris ferrugineis: cruce nigra. *Fn. fuec.* 808. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 311. *n.* 67. *mant. inf.* 1. *p.* 203. *n.* 94. Carabus thorace orbiculato rubro, coleoptris truncatis rubris, cruce nigra.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 150. *n.* 18.
Schaeff. ic. t. 1. *f.* 13.
Habitat in Europæ *filvis.*

vittatus. 139. C. thorace marginato rufo, elytris atris: vitta alba. *Fabr. fp. inf.* 1. *p.* 311. *n.* 68. *mant. inf.* 1. *p.* 203. *n.* 95.
Habitat in America *boreali.*

turcicus. 140. C. thorace orbiculato rufo, eltyris nigris: lunula baſeos pallida. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 203. *n.* 96.
Habitat - - - *ſtatura & magnitudine vittati.*

hæmorrhoidalis. 141. C. thorace ſuborbiculato, elytris nigris apice rufis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 203. *n.* 97.
Habitat Dreſdæ, *rufus.*

picipes. 142. C. ater nitidus, thorace rotundato, elytris ſuſcis, pedibus ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 203. *n.* 98. *Ha-*

Habitat in Suecia, *parvus, oblongus, agilis.*

agilis. 143. C. rufus, thorace rotundato, elytris abdomineque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.*204. *n.*99.
Habitat Upſaliæ, *ſtatura vittati.*

Crux-minor. 40. C. thorace luteo glabro, elytris poſterius nigris: maculis duabus flavis. *Fn. ſuec.* 809. *
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.*311. *n.* 69. *mant. inſ.* 1. *p.*204. *n.* 100. Carabus thorace orbiculato rufo, coleoptris apice nigris, macula rufa.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 6.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 8. & *t.* 41. *f.* 13.
Habitat in Europa, *præſertim* Anglia.

Andreæ. 144. C. thorace orbiculato nigro nitido, elytris pallidis: faſcia media nigra. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 311. *n.* 70. *mant. inſ.* 1. *p.* 204. *n.* 101.
Habitat in Italia, *ſtatura c. crucis minoris.*

quadri-maculatus. 41. C. thorace ferrugineo glabro, elytris obtuſiſſimis fuſcis: maculis duabus albis. *Fn. ſuec.* 813. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 313. *n.* 79. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 113.
Fn. ſuec. 1. *n.* 532. Carabus niger, thorace ferrugineo, elytrorum maculis 4 lividis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 152. *n.* 24. Bupreſtis niger, thorace plano ferrugineo, &c.
Pontopp. atl. Dan. 1. *t.* 29.
Habitat in Europæ *quiſquiliis.*

quadri-guttatus. 145. C. thorace rotundato atro, elytris nigris: punctis quatuor albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 313. *n.* 80. *mant. inſ.* 1. *p.* 205. *n.* 114.
Herbſt apud Fuesslı arch. inſ. 6. *t.* 29. *f.* 9. e.
Habitat in Anglia.

atricapillus. 42. C. flavus, capite nigro, elytris obtusissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 313. *n.* 82. *mant. inf.* 1. *p.* 205. *n.* 117. Carabus thorace rotundato rufo, elytris obtusis testaceis, capite atro.
Herbst apud Fuesslii arch. inf. 6. *t.* 29. *f.* 10. f?
Habitat in Europa *boreali.*

biguttatus. 146. C. capite rotundato æneo, elytris nigris: macula apicis pallida. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 313. *n.* 83. *mant. inf.* 1. *p.* 205. *n.* 118. *Thunb. nov. inf. sp.* 4. *p.* 76.
Habitat in Norwegia, *sub arborum, corticibus, in* Suecia, *& ad* Caput bonæ spei, *pediculo duplo major.*

truncatellus. 43. C. niger, supra æneus, elytris apice subtruncatis. *Fn. suec.* 814. *
Fabr. mant. inf. 1. *p.* 296. *n.* 123. Carabus thorace rotundato, supra obscure æneus, subtus ater.
Habitat in Europæ *quisquiliis, parvus.*

Thunbergii. 147. C. elytris testaceis: macula communi violacea, capite thoraceque nigris. *Thunb. nov. act. Upsl.* 4. *p.* 20. *n.* 34.
Habitat Upsaliæ, *cærulescentis magnitudine, c. vaporariorum affinis.*

upsaliensis. 148. C. elytris viridibus striatis, thorace plano æneo punctato. *Thunb. nov. act. Upsl.* 4. *p.* 20. *n.* 35.
Habitat Upsaliæ, *vulgaris magnitudine, cupreo affinis, at thorace punctato distinctus.*

sericeus. 149. C. ater, capite thorace & elytris viridi-nitentibus, antennis pedibusque rufis. *Forst. nov. inf. sp.* 1. *p.* 58. *n.* 58.
Habitat in America *septentrionali, spinipede paulo major.* linea-

lineatus. 150. C. thorace ferrugineo, pedibus elytrisque griseis: suturæ linea communi alteraque media nigra, tarsis nigris. *Forst. nov. inf. sp.* 1. *p.* 59. *n.* 59.
Habitat in America *septentrionali*, *magnitudine crucis minoris.*

marchicus. 151. C. subtus niger, capite thoraceque cæsiis, palpis antennisque fuscis basi ferrugineis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 137. *n.* 38.
Habitat Berolini, *germano affinis.*

Schranckii. 152. C. viridi-æneus, abdomine nigro, pedibus antennisque pallide rufis. *Schranck inf. austr. p.* 213. *n.* 401.
Habitat in Germania, 5 *lineas longus.*

indicus. 153. C. niger, antennis apice griseis, thorace linea impressa, elytris septemsulcatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 138. *n.* 40. *t.* 29. *f.* 11.
Habitat in India, 9 *lineas longus.*

splendidus. 154. C. fuscus, capite thoraceque viridi-æneis, pedibus pallidis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 138. *n.* 41.
Habitat in India, *cincto proxime affinis*, *an satis distinctus?*

marginellus. 155. C. piceus, pedibus spinulosis, antennis thoracisque margine flavescentibus, elytris octostriatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 138. *n.* 42.
Habitat in India, *angustus*, 7½ *lineas longus.*

Frischii. 156. C. niger, thoracis sulco unico medio, elytrorum octo. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 138. *n.* 43.
Habitat Berolini, 8-9 *lineas longus*, *oculis albis.*

varius. 157. C. supra nigro-æneus subtus niger, corpore ovato brevi, thorace convexo, elytris lævibus, antennis basi rufis. *Degeer inf.* 4. *p.* 90. *n.* 15.
Habitat in Europa, 3 *circiter lineas longus.*

Herbstii. 158. C. niger, antennis thoracisque glaberrimi margine anteriori ferrugineis, pedibus piceis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 138. *n.* 45.
Habitat Berolini.

Mulleri. 159. C. æneo-niger, elytris punctato-striatis: punctis tribus impressis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 139. *n.* 46.
Mull. zool. dan. prodr. n. 842. Carabus sexpunctatus.
Habitat in Europa, 3 *lineas longus.*

obscurus. 160. C. niger, subtus badius, elytris fuscis: striis 8 punctatis, antennis pedibusque luteis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 139. *n.* 47. *t.* 29. *f.* 12. g.
Mull. zool. dan. prodr. n. 819.
Habitat in Europa.

Pelidnus. 161. C. niger, thorace orbiculato, elytris sordide luteis octo-striatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 139. *n.* 48.
Habitat Berolini.

hungaricus. 162. C. ex fusco rufus, elytris striatis, thorace rotundato. *Scop. ann. hist. nat* 5. *p.* 108. *n.* 103. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 139. *n.* 49.
Habitat in Hungaria & Germania, *vix ultra* 2 *lineas longus.*

aterrimus. 163. C. totus ater nitidus, thorace rotundato, elytris obsolete striatis: punctis quatuor ad suturam excavatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 104. *n.* 50. *t.* 29. *f.* 13. *Ha-*

Habitat Berolini, *ſtatura multipunctati, at major, ſex lineas longus.*

terricola. 164. C. niger, ſubtus fuſcus, elytris cæruleis: ſtriis novem punctatis: extima crenata. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 6. *p.* 104. *n.* 51. *t.* 29. *f.* 14.
Habitat Berolini, 7-8 *lineas longus.*

platys. 165. C. totus niger, thorace ſubmarginato, elytris glabris obſolete ſtriatis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 6. *p.* 140. *n.* 52.
Habitat Berolini, *lato proxime affinis, at latior.*

Æthiops. 166. C. totus niger nitidus. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 6. *p.* 141. *n.* 53.
Habitat Berolini, *vulgari affinis, an propria ſpecies?* 5-6 *lineas longus.*

Virgo. 167. C. niger, antennis pedibusque fuſcis, thorace poſterius ſinuato, elytris obſolete ſtriatis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 6. *p.* 141. *n.* 54.
Habitat Berolini, *vulgari ſimilis*, 3 *lineas longus.*

glaber. 168. C. niger nitidus, elytris fuſcis ſtriatis, ore palpis pedibusque piceis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 6. *p.* 141. *n.* 55.
Habitat Berolini, *vulgari affinis, ſed anguſtior.*

globoſus. 169. C. niger, thoarce hemiſphærico, elytris punctato-ſtriatis, ore palpisque ferrugineis, antennis baſi fulvis ſubmoniliformibus. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 6. *p* 142. *n.* 58. *t.* 29. *f* 17. k.
Habitat Berolini, *vix ſeſquilineam longus, an hujus generis?*

chalcos. 170. C. æneus ſubtus niger, antennis baſi ferrugineis, thorace punctato, elytris punctato-ſtriatis.

tis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6 *p.* 142. *n.* 59.
Habitat Berolini, 2½ *lineas longus.*

micros. 171. C. badius, elytris punctato striatis, oculis nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 142. *n.* 60.
Habitat Berolini, 2 *lineas longus.*

lampros. 172. C. nitens glaberrimus æneo-niger, subtus niger, elytris punctato-striatis, antennis griseis, pedibus fuscis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 143. *n.* 61.
Habitat Berolini, *ad ripas humidas, chalco affinis, at minor*, 1½ *lineas longus.*

pyropus. 173. C. ater nitens, thoracis margine elevato, antennis pedibusque piceis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 143. *n.* 62.
Habitat Berolini, *statura lati*, 4 *lineas longus.*

mixtus. 174. C. luteus, capite nigro, elytris posterius nigro irroratis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 143. *n.* 63.
Habitat Berolini, 2 *lineas longus.*

Geerii. 175. C. supra niger, subtus flavus, elytris maculis binis, pedibus antennisque fulvis. *Degeer ins.* 4. *p.* 102. *n.* 20.
Mull. zool. dan. prodr. p. 78. *n.* 840? Carabus bimaculatus.
Habitat in Europa.

didymus. 176. C. ex nigro cæruleus, elytris flavis: macula didyma fusca. *Mull. zool. dan. prodr. p.* [illegible] *n.* 840.
Habitat in Dania.

nitidus. 177. C. thorace subnigro, elytris striatis pedibus an-

antennisque fuscis. *Mull. Fn. Fridrichsd. p.* 21. *n.* 212. *zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 833.
Habitat in Dania, *herbariis quoque infestus vix pediculi magnitudine.*

flavus. 178. C. flavus, elytris striatis, capite, thorace maculaque apicis elytrorum viridi. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 78. *n.* 846.
Habitat in Dania.

fenestratus. 179. C. niger, elytris fuscis: maculis obliquis flavis fenestratis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 76. *n.* 812.
Habitat in Dania.

inflexus. 180. C. niger, tibiis tarsisque piceis, elytris punctorum impressorum serie flexuosa. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 76. *n.* 814.
Habitat in Dania.

fulvipes. 181. C. niger, elytris æneis, pedibus antennisque fulvis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 76. *n.* 816.
Habitat in Dania.

nigricans. 182. C. ater, elytris, antennis, palpis pedibusque piceis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 76. *n.* 819.
Habitat in Dania.

celer. 183. C. piceus, capite, thorace elytrisque striatis nigris. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 76. *n.* 823. *act. nidros.* 4. *p.* 32.
Habitat in Scandinavia.

cæruleus. 184. C. niger, elytris cyaneis, antennis, palpis pedibusque fulvis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 827.
Habitat in Dania.

fi-

similis. 185. C. niger, thorace posterius utrinque excavato, elytrorum striis subpunctatis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 828.
Habitat in Dania.

æstivus. 186. C. flavus, capite ferrugineo, thorace elytrisque nigris. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 832.
Habitat in Dania.

flexilis. 187. C. flavicans, capite nigro, elytris lividis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 78. *n.* 837. *act. nidrof.* 4. *p.* 30.
Habitat in Scandinavia.

lævis. 188. C. æneus, capite thoraceque viridi, elytris cupreis, pedibus piceis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 78. *n.* 841.
Habitat in Dania.

vernalis. 189. C. niger, antennis, palpis pedibusque flavis, elytris striato-punctatis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 78. *n.* 847.
Habitat in Dania.

pullus. 190. C. niger, elytris striatis, pedibus piceis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 78. *n.* 848.
Habitat in Dania.

ater. 191. C. ater, elytris striatis, unguibus subferrugineis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 78. *n.* 851.
Habitat in Dania.

discolor. 192. C. ater, subtus rufus, elytris mollibus. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 79. *n.* 857. *act. nidrof.* 4. *p.* 31.
Habitat in Europa *boreali.*

au-

auricalceus. 193. C. flavescens supra æneus. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 79. *n.* 859.
Habitat in Dania.

fulvicornis. 194. C. niger glaber, elytris striatis, antennis, palpis pedibusque fulvis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 826.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 147. *n.* 9. Bupreſtis niger.
Degeer inſ. 4. *p.* 95. *n.* 10. Carabus niger ruficornis.
Habitat in Europa.

leprosus. 195. C. cæruleus, antennis, baſi pedibusque ferrugineis, elytris fuſcis: maculis binis albis.
Pontopp. Naturg. Dinnem. p. 211. *t.* 16. Carabus quadriguttatus.
Habitat in Dania.

Inderiensis. 196. C. obſcure viridis, ſubtus ater, pedibus teſtaceis, elytris ſtriatis: margine laterali ex griſeo luteſcente. *Pall. it.* I. *app. n.* 39.
Habitat circa lacum Sibiriæ Inderienſem, *paulo major.*

pictus. 197. C. depreſſus teſtaceus, elytris ſtriatis pedibusque griſeis. *Pallas it.* I. *app. n.* 40.
Habitat in Sibiriæ *campis aridiſſimis ſub cadaveribus torrefactis.*

elegans. 198. C. thorace lineari elytra æquante, pedibus rufis. *Scop. ent. carn. n.* 269.
Habitat in Carniola.

metallicus. 199. C. ſupra æneus nitens, thorace lateribus connivente, antennis baſi fulvis. *Scop. ent. carn. n.* 270.
Habitat in Carniola.

cor-

cordatus. 200. C. thorace inverſe cordato. *Scop. ent. carn. n.* 271.
Habitat in Carniola & Helvetia.

junceus. 201. C. corpore ſublineari, thorace pone angu-ſtiori. *Scop. ent. carn. n.* 272.
Habitat in Carniola & Helvetia.

Scopolii. 202. C. æneo-viridis, elytris teſtaccis: margine toto faſciaque fuſcis. *Scop. ent. carn. n.* 275.
Habitat in Carniola.

ſalicinus. 203. C. niger punctatus, elytris fuſcis ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. n.* 276.
Habitat in Carniolæ *ſalice cuprea.*

arenoſus. 204. C. æneo fuſcus, thorace ſubrotundo pone dentato pedibusque rufis. *Scop. ent. carn. n.* 277.
Habitat in Carniolæ & Helvetiæ *arena.*

lucidus. 205. C. niger nitens, elytris pedibusque teſtaceis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 108. *n.* 104
Habitat in Hungaria, *parvus.*

octoſtriatus. 206. C. viridis punctatus, elytris octoſtriatis, pedibus pallidis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 147. *n.* 11. Bupreſtis, &c.
Habitat in Gallia.

nitidus. 207. C. viridi-nitens, elytris octoſtriatis: punctis tribus impreſſis, pedibus pallidis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 148. *n.* 12.
Habitat in Gallia.

viridis. 208. C. viridis, elytris octoſtriatis, anterius & margine fulvis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 148. *n.* 13.
Habitat in Gallia.

æru-

errugi-neus. 209. C. nitens, capite elytrisque viridibus, thorace cupreo: punctis duodecim. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 149. *n.* 15.
Habitat in Gallia.

nobilis. 210. C. niger, thorace atro, elytris rubris: cruce nigra. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 150. *n.* 17.
Habitat in Gallia.

frigo-fus. 211. C. niger, thorace ferrugineo, elytris striatis: maculis quatuor lividis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 152. *n.* 22.
Habitat in Gallia, *an vere diversus a quadrimaculato?*

nigri-collis. 212. C. totus niger, elytris striatis: maculis quatuor lividis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 152. *n.* 23.
Habitat in Gallia, *an varietas quadriguttati?*

octo-macu-latus. 213. C. niger, elytris striatis: maculis octo lividis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 153. *n.* 24.
Habitat in Gallia.

minu-tulus. 214. C. totus niger lævis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 153. *n.* 26.
Habitat in Gallia.

varie-gatus. 215. C. cupreo viridique variegatus: punctis quatuor impressis, pedibus pallidis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 157. *n* 32.
Habitat in Gallia.

tene-brioi-des. 216. C. ater, thorace lato, elytrorum striis punctatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 159. *n.* 34.
Habitat in Gallia.

latícol-lis. 217. C. totus viridis, thorace lato. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 150. *n.* 35.
Habitat in Gallia.

lu-

lugubris. 218. C. ater opacus, palpis antennisque fulvis, tibiis tarsisque ferrugineis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 76. *n.* 820.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 160. *n.* 37. Bupreſtis lugubris.
Habitat in Europa.

pubeſcens. 219. C. niger tomentoſus, elytris ſtriatis, antennis palpis pedibusque fulvis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 77. *n.* 725.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 160. *n.* 38. Bupreſtis nigro ſericeus.
Habitat in Europa.

fuſcipes. 220. C. ater lævis, pedibus antennarumque baſi ferrugineis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 161. *n.* 39.
Habitat in Gallia.

fuſcus. 221. C. fuſcus, elytris ſtriatis, corpore ſubtus rufeſcente, pedibus antennisque ferrugineis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 96. *n.* 11.
Mull. zool. dan. prodr. p. 77. *n.* 830. Carabus fulvus.
Schaeff. ic. t. 18. *f.* 7.
Habitat in Europa, *mediæ magnitudinis.*

verſicolor. 222. C. æneus, corpore ovato brevi ſupra nigro-æneo, ſubtus nigro, thorace convexo, elytris lævibus, antennis baſi rufis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 98. *n.* 15.
Mull. zool. dan. prodr. p. 77. *n.* 824. Carabus varius.
Habitat in Europa, *parvus.*

ſubſtriatus. 223. C. niger nitidus, elytris ſubſtriatis: punctis quatuor impreſſis. *Degeer inſ.* 4. *p.* 102. *n.* 21.
Habitat in Europa, *inter minimos hujus generis.*

pen-

nsyl- nicus. 224. C. rufo-fuscus, capite obscuro, elytris striatis, corpore subtus, antennis pedibusque testaceis. *Degeer ins.* 4. *p.* 108. *n.* 4. *t.* 17. *f.* 22.
Habitat in Pensylvania, 7 *lineas longus.*

len- is. 225. C. niger, elytris striatis versus thoracem ferrugineis, antennis pedibusque testaceis. *Schall. Abh. der hall. naturf. Ges.* 1. *p.* 317.
Habitat rarior Halæ Saxonum, *in locis humidis sub lapidibus, ruficornis magnitudine, sed magis oblongus.*

chal- ri. 226. C. ater lævis, elytris striis subtilissimis punctatis. *Schall. Abh. der hall. naturf. Ges.* 1. *p.* 318.
Habitat Halæ Saxonum, *in viis inter agros, cuprei statura & magnitudine.*

ilis. 227. C. niger, elytris striatis thoraceque scabris opacis. *Schall. Abh. der hall. naturf. Ges.* 1. *p.* 318.
Habitat rarior Halæ Saxonum, *in viis campestribus, cuprei statura & magnitudine.*

trin- sueli- catus. 233. C. ater, thorace lateribus rotundato posterius truncato: linea dorsali & utrinque lineola baseos duplici impressa, elytris rugosis, rugarum quinque interiorum apice cum sexta confluente. *Mus. Lesk. p.* 38. *n.* 836.
Habitat in Europa.

rico- or. 234. C. nigro-ferrugineus, capite, antennarum basi thoraceque nigris, antennis cinereis glabris, elytris depressis striatis apice truncatis thoracisque marginibus externis ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 38. *n.* 837.
Habitat in Europa.

con- fluens. 235. C. ater, thorace lateribus rotundato, elytris striatis: rugis prima & octava, secunda & septi-

ptima apice unitis. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 843.
Habitat in Europa.

holoſericeus. 236. C. ater, capite thoraceque nigris, elytris ſtriis holoſericeis ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 844.
Habitat in Europa.

trichrous. 237. C. niger, antennis pedibusque ferrugineis, elytris leviſſime ſtriatis, capite thoraceque æneis: hujus linea dorſali & poſterius utrinque lineolis duabus impreſſis. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 845.
β) Carabus antennis baſi rubris. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 861.
γ) Carabus ater. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 880.
δ) Carabus niger. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 888.
Habitat in Europa.

pullus. 238. C. nigro-ferrugineus, elytris ſtriatis, antennis rufis. *Muſ. Lesk. p.* 38. *n.* 846.
Habitat in Europa.

quadratus. 239. C. thorace ſubquadrato: linea dorſali & poſterius utrinque lineola impreſſa, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 848. & 860.
Habitat in Europa.

plicatus. 240. C. ater, thorace ſuborbiculato poſterius utrinque plicato, elytris rugoſis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 849.
Habitat in Europa.

picatus. 241. C. piceus, elytris atris ſtriatis, thoracis linea dorſali & poſterius utrinque lineolis duabus impreſſis: interna altiore. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 850.
Habitat in Europa.

emarginatus. 242. C. ater, thorace ſubquadrato, poſterius truncato-

cato, elytris ſtriatis apice emarginatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 851.
Habitat in Europa.

chalybeus. 243. C. niger, capite thoraceque æneis, elytris ænco-nigris ſtriatis: marginibus externis virefcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 852.
Habitat in Europa.

erythrocerus. 244. C. niger, thorace ſubquadrato ad latera rotundato, elytris ſtriatis, antennis rufis, pedibus ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 853.
Habitat in Europa.

concolor. 245. C. niger, thorace ſubquadrato, elytris atris leviſſime ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 854.
ß) Carabus niger, elytris leviſſime ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 866.
Habitat in Europa.

erythropus. 246. C. niger, thorace poſterius quadrato, elytris ſtriatis, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 859.
ß) Carabus elytris punctato-ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 875.
Habitat in Europa.

crenatus. 247. C. niger, elytris ſtriatis punctato-crenatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 862.
Habitat in Europa.

diſtinctus. 248. C. ſupra niger, ſubtus ferrugineus, thorace poſterius truncato. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 865.
Habitat in Europa.

rubricornis. 249. C. niger, antennis rubris, thorace poſterius truncato: linea dorſali impreſſa. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 868.
Habitat in Europa.

punc-

punctu-latus. 250. C. niger, elytris punctulorum minimorum ordine notatis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 869.
β) Carabus elytrorum punctis ſex impreſſis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 881.
Habitat in Europa.

biſpi-noſus. 251. C. niger, thorace poſterius truncato, tibiis anticis craſſis biſpinoſis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 870.
Habitat in Europa.

erythro-melas. 252. C. niger, antennis tibiisque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 39. *n.* 871.
β) Carabus thorace poſterius truncato, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 873.
Habitat in Europa.

glaber. 253. C. niger glaber, thorace poſterius, truncato utrinque impreſſo, elytris ſtriatis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 872.
Habitat in Europa.

viri-dans. 254. C. nigro-vireſcens, antennis pedibusque ruſis, elytris ſtriatis: rugis planis leviſſime punctatis *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 874.
Habitat in Europa.

multi-color. 255. C. niger, capite thoraceque viridibus, elytris viridi-cæruleſcentibus luteſcente-villoſis; ore, antennarum baſi pedibusque ruſis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 876.
Habitat in Europa.

obfu-ſcatus. 256. C. fuſcus, thorace poſterius truncato, elytris ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 877.
Habitat in Europa.

mœ-

moestus. 257. C. niger, elytris striatis, tibiis ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 40. *n.* 879.
Habitat in Europa.

discolor. 258. C. niger, thorace posterius truncato: linea dorsali punctisque utrinque impressis, elytris striatis margine virescentibus, antennis ferrugineis basi rufis. *Mus. Lesk. p.* 40. *n.* 882. 883.
Habitat in Europa.

excisus. 259. C. ferrugineus glaber, thorace anterius truncato, posterius excisо, elytris striatis. *Mus. Lesk. p.* 40. *n.* 884.
Habitat in Europa.

limbatus. 260. C. niger, thorace marginato posterius plicato, elytris striatis, pedibus nigro-ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 40. *n.* 885.
Habitat in Europa.

truncatulus. 261. C. niger, thorace posterius truncato, elytris striatis, pedibus fusco-ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 40. *n.* 886.
Habitat in Europa.

chloromelas. 262. C. niger, supra viridis, antennis pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 40. *n.* 887.
Habitat in Europa.

sinuatus. 263. C. niger, elytris striatis apice sinuatis, antennis basi rufis. *Mus. Lesk. p.* 40. *n.* 889.
Habitat in Europa.

pallidicornis. 264. C. niger, elytris striatis, thorace posterius truncato: marginibus externis, antennis pedibusque pallidis. *Mus. Lesk. p.* 40. *n.* 892.
Habitat in Europa.

auri-chal-ceus. 265. C. nigro-æneus, antennis pedibusque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 894. *Habitat in* Europa.

rotun-datus. 266. C. niger, ſupra æneus, thorace rotundato, elytris ſtriatis, tibiis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 40. *n.* 897. *Habitat in* Europa.

litura-tus. 267. C. piceus, capite, pedibus ſtriatisque elytris teſtaceis: macula ad apicem communi magna thoraceque violaceis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 899. *Habitat in* Europa.

trunca-tus. 268. C. ater thorace poſterius truncato, elytris ſtriatis tibiarum baſi plantisque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 901.
β) Carabus piceus, tibiis totis ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 903.
γ) *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 910.
Habitat in Europa, *antennis rufis, femoribus fuſcis.*

ferrugi-nofus. 269. C. ferrugineus, thorace rotundato, elytris ſtriatis, antennis pedibusque lividis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 904.
ε) Carabus capite nigro. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 918. *Habitat in* Europa.

denigra-tus. 270. C. niger, thorace rotundato, elytris ſtriatis, antennis pedibusque ferrugineis, femoribus compreſſis ſupra nigris. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 905. *Habitat in* Europa.

cylin-dricus. 271. C. teſtaceus cylindricus, capite nigro, thorace orbiculato rufo. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 909. *Habitat in* Europa.

ge-

geniculatus. 272. C. niger, thorace ſuborbiculato, elytris pedibusque teſtaceis: geniculis fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 911.
Habitat in Europa.

quadrigutta-tus. 273. C. niger, thorace orbiculato, elytris fuſco-cæruleis: guttis quatuor pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 916.
Habitat in Europa.

ſexpunctatus. 274. C. nigro-æneus, thorace rotundato, elytris ſtriatis: punctis ad ſuturam impreſſis æneis trium parium. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 917.
Habitat in Europa.

porphyropus. 275. C. piceus, thorace truncato, elytris ſtriatis, antennis tibiisque rufis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 920.
Habitat in Europa.

ſuſcicornis. 276. C. niger ſupra æneus, thorace rotundato punctato, elytris crenato-ſtriatis, antennis fuſcis, pedibus rufis. *Muſ. Lesk. p.* 41. *n.* 921.
Habitat in Europa.

atratus. 277. C. niger, thorace orbiculato, elytris pallidis nigro-variis, antennis pedibusque fuſco-ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 42. *n.* 924.
Habitat in Europa.

triſpinoſus. 278. C. niger, capite thoraceque orbiculato æneis, elytris ferrugineo-æneis ſtriato-punctatis, pedibus rufis: femoribus craſſis, tibiis triſpinoſis. *Muſ. Lesk. p.* 42. *n.* 925.
Habitat in Europa.

mœſtus. 279. C. ferrugineus, thorace rotundato, elytris ſtria-

striatis, capite fusco, antennis pedibusque testaceis. *Musf. Lesk. p.* 42. *n.* 926.
Habitat in Europa.

lepidus. 280. C. supra æneo-viridis, subtus cæruleſcens, thorace subquadrato, postice striis quatuor impressis, tibiis anticis apice dilatatis. *Lesk. ib. p.* 17. *t.* A. *f.* 6.
Habitat in Lusatiæ *monte* Keulenberg, 6 *lineas longus, vulgari affinis.*

214. TENEBRIO. *Antennæ* moniliformes: articulo ultimo subrotundo.
Thorax plano-convexus, marginatus. *Caput* exsertum.
Elytra rigidiuscula.

* *palpis sex filiformibus: tibiis anterioribus fossoriis, palmato-dentatis.* Scaritæ Fabricii & Pallasii.

complanatus. 13. T. ater, thorace subquadrato, elytris lævissimis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 206. *n.* 1.
Habitat in Cayenna, *magnus.*

marginatus. 14. T. ater, thorace subquadrato, elytris sulcatis: margine cyaneo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 206. *n.* 2.
Habitat in Cayenna, *an varietas depressi?*

giganteus. 15. T. ater, mandibulis sulcatis, elytris lævibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 314. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 206. *n.* 3.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. *t.* 47. *f.* 4.
Habitat in Africa *aquinoctiali, subterraneo proxime affinis, at triplo major.*

su-

subterraneus. 16. T. ater, capite antèrius sulcato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 314. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 206. *n.* 4.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 6. *p.* 133. *n.* 18. *t.* 29. *f.* 4. a. Carabus interruptus.
Sulz. hist. inf. t. 7. *f.* 4.
Voet coleoptr. t. 33. *f.* 2.

cyaneus. 17. T. cyaneus glaberrimus, antennis pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 314. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 205. *n.* 5.
Habitat in nova Hollandia.

Fossor. 7. T. piceus. *Fn. suec.* 817. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 314. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 206. *n.* 6.
Degeer inf. 4. *p.* 350. *n.* 1. *t.* 30. *f.* 1. 2. Attelabus Fossor.
Habitat in Europæ *collibus arenosis, quos perforat.*

Cursor. 8. T. fuscus, thorace oblongo: angulis quinque denticulatis. *Fn. suec.* 818. *
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 314. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 206. *n.* 7. Scarites testaceus, thorace oblongo, angulis quinque denticulatis.
Mull. zool. dan. prodr. p. 74. *n.* 798. Tenebrio fuscus.
Habitat in Europæ *collibus arenosis, pediculi longitudine.*

arabs. 10. T. niger, thorace serrato, antennis pedibusque testaceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 314. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 206. *n.* 8.
Habitat in Oriente.

minutus. 12. T. niger, thorace marginato, antennis clavatis pedibusque piceis.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 315. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 207. *n.* 9. Scarites piceus, antennis clavatis.

Ha-

Habitat Sueciæ, *duplo major in* Saxoniæ *fabuleis; an hujus generis?*

collaris. 19. T. niger, elytris punctato-striatis & capite fuscis, antennis pedibusque piceis: anterioribus spinosis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 141. *n.* 56. *t.* 29. *f.* 15.
Habtiat Berolini, 3 *fere lineas longus.*

bucephalus. 20. T. totus fuscus punctatus, oculis nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 141. *n.* 57. *t.* 29. *f.* 16. i.
Habitat in India, 3 *lineas longus.*

** *palpis inæqualibus filiformibus*, Scaurus Fabricii.

atratus. 21. T. totus ater glaber. *Fab. sp. inf.* 1. *p.* 320. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 270. *n.* 1.
Habitat in Ægypto, *elytris connatis, pedibus anterioribus bidentatis.*

*** *palpis quatuor, anterioribus subclavatis, posterioribus filiformibus*, Tenebriones Fabricii, Mylarides Pallasii.

lamina- tus. 22. T. niger, thorace subquadrato lævi, elytris sulcatis, tibiis anterioribus incurvis apice lamina ferruginea acutis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 211. *n.* 1.
Habitat in India, *maximus sui generis.*

Gigas. 1. T. ater, elytris striatis, thorace lævi. *Amœn. ac.* 6. *p.* 396. *n.* 26.
Pall. ic. inf. Ruff. 1. *p.* 37. *t.* C. *f.* 1. Mylaris gigantea.
Habitat Surinami, *lucani cervi magnitudine antennis subclavatis.*

pun-

punctatulus. 23. T. niger, thorace quadrato: marginibus subdenticulatis, elytris striato-punctatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 211. *n.* 2.
Habitat in India, *magnus*, *palpis securiformibus.*

serratus. 24. T. ater, glaber, elytris striatis, tibiis posterioribus serratis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 322. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 211. *n.* 3.
Habitat in Sierra Leon Africæ.

Molitor. 2. T. totus niger, femoribus anterioribus crassioribus. *Fn. suec.* 875. *Scop. ent. carn.* 259. *Fn. suec.* 547. Mordella antennarum articulis lentiformibus: ultimo globoso.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 322. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 211. *n.* 4. Tenebrio oblongus piceus, elytris striatis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 349. *n.* 6. Tenebrio atra oblonga, &c.
Degeer inf. 5. *p.* 34. *n.* 3. *t.* 2. *f.* 4. Tenebrio elatus nigro-fuscus, &c.
Raj. inf. 4. (larva) Vermis farinarius.
Frisch inf. 3. *p.* 1. *t.* 1.
Sulz. hist. inf. t. 7. *f.* 52.
Schaeff. ic. t. 66. *f.* 1.
Habitat in farina pistorum, molendinis, pane ficco, faccharato.
Larva *pallida*, *glabra*, *segmentis* 13, *mollis*, *luscinis gratissimus cibus.*

luridus. 26. T. niger, pedibus fuscis. *Fabr. mant.* 1. *p.* 211. *n.* 5.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 325. *n.* 9. Helops luridus.
Habitat in Brasilia.

chalybeus. 3. T. violaceus, pedibus antennisque piceis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 323. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 211. *n.* 7.

De-

Degeer inſ. 5. *p.* 53. *n.* 4. *t.* 13. *f.* 11. Tenebrio æneus.
Habitat in Guinea.

mauritanius. 4. T. niger, ſubtus piceus, thoracis marginibus anterius poſteriusque dente angulatis.
Habitat Algiriæ, *chalybeo ſimilis, at quintuplo minor, pedibus antennisque piceis.* Brander.

variegatus. 27. T. oblongus, fuſco cinereoque varius. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 323. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 8.
Habitat in Africa *æquinoctiali, fuſcus, pilis griſeis varius.*

abbreviatus. 28. T. ovatus ater, elytris ſtriatis, capite tuberculato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 313. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 211. *n.* 9.
Habitat in India.

capenſis. 30. T. ovatus niger, elytris ſtriatis, tibiis anterioribus dentato-ſpinoſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 323. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 10.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *an forſan primæ tribus?*

cornutus. 31. T. thoracis bicornis marginibus crenatis angulisque prominulis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 324. *n.* 8. *mant. inſ* 1. *p.* 212. *n.* 11.
Habitat Smirnæ.

ſanguinipes. 32. T. ater, antennis pedibusque ſanguineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 323. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 12.
Habitat in nova-Hollandia.

bipreſtoides. 33. T. ater, thorace ovali marginato, elytris conjunctis lævibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 323. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 13. *Pall.*

Pall. it. II. *p.* 719. *n.* 44.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *caraboidi proxime affinis, at major.*

dermeſtoides. 34. T. ater, thorace ovali marginato, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 14.
Habitat Halæ Saxonum, *bupreſtoidi affinis.*

culinaris. 5. T. ferrugineus, elytris ſtriatis, clypeo emarginato. *Fn. ſuec.* 816. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 15.
Fn. ſuec. 546. Mordella ferrugineo-rufa, thorace antice depreſſo.
Schaeff. ic. t. 66. *f.* 2.
Habitat in Hiſpaniæ *arena mobili*, *in* Sueciæ *quiſquiliis*, *& frumentorum acervis.*

barbarus. 6. T. ater glaberrimus, thorace orbiculato, capitis clypeo anterius margine elevato.
Habitat in Mauritania, *nitidus*, *carabi mediotris magnitudine*, *elytris connatis.* Brander.

erraticus. 9. T. niger, antennis thorace ſuborbiculato elytrisque ferrugineis, his apice fuſcis. *Fn. ſuec.* 819. *
Habitat in Europa.

pallens. 10. T. pallide teſtaceus, thorace tranſverſo. *Fn. ſuec.* 820. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 324. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 16.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *parvus.*

ferrugineus. 35. T. ferrugineus, elytris ſtriatis teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 324. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 212. *n.* 17.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *pallente minor & magis depreſſus.* vil-

Tenebriones & Pimeliæ *in locis ſuffocatis, umbroſis. quiſquiliis potiſſimum in terra ipſa, larvæ ibidem, in ligno, farina, aliisque cibariis degunt.*

villosus. 36. T. fuscus cinereo-villosus, elytris lævibus ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 212. *n.* 18.
Habitat in Europæ *quisquiliis*, *parvus.*

caraboides. 25. T. niger, thorace ovali marginato, elytris striatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 324. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 212. *n.* 19.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 25. *Fn. suec.* 825. Tenebrio apterus, thorace ovali marginato, coleoptris carinatis.
Fn. suec. 595. Tenebrio ater: coleoptris pone rotundatis, maxillis prominentibus.
Degeer inf. 4. *p.* 97. *n.* 7. *t.* 3. *f.* 13. Carabus coadunatus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 64. *n.* 5. Platycerus fuscus, elytris striatis.
Habitat in Europæ *quisquiliis.*

brunnipes. 37. T. ater glaber nitidus, elytris striatis, antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 212. *n.* 20.
Habitat Dresdæ, *parvus.*

lævigatus. 29. T. oblongus ater, elytris lævisculis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 323. *n.* 3. *mant. inf* 1. *p.* 211. *n.* 6.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 678. *n.* 29. Tenebrio apterus niger lævis, elytris lævibus, thorace lunato subtus cæruleus.
Habitat in Africa *æquinoctiali*, *molitore paulo minor.*

gibbosus. 38. T. subovatus totus æneus, elytris gibboso-convexis: striis tenuissimis crenulatis. *Pall. ic. ins. Russ.* 1. *p.* 38. *t.* C. *f.* 2.
Habitat in Brasilia, *pimeliæ mortisagæ magnitudine.*

spinimanus. 39. T. thorace marginato lævi, elytris lævissimis posterius obtusis, tibiis primoribus spina robustis-

ſtiſſima arcuata productis. *Pall. ic. inſ. Ruſſ.* 1. *p.* 55. *t.* C. *f.* 23.
Habitat in Ruſſia *auſtrali*, *circa* Boryſthenem, *pimeliæ mortiſagæ magnitudine, ſed craſſior & magis convexus, aterrimus, nitidus, glaberrimus, durus.*

biuncinatus. 40. T. apterus niger, thorace marginato ſubæquali, elytris ſtriato-punctatis angulatisque, femoribus anterioribus clavatis maximis biuncinatis. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 60. *n.* 60.
Habitat in Hiſpania, *pimeliæ mortiſagæ magnitudine, ſed gracilior, elytris brevioribus.*

piceus. 41. T. depreſſus niger, ſubtus piceus, elytris ſtriatis. *Schaller Abh. der hall. naturf. Geſ.* 1. *p.* 319.
Habitat Halæ Saxonum *ſub corticibus & in ligno ſaligno putrefcente; an a mauritanico vere diverſus?*

cylindricus. 42. T. aterrimus, thorace punctis elevatis, antennis fuſcis tarſis ſubtus flavo-piloſis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 6. *p.* 144. *n.* 3.
Habitat Berolini, *molitori proxime affinis.*

montanus. 43. T. totus ater, elytris opacis. *Scop. ann. hiſt. nat.* 5. *p.* 108. *n.* 102.
Habitat in Hungariæ *inferioris montanis.*

triſtis. 44. T. niger ſubopacus, punctis excavatis variolofus. *Scop. ent. carn. n.* 256.
Habitat in Carniola.

pomonæ. 45. T. ſupra piceus, infra nigris, elytris ſtriis elevatis quinis. *Scop. ent. carn. n.* 257.
Habitat in Carniolæ *arboribus pomiferis, larvis binis terniſve reticulo laxo tectis in folio convoluto latentibus.*

ca-

capreæ. 46. T. niger, thorace punctis impressis elytrisque testaceis. *Scop. ent. carn. n.* 258.
Habitat in Carniolæ & Helvetiæ *salice caprea.*

flavus. 47. T. flavus, oculis nigris. *Scop. ent. carn. n.* 260.
Habitat in Carniolæ *umbelliferis.*

æstivus. 48. T. niger, palpis pedibusque flavis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 74. *n.* 795.
Habitat in Dania.

striatus. 49. T. niger; abdomine subtus dense striato. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 74. *n.* 796.
Habitat in Dania.

festinans. 50. T. totus niger glaber, thorace ferrugineo. *Habitat - - - cicindelæ affinis, pediculi magnitudine, femoribus clavatis.*

globosus. 51. T. ater, thorace globoso: lineis duabus scabris elevatis. *Lepech. it.* II. *p.* 209. *t.* 11. *f.* 34.
Habitat in Sibiria.

incurvatus. 52. T. totus piceus, elytris striatis medio transversaliter impressis. *Lepech. it.* II. *p.* 210. *t.* 11. *f.* 25.
Habitat in Sibiria.

ovatus. 53. T. ovatus nigro-fuscus, elytris striis octo lævibus. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 348. *n.* 4.
Habitat in Gallia.

rotundata. 54. T. niger totus lævis, coleoptris pone rotundatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 351. *n.* 8.
Habitat in Gallia.

subvillosus. 55. T. totus ferrugineus subvillosus. *Geoffr. inf. Ha-*
par. 1. *p.* 351. *n.* 9.

Habitat in Gallia. *)

glaber. 56. T. totus ferrugineus lævis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 351. *n.* 10.
Habitat in Gallia.

ignatius. 57. T. thorace cavitatibus duabus, elytris violaceis vel rufis, antennis pedibusque ferrugineis. *Degeer inf.* 5. *p.* 38. *n.* 4. *t.* 2. *f.* 15-18.
Habitat in Europa, *larva sub cortice pinuum in terra jacentium, quarum librum corrodunt; imago* 5 *lineas longa; mas minor.*

lardacius. 58. T. oblongus flavo-fulvus, oculis nigris, elytris striis punctatis. *Degeer inf.* 5. *p.* 45. *n.* 7. *t.* 2. *f.* 25. 26.
Habitat in Belgis, *larva in vesica fuilla; imago pulicis magnitudine.*

curvipes. 59. T. ovatus piceus, elytris punctato-striatis, femoribus arcuatis: posterioribus subtus ciliatis. *Muf. Lesk. p.* 42. *n.* 937.
Habitat in Europa.

bicolor. 60. T. ovatus, elytris striatis, supra niger, subtus antennis pedibusque ferrugineis. *Muf. Lesk. p.* 42. *n.* 938.
Habitat in Europa.

ater. 61. T. ater, antennis ferrugineis. *Muf. Lesk. p.* 42. *n.* 939.
Habitat in Europa.

lunatus. 62. T. niger depressus, thorace lunato, elytris striatis, pedibus ferrugineis. *Muf. Lesk. p.* 42. 941.
Habitat in Europa. hi-

*) *Species* 43-55 *enumeratæ utrum ad tenebriones, an ad pimelias referendæ, autoptis definiendum relinquo.*

hispidus. 63. T. niger hispidus, elytris striatis: basi macula utrinque rufa, antennis tibiisque rufis. *Mus. Lesk. p.* 42. *n.* 942.
Habitat in Europa.

glaber. 64. T. ferrugineus, capite thoraceque glabris elytrisque atris: his striatis, ore ferrugineo, pedibus lividis. *Mus. Lesk. p.* 42. *n.* 943.
Habitat in Europa.

PIMELIA. *Antennæ* filiformes.
Palpi quatuor.
Thorax plano-convexus, marginatus.
Caput exsertum.
Elytra rigidiuscula. *Alæ* (*plurimis*) nullæ.

* *antennis apice moniliformibus.*
† *palpis clavatis*, Blaps Fabricii.

Gages. 1. P. nigra, thorace rotundato, elytris mucronatis lævissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 321. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 210. *n.* 1.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 14. Tenebrio Gages.
Sulz. hist. inf. p. 64. *t.* 7. *f.* 9.
Habitat in Europa *magis australi, simillima morti-sagæ, at duplo major.*

sulcata. 2. P. coleoptris mucronatis sulcatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 321. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 210. *n.* 2.
Forsk. Fn. arab. p. 79. *n.* 10. Tenebrio (polychrestus) apterus, elytris mucronatis, singulis striis novem elevatis.
Habitat in Ægypti *hortis frequens.*
Commendantur contra aurium dolores scorpionumque morsum, & coctæ a feminis turcis saginandi causa comeduntur.

mor-

mortifaga. 3. P. atra, coleoptris mucronatis lævibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 321. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 3.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 15. Tenebrio (mortiſagus) apterus, thorace æquali, coleoptris lævibus mucronatis.
Fn. ſuec. 594. 822. * *Scop. ent. carn.* 252. Tenebrio ater coleoptris acuminatis.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 346. Tenebrio atra aptera, &c.
Degeer inſ. 5. *p.* 31. *n.* 1. Tenebrio acuminatus.
Mouff. inſ. 139. Blatta fœtida.
Raj. inſ. p. 90. *n.* 12.
Liſt. ſcar. angl. p. 388. *n.* 21.
Jonſt. inſ. t. 16.
Aldr. inſ. 499.
Petiv. gazoph. t. 24. *f.* 7.
Friſch. inſ. 13. *t.* 25.
Schaeff. elem. t. 24. *f.* 1.
icon. t. 6. *f.* 13. & *t.* 37. *f.* 6.
Habitat in Europæ *umbroſis ſuffocatis.*

excavata. 4. P. thorace poſterius angulato, elytris excavato punctatis acutiuſculis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 322. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 4.
Petiv. gazoph. t. 92. *f.* 14.
Act. angl. 271. 861. 13.
Habitat in Coromandel.

ſtriata. 5. P. ater, thorace poſterius angulato, elytris obtuſis ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 322. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 5.
Habitat in Coromandel, *ſtatura excavatæ.*

crenata. 6. P. griſeo-fuſcus, thorace poſterius angulato, elytris crenato-ſtriatis obtuſis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 322. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 210. *n.* 6.
Habitat in Coromandel, *ſtatura ſtriatæ, at duplo minor.*

ſpe-

speciosa. 7. P. subovata ænea alata, elytris politissimis striatis cupreo viridique lineatis.
Pall. ic. inf. Russ. 1. *p.* 39. *t.* C. *f.* 3. Mylaris speciosa.
Habitat in Brasilia, *attelabi ceramboidis magnitudine.*

chrysomeloides. 8. P. ovata scaberrima, thorace longitudinaliter rugoso, elytrorum porcis tribus verrucosis. *Pall. ic. inf. Russ.* 1. *p.* 52.
Habitat in Mauritania, *glandis magnitudine, an forsan ad alteram tribum ableganda.*

costata. 9. P. subgloboſa glabriuscula opaca, elytris singulis costis tribus crenulatis: extima carinata.
Pall. ic. inf. Russ. 1. *p.* 52. *t.* C. *f.* 18. Tenebrio costatus.
Habitat, rarior, in torridis deserti caspici inter fluvios Volgam *&* Ural *intermedii; an forte insequentis tribus?*

torulosa. 10. P. ovato-subgloboſa, elytris tuberculatis undique convexis enerviis.
Pall. ic. inf. Russ. 1. *p.* 51. *n.* 17. *t.* C. *f.* 17. Tenebrio torulosus.
Habitat ad Caput bonæ spei, *magnitudine variabilis.*

agricola. 11. P. rufescens, thorace capiteque nigris. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 108. *n.* 101.
Habitat in agro Laibacensi, *tenebrionis molitoris magnitudine.*

fabulosa. 12. P. atra, coleoptris rugosis pone acuminatis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 347. *n.* 2. *t.* 6. *f.* 6.
Habitat in Gallia *&* Helvetia.

octostriatus. 13. P. nigra, elytrorum striis octo punctatis per pa-

paria disposítis. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 348. *n.*3. *Habitat in* Gallia. *)

†† *palpis filiformibus.*

striata. 14. P. atra glabra, elytris striis quatuor sanguineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 316. *n.* 1. *mant. inf.*1. *p.* 207. *n.* 1.
Pall. ic. inf. Ruff. 1. *p.* 45. *t.* C. *f.* 11. a. b.
Habitat ad Caput bonæ spei, *mortisaga major, nitida.*

unicolor. 15. P. glabra nigra, elytris immaculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 316. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 207. *n.* 2.
Pall. ic. inf. Ruff. 1. *p.* 46. *t.* C. *f.*12. Tenebrio gibbus.
Sulz. hist. inf. t. 7. *f.* 9. Tenebrio gigas.
Habitat ad Caput bonæ spei, *striatæ affinis, at paulo minor.*

gibba. 16. P. atra, thorace globoso, elytris linea abbreviata elevata carinatis. *Fabr. mant. inf.*1.*p.*207. *n.* 3.
Habitat in India.

hispida. 17. P. atra, corpore muricato hispido. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 316. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 207. *n.* 4.
Forsk. Fn. arab. p. 79. *n.* 8. Tenebrio hispidus.
Pall. ic. inf. Ruff. 1. *p.* 42. *t.* 6. *f.* 1. Tenebrio setosus.
Habitat rarior in Africa, *mortisagæ magnitudine, sed brevior & crassior.*

longipes. 18. P. atra, elytris connatis muricatis, pedibus longioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 316. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 208. *n.* 5.
Habitat in Ægypto.

*) Species 11-13 *an hujus generis ordinitve sint, haud certo constat.*

cephalotes. 19. P. thoracis margine anteriori & posteriori ciliato, elytris scaberrimis: nervis quatuor lateralibus carinatis subserratis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 16? Tenebrio (grossus) apterus niger glaber, coleoptris nervosis: nervis lateralibus scabris, thorace emarginato.
Pall. ic. inf. Russ. 1. *p.* 49. *t.* C. *f.* 15. Tenebrio cephalotes.
Habitat in desertis *aridissimis salsis australibus Uralensibus, muricata brevior, & ut plurimum minor.*

muricata. 20. P. nigra, coleoptris obtusis: striis muricatis.
Fabr. pf. inf. 1. *p.* 316. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 208. *n.* 6.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 12. *Mus. Lud. Ulr.* 100. * *Pall. ic. inf. Russ.* 1. *p.* 48. *t.* C. *f.* 14. Tenebrio muricatus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 352? Tenebrio atra aptera rotundata, elytris sulcis tribus elevatis.
Pet. gaz. 11. *t.* 92. *f.* 14.
Habitat in Europa *australi*, Ægypto, *in deserto arenoso* Naryn, *inter fluvios* Volga & Ural, *nemorum posteriorum attritu ad elytra stridens. mortisaga major.*

tuberculata. 21. P. nigra, thorace scabro, elytris tuberculato-muricatis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 208. *n.* 7.
Habitat in Europa *magis australi, statura muricatæ at duplo minor.*

bipunctata. 22. P. atra, thorace globoso: punctis duobus impressis, elytris rugosis: striis elevatis tribus lævibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 316. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 208. *n.* 8.
Habitat in Italia, *statura muricatæ.*

scabra. 23. P. atra, elytris scabris lineisque elevatis tribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 317. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 208. *Habn.* 9.

Habitat ad Caput bonæ ſpei, *& in* Barbariæ *ruderatis.*

angulata. 24. P. elytris ſpinoſis: linea laterali elevata ſerrata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 317. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 10.
Forsk. Fn. arab. p. 80. *n.* 13. Tenebrio ſpinoſus.
Pall. ic. inſ. Ruſſ. 1. *p.* 55. *t.* H. *f.* C. 22. Tenebrio aſperrimus.
Habitat Alexandriæ *in* Ægypto.

echinata. 25. P. thoracis lateribus ſpinoſis, elytris lineis elevatis tribus echinatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 317. *n.* 9. *mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 11.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura angulatæ.*

dentipes. 26. P. thorace ſcabro, elytris piloſis muricatis, femoribus anterioribus uniſpinoſis, *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 12.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura echinatæ, at paulo minor.*

dentata. 27. P. nigra, thorace glabro, elytris fuſcis: lineis elevatis tribus ſerratis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 208. *n.* 13.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *pedibus inermibus elongatis.*

porcata. 28. P. thorace lævi nitido, elytris lineis elevatis tribus: interjectis punctis elevatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 317. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 14.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *echinata minor.*

maculata. 29. P. thorace nigro, elytris cinereis fuſco, maculatis: lineis tribus elevatis; ſecunda ſubundata. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 317. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 15.
Habitat ad Caput bonæ ſpei.

ferrata. 30. P. thorace varioloso, elytris lineis tribus elevatis echinatis: interstitiis rugosis, pedibus elongatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 317. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 16.
Habitat ad Caput bonæ spei, *parva, atra.*

minuta. 31. P. thorace lævi obscuro, elytris cinereis hispidis: lineis tribus elevatis lævibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 318. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 17.
Habitat ad Caput bonæ spei, *pedibus cinereis.*

rugosa. 32. P. thorace scabro, elytris rugosis anterius angustioribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 318. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 18.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 678. *c.* 27 ? Tenebrio apterus niger, elytris rugosis, abdomine pedibusque cærulescentibus, thorace lunato.
Habitat in Ægypto.

gibbosa. 33. P. nigra lævis, thorace orbiculato convexo anterius truncato.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 18. *Fn. suec.* 824. Tenebrio gibbus.
Habitat in Europa & Africa.

linearis. 34. P. nigra lævis, pedibus ferrugineis, antennis brevissimis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 23. Tenebrio linearis.
Habitat in Suecia, *magnitudine culicis; an hæc & gibbosa huic generi tribuique adscribendæ, judicent autoptæ.*

pubescens. 35. P. ovata lanuginosa opaca: elytris singulis costis quatuor denticulatis.
Pall. ic. inf. Russ. 1, *p.* 53. *t.* C. *f.* 19. Tenebrio pubescens.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 22. Tenebrio (angulatus) apterus, thorace teretiusculo, elytris striis

striis quatuor elevatis : tertia crenata.
Voet coleoptr. 1. *t.* 39. *f.* 52.
Habitat in Ægypto *&* Ural *intermedii*, *rarior*, *supra aterrimus*, *coſtato magis oblongus*.

spinoſa. 36. P. thorace marginato anterius & poſterius ſpinoſo, elytris ſtriis elevatis lævibus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 318. *n.* 15. *man. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 19. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 677. *n.* 24. *Muſ. Lud. Ulr.* 101.* Tenebrio ſpinoſus.
Habitat in Europa *auſtrali*, Oriente.

acuminata. 37. P. thorace marginato : marginibus anterius & poſterius ſpinoſis, elytris lævibus carinatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 20.
Habitat in Europa *magis auſtrali*, *ſpinoſæ proxime affinis tota atra.*

reflexa. 38. P. thorace marginato : marginibus reflexis, elytris muricatis : linea laterali carinata lævi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 318. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 209. *n.* 21.
Forsk. Fn. arab. p. 79. *n.* 9. Tenebrio vulgaris.
Pall. ic. inſ. Ruſſ. 1. *p.* 41. *t.* C. *f.* 6. Tenebrio pterygodes.
Habitat in Oriente, *frequens in* Ægypto, *auritæ affinis*, *at minor.*

aurita. 39. P. thorace marginato anterius dilatato, elytris utrinque bicarinatis lævissimis muticis.
Pall. ic. inſ. Ruſſ. 1. *p.* 40. *t.* C. *f.* 5. a. b. Tenebrio auritus.
Habitat ad lacum Sibiriæ Inderienſem, *tota atra*, *mortiſaga major & magis oblonga.*

faſciata. 40. P. atra, thorace ſuborbiculato, elytris faſciis duabus abbreviatis flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 318. *n.*

n. 18. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 22.
Habitat in India.

collaris. 41. P. nigra, elytris lævibus uniangulatis, thorace angustiore, capite depressiusculo, carinato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 319. *n.* 19. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 23.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 21. Tenebrio (collaris) apterus niger, elytris læviusculis uniangulatis, thorace angustiore, capite depressiusculo carinato.
Habitat in Europa *australi*, *e geniculis oleum flavescens exsudans.*

carinata. 42. P. nigra, thorace orbiculato, elytris lineis elevatis tribus lævibus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 319. *n.* 20. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 24.
Forsk. Fn. arab. p. 878. *n.* 6. Tenebrio ægyptiacus.
Habitat in Gallia, Calabria, Ægypto.

lineata. 43. P. thorace rotundato scabro, elytris striis tribus punctato-scabris posterius lineolis albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 319. *n.* 22. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 26.
Habitat in Sibiria, *parva.*

ciliata. 44. P. nigra depressa, thorace elytrisque reflexo-marginatis ciliatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 319. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 25.
Habitat ad Caput bonæ spei.

glabra. 45. P. atra, thorace rotundato, elytris glaberrimis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 319. *n.* 23. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 27.
Forsk. Fn. arab. p. 78. *n.* 7. Tenebrio lævis.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 678. *n.* 30 ? Tenebrio (latipes) apterus niger lævis, elytris lævibus thorace sublunato, subtus ater. *Pall.*

Pall. ic. inf. Ruff. 1. *p.* 44. *t.* C. *f.* 10 ? Tenthredo hypolithus.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 351. *n.* 8 ? Tenebrio nigra tota lævis, coleoptris pone rotundatis.
Voet coleoptr. 1. *t.* 32. *f.* 5.
Habitat in Africa, Calabria, *& frequens in arenosis aridis sub saxis latens ad* Volgam.

angustata. 46. P. glabra, thorace posterius angustato, elytris acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 320. *n.* 24. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 28.
Pall. ic. inf. Ruff. 1. *p.* 44. *t.* C. *f.* 9. Tenebrio longicornis.
Habitat in deserto australi circa Volgam, *sub lapidibus & in stercore vaccino ficco vere frequens, & in* Ægypto, *carabi mediocris magnitudine.*

orbiculata. 47. P. glabra, thorace orbiculato, elytris acuminatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 320. *n.* 25. *mant. inf.* 1. *p.* 209. *n.* 29.
Pall. ic. inf. Ruff. 1. *p.* 43. *t.* C. *f.* 8. Tenebrio Nomas.
Barrel. ic. plant. t. 945.
Habitat in Oriente, *in universo deserto* tatarico, *& campis aridis* Sibiriæ *australis tota æstate frequens, durissima.*

didyma. 48. P, thorace late marginato, posterius bicorni, elytris angulatis supra biconvexis.
Pall. ic. inf. Ruff. 1. *p.* 42. Tenebrio dydimus.
Habitat in Mauritania, *mortisagæ fere magnitudine, tota atra, glabra.*

caspica. 49. P. ex ovato depressiuscula, thorace anterius posteriusque excavato, elytris utrinque carinatis: fasciis scaberrimis lævigatisque alternis.
Pall. ic. inf. Ruff. 1. *p.* 47. *t.* C. *f.* 13. Tenebrio caspicus.

Ha-

Habitat in ripis elatioribus maris caſpii, *præſertim orientem verſus ſitis, mortiſaga duplo craſſior.*

ſubgloboſa. 50. P. ſubgloboſa, elytris toruloſo-lævigatis: nervis ſubquaternis; extimis carinatis crenulatis.
Pall. ic. inſ. Ruſſ. 1. *p.* 50. *t.* C. *f.* 16. a. b. Tenebrio ſubgloboſus.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 678. *n.* 28. Tenebrio (variabilis) apterus niger lævis, elytris elevato-punctatis angulatisque.
Habitat in Gallia *auſtrali, circa* Volgam, *& in* limoſis *torridis deſerti* tatarici *magis auſtralis, lente incedens, interdiu fere immota, gordiis frequenter infeſtata, varicata brevior, & magis globoſa; an vere diſtincta a rugoſa?*

ſilphoides. 51. P. thoracis lateribus poſterius acuminatis, anterius exciſis, elytris ſtriis tribus elevatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 26. Tenebrio ſilphoides.
Syſt. nat. X. *p.* 360. *n.* 9. Silpha maura.
Habitat in Mauritania.

tibialis. 52. P. nigra lævis, tibiis anterioribus compreſſis unidentatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 678. *n.* 31. Tenebrio tibialis.
Habitat in Africa, Hiſpania, *vix chryſomela major, tota opaca.* Brander.

femoralis. 53. P. nigra lævis, femoribus craſſiuſculis, ſubtus canaliculatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 679. *n.* 32. Tenebrio femoralis.
Habitat in Germania, *chryſomela minor.*

ſtriatula. 54. P. nigra, coleoptris ovato-oblongis ſtriatis.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 679. *n.* 33. Tenebrio ſtriatulus.
Habitat in Hiſpania.

la-

laticollis. 55. P. ovalis depreſſa aterrima lævisſima, thorace marginato latiſſimo anterius excavato, poſterius truncato, elytris ſubſtriatis.
Pall. ic. inſ. Ruſſ. 1. *p.* 56. *t.* H. *f.* C. 21. Tenebrio laticollis.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *magnitudine glabræ, ſed multo magis depreſſa.* *)

vittata. 85. P. gibba atra, elytris connatis glabris: ſutura & utrinque ſtriis tribus coccineis, pedibus inermibus nigris. *Muſ. Lesk. p.* 42. *n.* 932.
Habitat extra Europam.

** *antennis totis filiformibus.*
† *palpis quatuor filiformibus*, Sepidia Fabricii.

tricuſpidata. 56. P. thorace tricuſpidato, corpore griſeo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 315. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 1.
Forsk. Fn. arab. p. 80. *n.* 12? Tenebrio alexandrinus.
Habitat in Ægypto.

criſtata. 57. P. thorace tricuſpidato criſtato, corpore variegato. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 315. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 2.
Pall. ic. inſ. Ruſſ. 1. *t.* C. *f.* 26.
Habitat in Ægypto.

reticulata. 58. P. thoracis lateribus angulatis, elytris reticulatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 315. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 207. *n.* 3.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura & magnitudine tricuſpidatæ.*

cor-

*) *De his poſterioribus ſpeciebus, potiſſimum* 52–55, *incertum, cui tribui accenſenda.*

corrugata. 59. P. atra, thorace lævi nitido, elytris rugosis: linea elevata unica. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 315. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 207. *n.* 4.
Habitat ad Caput bonæ spei, *reticulatæ proxime affinis.*

vittata. 60. P. thorace subangulato elytris atris: vittis duabus albis lineaque elevata unica. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 315. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 207. *n.* 5.
Habitat ad Caput bonæ spei, *reticulata duplo minor.*

†† *palpis anterioribus securiformibus, posterioribus clavatis*, Helopes Fabricii.

cærulea. 61. P. cæruleſcens, thorace ſuborbiculato, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 324. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 213. *n.* 1.
Muſ. Lud. Ulr. 98. *
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 677. *n.* 19. Tenebrio apterus cæruleſcens, thorace ſuborbiculato, coleoptris obtuſis.
Liſt. angl. app. 4. *f.* 14.
Pet. gaz. t. 22. *f.* 6.
Habitat in Europa *magis auſtrali.*

lanipes. 62. P. aurea, elytris ſtriatis acuminatis. *Fabr. ſp. inf.* 1. *p.* 324. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 213. *n.* 2.
Mant. 1. *p.* 533. Tenebrio alatus æneus, elytris ſubbifido-mucronatis, plantis ſubtus hirſutis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 349. *n.* 5. Tenebrio nigro-cuprea, &c.
Scop. ent. carn. 255. Tenebrio æneus.
Habitat in Germaniæ *quiſquiliis.*

ærugi-noſa. 63. P. viridi-ænea, antennis, elytris pedibusque nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 213. *n.* 3.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *ſtatura & magnitudine lanipedis.*

ſer-

ferrata. 64. P. nigra, digitis ferrugineis, palpis porrectis.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.*324. *n.*3. *mant. inſ.*1. *p.*213. *n.* 4.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 675. *n.* 11 ? Tenebrio (depreſſus) alatus niger, elytris cæruleſcentibus, antennis tibiisque ſanguineis, thorace depreſſo.
Schall. Abh. der hall. Geſ. naturf. Fr. 1. *p.* 324. Tenebrio rufibarbis.
Sulz. act. Dreſd. 1. Serratula.
Habitat in Anglia & Germania.

barbata. 65. P. nigra, palpis porrectis pedibusque flaveſcentibus. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 213. *n.* 5.
Habitat Halæ Saxonum, *ſtatura ſerratæ, at duplo minor.*

canaliculata. 66. P. niger, thorace canaliculato utrinque impreſſo, elytris ſtriatis, palpis porrectis. *Fabr. mant. inſ.*1. *p.* 213. *n.* 6.
Schall. Abh. der hall. Geſ. naturf. Fr. 1. *p.* 326. Tenebrio dubius.
Habitat Halæ Saxonum, *ſtatura ſerratæ, alata.*

lævis. 67. P. nigra thorace canaliculato, poſterius attenuato, elytris lævibus. *Fabr. mant. inſ.*1.*p.*213. *n.* 7.
Habitat Halæ Saxonum, *ſtatura canaliculatæ.*

equeſtris. 68. P. atra, elytris faſcia abbreviata aurea. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 325. *n.* 4. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 8.
Habitat in Braſilia.

maura. 69. P. atra, thorace utrinque rotundato lævi, elytris excavato-punctatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 325. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 9.
Habitat in India, *magna.*

mo-

morio. 70. P. atra, thorace quadrato lævi, elytris punctato-ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 325. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 10.
Habitat in America *boreali.*

nigrita. 71. P. atra, thoracis marginibus rotundatis, elytris crenato-ſulcatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 325. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 11.
Fabr. ſyſt. ent. p. 256. *n.* 4. Tenebrio atratus.
Habitat in America *meridionali.*

rufipes. 72. P. nigra, elytris antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 325. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 12.
Habitat in nova Hollandia.

granulata. 73. P. depreſſa, elytris granulato-ſubſpinoſis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 13.
Habitat ad Caput bonæ ſpei, *tribulibus minor & latior.*

longipes. 74. P. nigra, elytris ſtriatis, pedibus elongatis: pedibus ſecundi paris barbatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 14.
Habitat in Africa *æquinoctiali, tibiis raro omnibus lævibus.*

atra. 75. P. atra, elytris ſtriatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 11. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 15.
Degeer inſ. 5. *n.* 4. Pyrochroa (nigra) nitida, corpore ovato, thorace convexo, antennis pedibusque fuſcis.
Habitat Lipſiæ.

anglica. 76. P. nigra, thorace anterius rotundato, elytris punctato-ſtriatis, antennis apice rufis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 16.
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 318. *n.* 17. Pimelia Morio.
Habitat rarior in Anglia.

indica. 77. P. atra, elytris ſulcato-punctatis, femoribus anterioribus acute dentatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 12. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 17.
Habitat in Coromandel, *ſtatura airæ, ſed paulo minor.*

quiſquilia. 78. P. nigra, antennis pedibusque ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 13. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 18.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 676. *n.* 13. *Fn. ſuec.* 821.* Tenebrio niger, ore pedibusque ferrugineis.
Habitat in Europæ *quiſquiliis, ſubtus tota ferruginea.*

ruficollis. 79. P. ferruginea, elytris ſtriatis nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 19.
Habitat Halæ Saxonum, *ſtatura quiſquiliæ.*

lævis. 80. P. corpore atro lævi. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 326. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 20.
Habitat in Europæ *quiſquiliis.*

cyanea. 81. P. cærulea, thorace punctato, elytris ſtriatis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 214. *n.* 21.
Habitat Hafniæ, *tota cærulea immaculata.*

violacea. 82. P. cylindracea ſplendidiſſima cæruleo violaceoque varians, abdomine poſterius rubro, elytris punctato-ſtriatis.
Pall. ic. inſ. ruſſ. 1. *p.* 40. *t.* C. *f.* 4. Mylaris violacea.
Habitat in Braſilia, *tenebrione molitore longior & gracilior.**)

leucographa. 83. P. ovata, thorace ſcaberrimo difformi, elytris ca-

*) *De hac et duabus ſequentibus dubium adhuc, an ad hanc tribum ſpectent.*

carinatis scabris: fasciis longitudinalibus albatis lævibus.

Pall. it. II. *app. p.* 719. *n.* 43. Tenebrio leucogrammus.

Pall. ic. inf. Ruff. 1. *p.* 54. *t.* C. *f.* 20. Tenebrio leucographus.

Habitat frequens ad fluvium Irtin, *rarior ad fluvios* Ural, Volga, Selenga Russiæ *orientalis.*

bupa-ria. 84. P. alata atra glabra, thorace lunato, maxillis validis dentatis longitudine capitis.

Forster nov. inf. sp. 1. *p.* 61. *n.* 61. Tenebrio buparius.

Habitat in Hispania *ad fretum* Gaditanum, *magnitudine & statura lucani interrupti, habitu tenebrionis fossoris.*

MANTICORA. *Antennæ* filiformes: articulis cylindricis.

Palpi quatuor filiformes.

Thorax anterius rotundatus, posterius apice emarginatus.

Caput porrectum. *Mandibula* exserta, porrecta.

Elytra connata. *Alæ* nullæ.

maxillosa. 1. M. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 320. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 210. *n.* 1. *Thunb. nov. inf. sp.* 1. *p.* 25. *t.* 1. *f.* 38. Cicindela (gigantea) nigra, elytris costa longitudinali serrata acuta, thorace bilobo.

Degeer inf. 7. *p.* 623. *n.* 10. *t.* 46. *f.* 14. Carabus (tuberculatus) apterus niger, elytris scabris: tuberculis conicis hirsutis, tibiis obscure ferrugineis.

Habitat ad Caput bonæ spei, *vulgaris carabi majoris magnitudine, celerrime currens & mordens.*

ERO-

ERODIUS. *Antennæ* moniliformes.
Palpi quatuor filiformes.
Maxilla cornea, bifida, truncata.
Labium corneum, emarginatum.

testudinarius. 1. Er. gibbus ater, elytris connatis scabris: lateribus pulverulento-albis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 326. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 215. *n.* 1.
Habitat ad Caput bonæ spei, *magnus, subtus planus.*

gibbus. 2. Er. gibbus ater, elytris lineis elevatis tribus. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 326. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 215. *n.* 2. *Forsk. Fn. arab. p.* 80. *n.* 11 ? Tenebrio (cothurnatus) apterus niger, thorace lævi utrinque antice unidentato, elytris tuberculatis, striis duabus elatis.
Habitat in Africæ *arena mobili, in* Ægypto *frequens.*

planus. 3. Er. ater, elytris linea elevata unica. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 327. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 215. *n.* 3.
Habitat in Ægypto.

minutus. 4. Er. ater, elytris lævissimis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 327. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 215. *n.* 4.
Habitat in Oriente.

LYTTA. *Antennæ* filiformes.
Palpi quatuor inæquales: posteriores clavati.
Thorax subrotundus: *Caput* inflexum, gibbum.
Elytra mollia, flexilia.

vesicatoria. 1. L. viridis, antennis nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.*

Lyttæ *Meloeque, larvæ & imagines, foliis vescuntur.*

p. 328. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 215. *n.* 1.
Syſt. nat. XII. 2. *p.*679. *n.*3. *Fn. ſuec.*827. *Scop. ent. carn.*185. Meloe (veſicatorius) alatus viridiſſimus nitens, antennis nigris.
It. ſcan. 186. Cantharis officinarum.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 341. *n.* 1. *t.* 6. *f.* 5. Cantharis viridi-aurata, antennis nigris.
Degeer inſ. 4. *p.* 12. *n.* 2. *t.* 1. *f.* 9. Cantharis veſicatoria.
Raj. inſ. 1. 341. Cantharis vulgaris officinarum.
Mouff. inſ. 144.
Jonſt. inſ. p. 76. *t.* 7.
Aldrov. inſ. 276.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 55.
Schaeff. elem. t. 33.
icon. t. 47. *f.* 1.
Habitat in Liguſtro, Fraxino, Sambuco, Syringa, Perſiæ populo tremula, Tatariæ lonicera taralica, Calabriæ *quoque aſperula, officinalis pro veſicatoriis.*

nitidula. 2. L. viridi-ænea, elytris teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 328. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 2.
Habitat in Anglia.

collaris. 3. L. atra, vertice thorace pedibusque ferrugineis, elytris cyaneis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.*3.
Habitat in Ruſſia *meridionali, magna; mas duplo minor.*

ſyriaca. 4. L. viridi cærulea, thorace ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 329. *n.*3. *mant. inſ.* 1. *p.*216. *n.*4. *Syſt. nat.* XII. 2. *p.* 680. *n.* 4. *Muſ. Lud. Ulr.* 102. *Gron. zooph.* 620. Meloe alatus viridi-cæruleus, thorace luteo.
Herbſt apud Fuesslı arch. inſ. 6. *t.* 30. *f.* 1.
Habitat in Sibiria, India, Oriente, *& frequens in auſtrali* Europa.

fe-

festiva. 5. L. viridi-ænea nitida, elytris testaceis maculis viridi-æneis. *Fabr. sp. inf.* 1 *p.*329. *n.*4. *mant. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 5.
Pall. it. II. *app. p.* 721. *n.* 54. Meloe festiva.
Habitat in Sibiria.

margi- nata. 6. L. atra, elytrorum marginibus cinerascentibus. *Fabr. sp. inf.*1. *p.*329. *n.*5. *mant. inf.*1. *p.*216. *n.* 6.
Forst. nov. inf. sp. 1. *p.* 62. *n.* 62. Meloe (cinereus) alatus cinereus, antennis elytrisque atris margine cinereis.
Habitat ad Caput bonæ spei.

atrata. 7. L. corpore atro immaculato. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 321. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 8.
Habitat in Barbaria.

ery- throce- phala. 8. L. atra, capite testaceo, thorace elytrisque cinereo lineatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 329. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 9.
Pall. it. I. *app. n.* 46.
Scop. ann. hist. nat. 5. *p.* 103. *n.* 81.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 6. *t.* 30. *f.* 2.
Habitat in Europa *australi*, & Russia, *atratæ affinis.*

vittata. 9. L. elytris nigris: vitta marginibusque flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.*329. *n.*6. *mant.inf.*1. *p.*216. *n.* 7.
Habitat in America.

dubia. 10. L. atra capitis vertice fulvo, thorace elytrisque immaculatis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 329. *n.*9. *mant. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 10.
Sulz. hist. inf. t. 7. *f.* 12. Meloe algiricus.
Habitat in Sibiria, *erythrocephalæ proxime affinis.*

afra. 11. L. nigra, thorace rufo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 330. *n.* 10. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 11.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 680. *n.* 10. Meloe alatus niger, thorace rufo.
Habitat in Africa, *atratæ affinis.*

indica. 12. L. nigra, thorace convexo, elytris læviſſimis fuſceſcenti-luteis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 6. *p.* 145. *n.* 4. *t.* 30. *f.* 3.
Habitat in America, *veſicatoriæ affinis.*

ruficollis. 13. L. cærulea, thorace orbiculato rubro, elytris punctatis pubeſcentibus. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 8. *p.* 179. *n.* 6. *t.* 48. *f.* 4.
Habitat in India, *ſyriacæ affinis, ſed multo latior.*

quadrimaculata. 14. L. nigra glabra, pectore pubeſcente, elytris ex griſeo luteis: maculis duabus ſubquadratis nigris. *Pall. it.* II. *app. n.* 48.
Habitat in Sibiria, *ſtatura & magnitudine feneſtratæ, & inſtar ejus oleum ſuaveolens ex pedibus exſudans.*

feneſtrata. 15. L. glabra pallide teſtacea, thorace depreſſo, elytris griſeis apice nigris: maculis duabus quadratis hyalinis. *Pall. it.* II. *app. n.* 47.
Habitat ad Volgam *inter flores, ſtatura veſicatoriæ mediæ magnitudinis.*

clematidis. 16. L. ex chalybeo atra nitida, elytris dilute teſtaceis immaculatis. *Pall. it.* II. *app. n.* 51.
Habitat in regionibus a fluvio Irtis *verſus orientem ſitis in clematide, veſicatoriæ affinis.*

uralenſis. 17. L. nigra opaca glaberrima. *Pall. it.* II. *app. n.* 56.
Habitat ad montes Uralenſes, *muſcæ domeſticæ magnitudine, proſcarabæo affinis, elytris tamen ſulcatis, thoracis lateribus, & capite latiore.*

sibirica. 18. L. atra opaca glaberrima, elytris margine albis, capite rubro, oculis, ore antennisque nigris. *Pall. it.* II. *app. n.* 50.
Habitat gregaria in Sibiriæ *lotis & aſtragalis; maris antennarum articulis mediis compreſſis & dente munitis.*

lutea. 19. L. atra lanuginoſa, elytris ventricoſis ſubcompreſſis luteis: punctis ſex nigris. *Pall. it. app. n.* 54.
Habitat ad fluvium Irtis, *major ad fluvium* Ural, *ſyriacæ fere magnitudine.*

ocellata. 20. L. nigra lanuginoſa, pedibus teſtaceis, capite thorace elytrisque flaveſcentibus, elytris ocellis ſex medio nigris. *Pall. it. app. n.* 53.
Habitat prope mare caſpium, *ſtatura meloes trifaſciatæ, & duplo major, inſtar luteæ oleum ex pedibus exſudans.*

pectinati. 21. L. antennis pectinatis, corpore atro, fronte rubra. *Lepechin it.* II. *p.* 200. *t.* 11. *f.* 26.
Habitat in Sibiria.

cinnabarina. 22. L. nigra, thorace ſupra, elytris & capite utrinque rubris. *Scop. ent. carn. n.* 186.
Habitat in Carniola.

ruſa. 26. L. nigra, capite rufo. *Scop. ann. hiſt. nat. p.* 103. *n.* 82.
Habitat in Carniolæ *calidioris collibus.*

ſubvilloſa. 27. L. flaveſcens ſubvilloſa, elytris attenuatis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 343. *n.* 5.
Habitat in Gallia.

bicolor. 28. L. teſtacea, elytris apice nigris. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 344. *n.* 7.
Habitat in Gallia.

formicaria. 29. L. fusca, elytris anterius thoraceque elongato rubris. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 344. *n.* 8.
Habitat in Gallia. *)

pensilvanica. 30. L. tota nigra opaca. *Degeer inf.* 5. *p.*16. *n.*1. *t.* 13. *f.* 1.
Habitat in Pensilvania, $4\frac{1}{2}$ *lineas longa.*

pubescens. 31. L. nigra, capite thoraceque pubescentibus, elytris flavis: macula posterius utrinque ferruginea. *Mus. Lesk. p.* 43. *n.* 949.
Habitat - - -

ferruginea. 32. L. ferruginea, capite thoraceque rufis, elytris fuscis basi testaceis. *Mus. Lesk. p.* 43. *n.*949. *b.*
Habitat in Europa.

215. MELOE. *Antennæ* moniliformes.
Thorax subrotundus.
Elytra mollia, flexilia.
Caput inflexum, gibbum.

* *alis nullis, elytris abbreviatis.*

Proscarabæus. 1. M. corpore violaceo. *Fn. suec.* 826. *Scop. ent. carn.* 184. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 327. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 215. *n.* 1.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 377. *n.* 1. Meloe.
Degeer inf. 5. *p.* 31. *t.* 1. *f.* 1. Cantharis proscarabæus.
Lister scarab. angl. p. 392. *n.* 27. Scarabæus molis, e nigra viola nitens.
*Mouff. inf.*162. *f. med.* Proscarabæus.
Jonst. inf. p. 74. *t.* 1. Proscarabæi femina.
Clut. hemerob. p. 81. *n.* 73. Vermis maialis.

Goed.

*) *Species* 17, 19-29 *utrum huic generi adscribendæ, an sequenti, dubium.*

Goed. inſ. 2. *t.* 42.
Friſch. inſ. 6. *t.* 6, *f.* 5.
Hufn. inſ. 2. *t.* 9.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 10. & 54.
Schaeff. elem. t. 82.
icon. t. 3. *f.* 5.
Bergſtr. nomencl. 1. *p.* 17. *n.* 15. *t.* 2. *f.* 15.
Habitat, *vere potiſſimum in* Europæ *campis apricis arenoſis*, *ranunculos*, *veratrum* e. c. *comedens*, *ova ſuaveolentia pariens*, *tacta oleum limpidiſſimum flavicans e geniculis præſertim pedum exſudans valde diareticum*, *cum melle vel oleo mixta in rabie canina commendata.*

maialis. 2. M. ſegmentis dorſalibus abdominis rubris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 327. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.*215, *n.* 2.
Friſch. inſ. 6. *t.* 6. *f.* 4. Proſcarabæus alter.
Pontopp. atl. dan. 1. *t.* 29.
Schaeff. ic. t. 3. *f.* 6.
Habitat in Europa *auſtrali*, *proſcarabæo valde affinis.*

marginata. 3. M. nigra, thoracis elytrorumque margine ferrugineo. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.*328. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 215. *n.* 3.
Schranck Beytr. z. Naturg. p. 71. *n.* 19. Meloe (hungarus) apterus ater lævis, thoracis baſi elytrorumque margine interiori ferrugineis.
Habitat in Italia & Hungaria, *proſcarabæo dupla minor.*

** *alatæ*, *elytris alas tegentibus.*
† *maxilla bifida*, Mylabrides Fabricii.

faſciata. 4. M. nigra, elytris faſcia media flava. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 330. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 1.
Habitat in India.

ci-

cichorei. 5. M. nigra, elytris flavis: fasciis tribus nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 330. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 2.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 680. *n.* 5. *Mus. Lud. Ulr.* 103. * Meloe alatus niger, thorace hirsuto, elytris fasciis tribus flavis, antennis clavatis.
Degeer inf. 5. *p.* 17. *n.* 2. *t.* 13. *f.* 2. Cantharis cichorei.
Hasselq. it. p. 410. *n.* 101. Chrysomela cichorei.
Imper. hist. nat. 78. Cantharis fasciata.
Sulz. hist. inf. t. 7. *f.* 11.
Habitat in totius Orientis, *etiam* Sibiriæ & Calabriæ *cichoreis, prosscarabæi magnitudine, in* Sina *officinalis, antennis interdum apice flavis.*

decempunctatus. 6. M. atra, elytris testaceis: punctis quinque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 331. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 5.
Syst. nat. XII. 2. *p.* 680. *n.* 6. Meloe (quadripunctata) alatus niger, elytris flavis: maculis quinque nigris, antennis clavatis.
Habitat in Italia, *m. cichorei similis, at triplo minor, antennarum articulo ultimo clavato.*

capensis. 7. M. nigra, elytris maculis sex flavis, prima arcuata, antennis flavis. *Mus. Lud. Ulr.* 104. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 330. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 216. *n.* 4.
Degeer inf. 7. *t.* 48. *f.* 14.
Habitat ad Caput bonæ spei, *m. cichorei duplo minor.*

chrysomeloides. 8. M. viridi-cæruleſcens, subtus nigro-violacea. *Amœn. ac.* 6. *p.* 396. *n.* 25.
Habitat Surinami, *an hujus generis?*

quadripunctata. 9. M. atra, elytris testaceis, punctis duobus nigris. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 217. *n.* 6. *Ha-*

Habitat in Ruſſia, *decempunctatæ affinis.*

trimaculata. 10. M. nigra, coleoptris flavis, faſcia punctoque communi fuſcis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 331. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 7.
Habitat in Oriente.

algirica. 11. M. nigra, elytris teſtaceis immaculatis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 330. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 216. *n.* 3.
Fabr. ſyſt. ent. app. 828. Mylabris immaculata.
Degeer inſ. 7. *n.* 53. *t.* 40. *f.* 17. Cantharis fulva.
Habitat in India.

teſtacea. 14. M. teſtacea, pectore elytrorumque apicibus nigris. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 331. *n.* 7. *mant. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 8.
Habitat in Sibiria, *congeneribus paulo minor.*

americana. 15. M. nigra, thorace ſemicirculari, elytris faſciis tribus flavis: prima arcuata, reliquis confluentibus. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 6. *p.* 145. *n.* 2. *t.* 30. *f.* 5. a.
Habitat in America, *antennarum apice clavato, ochraceo.*

indica. 16. M. nigra, elytris flaveſcentibus poſterius fulvis: punctato, baſeos litura triloba, faſcia media dentata apicisque margine ſemilunari nigris. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 6. *p.* 147. *n.* 5. *t.* 30. *f.* 6.
Habitat in India, *congeneribus latior.*

elongata. 17. M. nigra nitida, elytris flavis, cæruleo-variis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 6. *p.* 147. *n.* 6. *t.* 30. *f.* 7. b.
Habitat - - - ſatis anguſta.

un-

undulata. 18. M. nigra, elytrorum vittis duabus angustis undulatis dentatis spadiceo-marginatis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. *p.* 179. *n.* 8. *t.* 48. *f.* 3.
Habitat in India.

aurea. 19. M. viridi-aurea, elytris fulvis. *Degeer inf.* 7. *n.* 54. *t.* 48. *f.* 18.
Habitat - - - 4 lineas longa; an vere distincta species?

arcuata. 20. M. nigra hirsuta, elytris anterius macula arcuata fasciisque binis undatis flavis.
Pall. ic. inf. Ruff. 2. *t.* E. *f.* 3. b. ? Meloe phalerata.
Degeer inf. 7. *n.* 52. *t.* 48. *f.* 15. Cantharis undato-bifasciata.
Habitat - - - tres lineas longa, antennis nigris apice clavatis.

bifasciata. 21. M. nigra, hirsuta, elytris anterius macula rotunda, & ad angulum exteriorem altera fasciisque binis transversis flavis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 8. *p.* 179. *n.* 7. *t.* 48. *f.* 2.
Degeer inf. 7. *n.* 50. *t.* 48. *f.* 13. Cantharis bifasciata.
β) *Pall. ic. inf. Ruff.* 2. *t.* E. *f.* 3. a. Meloe plagiata.
Habitat in India, *magna, antennis flavis, elytrorum basi picea, a* $9\frac{1}{2}$ *lineis ad* 3 *lineas ultra pollicem longa; in* β) *ad elytrorum angulum exteriorem macula nulla.*

trifasciata. 22. M. ex virescente chalybea sericea cana, elytris griseo-pallidis: fascia communi alteraque ex virescente atra. *Pall. it.* II. *app. n.* 52.
Habitat in vicinia maris caspii, *magnitudine meloes Schaefferi, statura m. cichorei, antennis apice clavatis.*

atra-

atrata. 23. M. aterrima nitens, elytris fascia flava versus apicem undulata. *Pall. it.* II. *app. n.* 55.
Habitat in confiniis maris caspii, *frequens in gypsophilis & veronicis florescentibus, antennis apice clavatis, oleum ex pedibus exsudans.*

necydalea. 24. M. nigra, elytris ruberrimis, abdomine pauliſper brevioribus, apice distantibus. *Pall. it.* II. *app. n.* 49.
Habitat in Russici *imperii provinciis orientalibus, oleum pariter suaveolens exsudans.*

chloroptera. 25. M. nigra subvillosa, elytris flavis. *Geoffr. inſ. par.* I. *p.* 344. *n.* 6.
Habitat in Gallia, *extremo antennarum articulo reliquis triplo majore.*

pensylvanica. 26. M. nigra opaca tota.
Degeer inſ. 5. *p.* 16. *n.* 1. *t.* 13. *f.* 1. Cantharis pensylvanica.
Habitat in Pensylvania. *)

Marci. 13. M. nigra, pedibus ferrugineis, palpis clavatis crispis.
Habitat Calmariæ Suecorum, *an hujus generis?*

melanura. 30. M. elytris flavis: maculis quatuor apiceque nigris, antennis clavatis. *Petagn. inſ. Calabr. p.* 127. *n.* 136. *f.* 13.
Habitat Brancalemi *in* Calabria, *in frumenti spicis, m. cicborei simillima, sed major.*

ochroptera. 31. M. nigra, elytris croceis basi nigris: utrinque gutta crocea ante & pone medium, fascia inter-

rup-

*) *Huic tribui inſecta videntur species ab Il.* Pallas *descripta, & in ic. inſ. Rossi. delineata*, luxata T. E. *f.* 5. a. b. variabilis *t.* E. *f.* 7. & 14. & tolerica *t.* E. *f.* 12. *de speciebus* 13. 22-26 *magis dubium.*

rupta apiceque nigris. *Muſ. Lesk. p.* 43. *n.* 952.
Habitat extra Europam.

bicolor. 32. M. nigra, elytris flavis: baſi utrinque punctulo, in medio faſcia ad margines externos latiore apiceque nigris. *Muſ. Lesk. p.* 43. *n.* 953.
Habitat extra Europam.

⊢ ⊢ *maxilla integra*, Cerocomata Fabricii.

Schaefferi. 12. M. viridis, antennis pedibusque luteis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 331. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 1.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 358. *n.* 1. Cerocoma.
Syſt. nat. XII. 2. *p.* 681. *n.* 12. Meloe alatus viridis, pedibus luteis, antennis mari abbreviatis clavatis brevibus irregularibus.
Sulz. hiſt. inſ. t. 7. *f.* 13.
Schaeff. el. t. 37.
ic. t. 53. *f.* 8. 9.
Habitat in Europa *magis auſtrali* & Sibiria, *ſtatura verſicatoriæ, ſed dimidio minor.*

Vahlii. 27. M. viridis, antennis pedibusque nigris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 2.
Habitat in Barbariæ *umbellatis, ſtatura & magnitudine m. Schaefferi.*

Schreberi. 28. M. viridis, antennis pedibus abdominisque ſegmentis tribus flavis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 331. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 217. *n.* 3.
Habitat in Europa *magis auſtrali, m. Schaefferi nimis affinis, ad duplo major, antennis flavis.*

Gouani. 29. M. atra, elytris apice faſciaque ſanguineis. *Syſt. nat.* XII. 2. *add. p.* 1068. *n.* 11.
Habitat in Gallia, *pediculi magnitudine; an hujus ordinis?*

216.

216. MORDELLA. *Antennæ* moniliformes, aut pectinatæ.
Palpi quatuor, anteriores clavati, posteriores filiformes.
Caput deflexum sub collo, in territa.
Elytra deorsum curva apicem versus.
Ante femora lamina lata ad basin abdominis.

* *antennis pectinatis.*

ferruginea. 7. M. rufa, pectore ano pedibusque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 332. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 217. *n.* 1.
Habitat in India.

nasuta. 8. M. corpore atro immaculato. *Thunb. nov. inf. sp.* 3. *p.* 66. *f.* 77. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 217. *n.* 2.
Habitat in Japonia, *glabra, aculeata quadruplo major.*

pectinata. 9. M. rufa, elytris nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 332. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 217. *n.* 3.
Habitat in America.

paradoxa. 1. M. thoracis lateribus elytrisque testaceis. *Fn. suec.* 831. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 332. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 4.
Habitat rarior in Europæ *plantis umbellatis.*

flabellata. 10. M. testacea, ore pectore abdominisque dorso atris. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 501. *mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 5.
Habitat in Italia, *ferrugineæ affinis, at duplo fere minor.*

pun-

punctata. 11. M. thorace testaceo nigro punctato, elytris nigris: margine testaceo. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 6.
Habitat in Cayenna, *statura pectinatæ, atra, capite testaceo.*

*** antennis moniliformibus.*

sexmaculata. 12. M. atra, thorace ferrugineo, elytris testaceis: macula nigra. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 332. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 7.
Habitat in America.

bimaculata. 13. M. ferruginea, pectore atro, elytris testaceis: macula nigra. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 8.
Habitat in Hungaria, *magna.*

dimidiata. 14. M. atra, elytris basi flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 332. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 9.
Habitat - - - statura sexmaculatæ, abdomine obtuso fere truncato.

limbata. 15. M. ferruginea, verticis thoracis disco elytrisque atris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 332. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 10.
Habitat - - - statura sexmaculatæ, antennis serratis, pedibus nigris.

aculeata. 2. M. atra, ano spina terminato. *Fn. suec.* 832. *Scop. ent. carn.* 192.
Fn. suec. 534. Mordella oblonga atra, cauda aculeo terminata.
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 333. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 218. *n.* 11. Mordella ano aculeato, corpore atro immaculato.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 353. *n.* 1. Mordella atra caudata unicolor.

Sulz.

Sulz. hist. inf. t. 7. f. 46.
Schaeff. elem. t. 84.
ic. t. 127. f. 7.
e) Lepch. it. II. t. 10. f. 15.
Habitat frequens in Europæ *borealis floribus semifloſculoſis, umbellatis, in* Calabriæ *thapſia.*

fasciata. 16. M. nigra, ano aculeato, elytris fasciis duabus cinereis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 333. n. 8. mant. inf. 1. p. 218. n. 12.*
Geoffr. inf. par. 1. p. 354. n. 2. Mordella atra caudata, fasciis villoso-aureis.
Habitat in Germaniæ & Europæ *magis australis floribus, an varietas aculeatæ?*

octopunctata. 17. M. ano aculeato, elytris nigris: punctis quatuor flavis; primo lunato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 333. n. 9. mant. inf. 1. p. 218. n. 13.*
Habitat in America *septentrionali &* Bavaria.

testacea. 18. M. atra, elytris testaceis: marginibus nigris. *Fabr. mant. inf. 1. p. 218. n. 14.*
Habitat in Africæ *dauco, statura & magnitudine aculeatæ, ano aculeato.*

abdominalis. 19. M. nigra, thorace abdomineque fulvis, ano aculeato. *Fabr. sp. inf. 1. p. 333. n. 10. mant. inf. 1. p. 219. n. 15.*
Sulz. hist. inf. t. 7. f. 15. Mordella bicolor.
Habitat in Germania.

humeralis. 3. M. atra, ore lateribus thorace pedibusque flavis. *Fabr. sp. inf. 1. p. 333. n. 11. mant. inf. 1. p. 219. n. 16.*
*Syst. nat. XII. 2. p. 682. n. 3? Fn. suec. 833.** Mordella atra, lateribus thoracis baseosque elytrorum flavescentibus.
Habitat in Europæ *floribus.*

fron-

frontalis. 4. M. atra, fronte pedibusque flavescentibus. *Fn. suec.* 834. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 333. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 219. *n.* 17.
Habitat in Europæ *borealis floribus.*

thoracica. 5. M. atra, capite thoraceque flavis. *Fn. suec.* 835. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 333. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 219. *n.* 18.
Habitat in Europæ *floribus.*

flava. 6. M. flava, elytrorum apicibus nigris. *Fn. suec.* 836. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 334. *n.* 14. *mant. inf.* 1. *p.* 219. *n.* 19.
Habitat frequens in Europæ *floribus umbellatis.*

tricuspidata. 20. M. flava, lamina abdominali cyanea, elytrorum punctis tribus nigris thorace posterius tricuspidato. *Lepech. it.* I. *t.* 19. *f.* 8.
Habitat in deserto Uralensi.

murina. 21. M. pubescens undulata, cinerea thoracis maculis tribus nigris. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 148. *n.* 3.
Habitat Berolini, *statura & magnitudine fasciatæ.*

sexpunctata. 22. M. atra nitida, elytrorum punctis tribus albis. *Herbst apud Fuessli arch. inf.* 6. *p.* 148. *n.* 4.
Habitat in Marchia, *murina fere major.*

oxyacanthæ. 23. M. testacea, capite nigro, thorace fusco. *Forst. nov. inf. sp.* 1. *p.* 63. *n.* 63.
Habitat in Angliæ *floribus cratægi oxyacanthæ, aculeatæ fere magnitudine.*

melanopus. 24. M. nigra, elytris, thorace capite pedibusque testaceis. *Forst. sp. inf. nov.* 1. *p.* 64. *n.* 64.
Habitat cum m. oxyacanthæ, magnitudine pediculi majoris.

bi-

bicolor. 25. M. atra, elytris teſtaceis apice nigris faſciaque nigra in medio. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 65. *n.* 65.
Habitat in Anglia, *frequens in floribus cratægi, rumicis, umbellatarum, pediculi magnitudine.*

perlata. 26. M. nigra nitida ſubpiloſa, thoracis margine poſteriore, elytrorumque maculis quatuor perlatis. *Sulz. hiſt. inſ. p.* 67. *t.* 7. *f.* 14.
Habitat in Rhætia.

rufipes. 27. M. fuſca, pedibus ferrugineis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 355. *n.* 5.
Habitat in Gallia.

**** antennis clavatis.*

clavicornis. 28. M. tota picea. *Forſt. nov. inſ. ſp.* 1. *p.* 66. *n.* 66. *Habitat in* Anglia, *curſitans in rhei rhabarbari floribus, thoracicæ magnitudine, vel paulo major; utrum hujus, an perinde ac* 1. 7-11. *proprii generis?*

217. STAPHYLINUS. *Antennæ* moniliformes.
Palpi quatuor.
Elytra dimidiata. *Alæ* tectæ.
Cauda ſimplex, exſerens duas veſiculas oblongas.

** palpis omnibus filiformibus.*

aureus. 27. St. capite thorace elytrisque villoſo-aureis, ab-

Staphylini *voraciſſimi, rapina inſectorum victitant, mordaces, humentibus ut plurimum delectantur, veſiculas caudales periculo imminente exſerunt; larvæ ſubterraneæ: Spec.* 7-9. 21. 30. 96-100. *thorace ſcutiformi, abdomine utrinque pilis biſpido apice ſetoſo gaudent.*

abdomine nigro: fasciis cinereis. *Faun. mant. inf.* 1. *p.* 219. *n.* 1.
Habitat in Siam, *hirti magnitudine.*

hirtus. 1. St. hirsutus niger, thorace abdomineque posterius nigris. *Fn. suec.* 839. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 334. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 219. *n.* 2.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 363. *n.* 7. Staphylinus niger villosus, &c.
Degeer inf. 4. *p.* 20. *n.* 5. Staphylinus bombylius.
Sulz. hist. inf. t. 7. *f.* 16.
Schaeff. monogr. 1754. *t.* 2. *f.* 12.
ic. t. 36. *f.* 6.
Habitat in Europæ *arenosis.*

murinus. 2. St. pubescens cinereus nigro-nebulosus. *Fn. suec.* 840. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 334. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 219. *n.* 3.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 362. *n.* 1. Staphylinus villosus e fusco cinereoque viridi tessellatus.
Degeer inf. 4. *p.* 12. *n.* 1. *t.* 1. *f.* 1. Staphylinus villosus.
Schaeff. ic. t. 4. *f.* 11.
Stroem. act. Nidr. 6.
Habitat in cadaveribus, fimo, *elytris subtus caeruleis.*
Larva *hexapus, nuda, pallida, capite segmentisque tribus anterioribus fuscis; cauda setis duabus articulatis subtusque tuberculo pediformi cylindrico tubuloso.*

olens. 28. St. niger opacus immaculatus, capite thorace latiore. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 219. *n.* 4.
Mull. zool. dan. prodr. p. 97. *n.* 1090. *Fn. Fridrichsd. p.* 23. *n.* 28. Staphylinus totus niger, capite thoraceque scabriusculo.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 6. *p.* 149. *n.* 4. Staphylinus unicolor.

Geoffr.

Geoffr. inf. par. 1. *p.* 360. *n.* 1. *t.* 7. *f.* 1. Staphylinus ater extremo antennarum articulo lunulato.

Raj. inf. p. 109. *n.* 1. Staphylinus major totus niger.

Habita in Europæ *cadaveribus.*

maxillosus. 3. St. pubescens niger, fasciis cinereis, maxillis longitudine capitis. *Fn. suec.* 841. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 334. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 220. *n.* 5. *Degeer inf.* 4. *p.* 18. *n.* 4. *t.* 1. *f.* 7. 8. Staphylinus balteatus.

List. loq. 391. Scarabæus majusculus niger, forcipibus infestis.

Mouff. inf. 197.

Gron. zooph. 630.

Jonst. inf. t. 18. *f.* 1-3.

Becc. mus. 2. *t.* 31. *f.* A. A.

Habitat in Europæ *silvis, victitans rapina.*

oculatus. 29. St. ater nitidus, capite utrinque macula fulva. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 335. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 220. *n.* 6.

Habitat in novis Hollandia & Seelandia.

dilatatus. 30. St. thorace marginato, atro nitidulo, elytris fuscis, antennis serratis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 220. *n.* 7.

Habitat Halæ Saxonum, *erythroptero major.*

bicolor. 96. St. ater, antennis, elytris pedibusque ferrugineis. *Mus. Lesk. p.* 45. *n.* 997.

β) Staphylinus ater, antennis, elytris pedibusque rufo-testaceis. *Mus. Lesk. p.* 45. *n.* 999.

Habitat in Europa.

fuscus. 97. St. fuscus, elytris pedibusque testaceis. *Mus. Lesk. p.* 45. *n.* 1000.

Habitat in Europa.

clavatus. 98. St. ater glaber, elytris teſtaceis: marginibus externis fuſcis, antennis clavatis, pedibus fuſco-teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 1001.
Habitat in Europa.

flavus. 99. St. niger, thorace marginibus externis late, anteriore poſteriorique ſummo elytrisque flavis: vitta media margineque externo fuſcis, antennis pedibusque flavis. *Muſ. Lesk. p.* 45. *n.* 1004.
Habitat in Europa.

melanophthalmus. 100. St. thorace capiteque rufis, oculis, nucha abdomineque nigris, elytris pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 45. *n.* 1005.
Habitat in Europa.

erythropterus. 4. St. ater, elytris, antennarum baſi pedibusque rufis. *Fn. ſuec.* 842.* *Scop. ent. carn.* 306. *Stroem. act. nidr.* 3. *p.* 404. *t.* 6. *f.* 8. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 335. *n.* 5. *mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 8. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 364. *n.* 9. Staphylinus ater non nitens.
Frijch inſ. 5. *p.* 49. *t.* 25. Scarabæus rapax, elytris brevibus.
Degeer inſ. 4. *p.* 21. *n.* 6.
Schaeff. elem. t. 117.
icon. t. 2. *f.* 2.
ε) Staphylinus ater, capitis vertice, thorace, elytris tibiisque ferrugineis, antennis fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 968 ?
Habitat ſæpius in Europæ *fimo.*

erythrocephalus. 31. St. ater, capite rufo, elytris violaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 335. *n.* 6. *mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 9.
Habitat in nova Hollandia.

piloſus. 32. St. piloſus niger, abdomine fuſco, elytris ſcabris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 220. *n.* 10.
Ha-

Habitat in Cayenna, *parvus, brevis, crassus.*

politus. 5. St. niger, thorace elytrisque nitidis. *Fn. suec.* 843. * *Scop. ent. carn.* 304. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 335. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 220. *n.* 11.
Fn. suec. 605. Staphylinus niger, thorace æneo nitido, elytris atro-cæruleis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 361. *n.* 3. Staphylinus ater, &c.
Degeer inf. 4. *p.* 22. *n.* 7. Staphylinus niger nitidus, &c.
Schaeff. ic. t. 89. *f.* 12.
Habitat in Europæ *cadaveribus, recens odorem ambrosiacum spargens.*

brunnipes. 33. St. niger, pedibus antennarum basi apiceque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 336. *n.* 8. *mant. inf.* 1. *p.* 220. *n.* 12.
Habitat in Anglia, *statura & magnitudine politi.*

nitidus. 34. St. ater nitidus, elytris testaceis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 220. *n.* 13.
Habitat Kilonii, *statura & magnitudine politi, an ejus varietas?*

fulgidus. 35. St. ater nitidus, elytris plantisque testaceis, capite punctulato. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 220. *n.* 14.
Habitat Kilonii, *statura politi, at tenuior.*

marginatus. 36. St. ater, thoracis lateribus pedibusque flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 336. *n.* 9. *mant. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 15. *Act. Nidros.* 4. *p.* 332. *n.* 33.

obtusus. 9. St. testaceus, elytris anterius anoque nigris. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 336. *n.* 11. *mant. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 17.
Habitat in Germania, Anglia, *pediculi magnitudine, pectore inter femora posteriora fusco.*

lignorum. 10. St. fuscus, elytris, sutura, abdomine pedibusque ferrugineis. *Fn. suec.* 848. *
Habitat in Europa.

silphoides. 11. St. niger, thoracis lateribus pedibusque lividis, elytris lividis: margine maculaque longitudinali nigris.
Habitat in Europa, *obtuso similis.*

subterraneus. 12. St. niger, elytris anterius extrorsum flavis, pedibus nigris. *Fn. suec.* 849. *
Habitat in Europa.

flavescens. 13. St. ater, pedibus rufis, elytrorum margine flavo. *Fn. suec.* 850. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 336. *n.* 10. *mant. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 16.
Habitat in Europa *boreali.*

biguttatus. 15. St. niger, elytris puncto fulvo. *Fn. suec.* 851. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 336. *n.* 13. *mant. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 20. Staphylinus niger, elytris puncto albido, oculis prominulis.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 371. *n.* 24?
Mull. zool. dan. prodr. p. 99. *n.* 1123?
Habitat ad littora maris baltici.

cicindeloides. 37. St. niger rugosus, antennis pedibusque testaceis: geniculis nigris. *Schaller Abh. der hall. naturf. Ges.* 1. *p.* 324.
Habitat Halæ Saxonum, *statura & magnitudine biguttati.*

bipustulatus. 16. St. niger, elytris puncto ferrugineo. *Fn. suec.* 847. * *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 336. *n.* 12. *mant. inf.* 1. *p.* 221. *n.* 18.
Habitat in Europa *boreali, antennis extrorsum crassioribus.*

ana-

analis. 38. St. ater nitidus, antennis, elytris, ano pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 19.
Habitat Kilonii, *bipuſtulato major.*

clavicornis. 39. St. niger immaculatus, thorace rotundato lævi, antennis extrorſum craſſioribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 14. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 25. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 371. *n.* 25?
β) *Scop. ent. carn. n.* 303. Staphylinus clavicornis.
Habitat Kilonii, β) *pedibus rufis ſub* Carniolæ *pyri cortice.*

Cantharellus. 17. St. niger, elytris glaucis apice flavicantibus. *Habitat in* Suecia *ad* Hammarby, *cantharidi biguttatæ ſimillimus.*

littoreus. 18. St. niger, elytris anterius griſeis, pedibus rufis. *Fn. ſuec.* 852. * *It. gotl.* 173.
Habitat in littoribus.

ſanguineus. 19. St. niger, elytris ſanguineis. *Fn. ſuec.* 853. *
Habitat in Europa.

caraboides. 20. St. flavus immaculatus. *Fn. ſuec.* 854. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 337. *n.* 23. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 33.
Fn. ſuec. 613. Staphylinus totus teſtaceus.
Degeer inſ. 4. *p.* 25. *n.* 12. Staphylinus fulvus.
Habitat in Europa *boreali.*

chryſomelinus. 21. St. niger, thorace elytris pedibusque teſtaceis. *Fn. ſuec.* 855. * *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 685. *n.* 21. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 28.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 368. *n.* 18.
Habitat in Europa *boreali.*

fuſcipes. 22. St. niger, elytris pedibusque teſtaceis. *Fn. ſuec.*

fuec. 857. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 15. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 22.
Habitat in Europæ *ſtercore.*

hypnorum. 40. St. ater lævis, thoracis lateribus, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 336. *n.* 16. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 23.
Habitat in Angliæ *hypnis.*

nitidulus. 41. St. ater, thoracis marginibus flaveſcentibus, elytris ferrugineis: margine nigro. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 337. *n.* 17. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 24.
Habitat in Anglia.

atricapillus. 42. St. thorace rufo, elytris fuſcis: puncto baſeos margineque poſteriore albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 337. *n.* 19. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 25.
Habitat in Anglia.

marginellus. 43. St. ater, elytrorum margine laterali & poſteriore ferrugineis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 337. *n.* 20. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 26.
Habitat in Angliæ *ſtercore, mediæ magnitudinis.*

canaliculatus. 44. St. flavus, capite abdominisque cingulo atris, thorace canaliculato. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 29.
Habitat Kilonii, *parvus.*

tricolor. 45. St. ater, antennis thoraceque rufis, elytris pedibusque teſtaceis. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 30.
Habitat in Daniæ *boletis, parvus.*

rufipes. 24. St. ater glaber, pedibus rufis. *Fn. ſuec.* 858. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 337. *n.* 22. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 31.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 367. *n.* 19. Staphylinus niger, &c. *De-*

Degeer inſ. 4. *p.* 24. *n.* 11. *t.* 1. *f.* 14. Staphylinus ovatus glaber, &c.
Habitat in Europa, *interdum teſtaceus, aut niger, pedibus teſtaceis.*

melanocephalus. 46. St. ferrugineus, capite atro. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 32.
Habitat in Suecia, *minutus.*

rugoſus. 47. St. niger, thorace elytrisque rugoſis. *Fab. ſp. inſ.* 1. *p.* 338. *n.* 24. *mant. inſ.* 1. *p.* 221. *n.* 34.
Habtiat in Anglia.

piceus. 25. St. niger, elytris piceis, thorace depreſſo: lineis elevatis tribus. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 338. *n.* 25. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 35.
Habitat in Europa *boreali, pediculi magnitudine, ſed magis oblongus.*

boleti. 26. St. fuſcus, elytris pallidioribus, antennis pedibusque lividis. *Fn. ſuec.* 859. *
Habitat gregarius in boletis abietinis, *quorum fiſtulas tanquam apis ſuas fiſtulas intrat, pulice dimidio minor.*

obſcurus. 48. St. niger opacus obſolete punctatus, antennis baſi fuſcis, verſus apicem incraſſatis. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 6. *p.* 149. *n.* 8:
Habitat Berolini, *magnitudine politi, ſtatura murini.*

tricornis. 49. St. niger, fronte bicuſpidata, thorace poſterius cornuto, elytris rubris: margine ſuperiori & interiori nigricante. *Herbſt apad Fuessli arch. inſ.* 6 *p.* 149. *n.* 9. *t.* 30. *f.* 8. c.
Habitat rarior Berolini, *polito tertia parte minor.*

blattinus. 50. St. ater, thorace lato, elytris pedibusque teſta-

ſtaceis nitidis. *Schranck inſ. auſtr. p.*236. *n.*447.
Habitat in Auſtria *in terra, habitu blattæ lucifugæ.*

minor. 51. St. niger glaber, elytris pallide, antennis baſi fuſcis, pedibus luteis. *Mull. prodr. zool. dan. p.* 97. *n.* 1096.
Habitat in Europa *boreali, ultra* 3 *lineas longus.*

ſaxatilis. 52. St. ater nitidus ſubpubeſcens, elytris pedibus abdominisque apice teſtaceis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 234. *n.* 442.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 365. *n.* 13.
Habitat in Germania & Gallia, *in terra ſub lapidibus, minore minor.*

ſimilis. 53. St. niger, pedibus luteis: femorum apice nigro. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.*6. *p.*151. *n.*15.
Habitat Berolini, *ſtatura & magnitudine biguttati.*

Domicella. 54. St. niger, thorace elytris pedibusque badiis. *Schranck inſ. auſtr. p.* 235. *n.* 444.
Habitat in Auſtria *ſuperiori*, 2 *lineas longus.*

glaberrimus. 55. St. niger nitidus, antennis apicem verſus incraſſatis: articulo primo longiſſimo. *Herbſt apud Fuessli arch. inſ.* 6. *p.* 151. *n.* 17.
Habitat Berolini, 4 *circiter lineas longus.*

buphtalmos. 56. St. niger immaculatus, oculis magnis exſertis. *Schranck Beytr. zur. Naturg. p.* 72. §. 21. *inſ. auſtr. p.* 235. *n.* 445.
Habitat in Auſtria *ad hortorum muros.*

ophthalmicus. 57. St. atro-cæruleus punctatus, oculis macula pallida lunulata ſuffuſſis. *Scop. ent. carn. n.* 300.
Habitat in Carniola.

fulvipes. 58. St. atro-cæruleus, palpis pedibusque fulvis. *Ha-*

Habitat in Carniola.

brassicæ. 59. St. ferrugineus, capite & corpore nigris, elytris punctatis, antennis extrorsum crassioribus villosis. *Scop. ent. carn. n.* 309.
Habitat in Carniolæ *brassica.*

arnicæ. 60. St. niger, thorace antennisque ferrugineis, pedibus testaceis. *Scop. ent. carn. n.* 310.
Habitat in Carniolæ *arnica.*

hellebori. 61. St. niger, elytris, antennis pedibusque ferrugineis. *Scop. ent. carn. n.* 311.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 366. *n.* 14 ?
Habitat in Carniolæ *hellebore*, & Gallia.

fossor. 62. St. fusco-rufus, elytris apice pedibusque rufis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 109. *n.* 105.
Habitat in fungis metallorum Schemnizensium.

fodinarum. 63. St. cæruleſcens villosus, tarsis rufis. *Scop. ann. hist. nat.* 5. *p.* 109. *n.* 106.
Habitat ad ligna cuniculorum Schemnizensium, *statura fossoris.*

niger. 64. St. totus niger, capite thoraceque nitido non punctato. *Mull. prodr. zool. dan. p.* 98. *n.* 1109.
Fn. Fridrichsd. p. 23. *n.* 229.
Habitat in Dania.

cursor. 65. St. niger, thorace depresso: litura duplici, elytris pedibusque flavis. *Mus. zool. dan. prodr. p.* 97. *n.* 1095.
Habitat in Dania.

agarici. 66. St. luteus, capite nigro, abdomine rufo. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 97. *n.* 1097.
Habitat in Daniæ *agaricis.*

la-

latus. 67. St. niger, elytrorum fummo margine poſteriori pedibusque flavis. *Mull. zool. dan.prodr.p.97. n.* 1011.
Habitat in Dania.

penetrans. 68. St. niger, antennis, elytris pedibusque caſtaneis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 97. *n.* 1102.
Habitat in Dania.

vernalis. 69. St. fulvus, elytris anterius, abdomineque poſterius nigris, medio rufo. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 98. *n.* 1103.
Habitat in Dania, *facie chryſomelini, vere potiſſimum conſpicuus.*

marginalis. 70. St. niger, thoracis marginibus, elytris, pedibus abdominisque apice flavis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 98. *n.* 1107.
Habitat in Dania.

fuſcicornis. 71. St. niger, capite thoraceque nitidis, elytris margine inferiore antennisque lividis. *Mull.zool. dan. prodr. p.* 98. *n.* 1112.
Habitat in Dania.

floreus. 72. St. niger, thorace convexo punctulato, elytris pedibusque flavis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 99. *n.* 1117.
Habitat in Daniæ *floribus.*

fracticornis. 73. St. linearis niger, pedibus antennisque fuſcis: infimo articulo atro. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 99. *n.* 1118.
Habitat in Dania.

formicarius. 74. St. linearis niger, infimo antennarum articulo atro. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 99. *n.* 1119.
Habitat in Dania, *aliquando rufus, capite & abdomi-*

mine, aut etiam thorace, aut insimul elytris nigris.

punctatus. 75. St. atro-cæruleus, femoribus testaceis. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 99. *n.* 1121. *Act. Nidros.* 4. *p.* 36.
Habitat in Dania.

striatus. 76. St. ater, thorace punctato striatoque. *Mull. zool. dan. prodr. p.* 99. *n.* 1122. *act. Nidros.* 4. *p.* 35.
Habitat in Dania.

spinipes. 77. St. niger, pedibus testaceis, tibiis spinosis. *Pontopp. Naturg. Dannem. p.* 211. *n.* 9. *t.* 16.
Habitat in Dania.

tataricus. 78. St. totus ater nitidus, thorace cylindrico capite angustiore, elytris subtilissime punctatis. *Pall. it.* II. *app. n.* 74.
Habitat ad lacum Tatariæ *salsum* Inderiensem, *maximus, gracilis, longus, glaberrimus.*

pubescens. 79. St. villosus nigro-fuscus, nigro viridi griseoque maculatus, subtus argenteus, abdominis apice subrotundato. *Degeer inf.* 4. *p.* 17. *n.* 2.
Habitat in Europa *in terra & fimo*, $6\frac{1}{2}$ *lineas longus.*

chalcocephalus. 80. St. obscure fuscus, capite thoraceque æneis nitidis, tibiis fasciisque rufo-fuscis. *Degeer inf.* 4. *p.* 22. *n.* 8.
Habitat in Europa, *polito paulo minor.*

æneus. 81. St. glaber æneo-viridis nitidus, abdomine pedibusque nigris. *Degeer inf.* 4. *p.* 23. *n.* 9. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 367. *n.* 17.

Mull.

Cui tribui accensenda species 56-92, incertum.

Mull. zool. dan. prodr. p. 98. *n.* 1110.
Habitat in Europa, 4 *lineas longus.*

glaber. 82. St. niger nitens, elytris lævibus pedibusque teſtaceis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 364. *n.* 10.
Mull. zool. dan. prodr. p. 98. *n.* 1106.
Habitat in Europa.

glaucus. 83. St. atro-cæruleſcens, extremo antennarum articulo lunulato. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 361. *n.* 2.
Habitat in Gallia.

macropterus. 84. St. ater, elytris thorace duplo longioribus. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 362. *n.* 4.
Habitat in Gallia.

ochrocephalus. 85. St. pubeſcens, capite flavo, thorace elytrisque fuſco nigroque nebuloſis: punctis impreſſis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 363. *n.* 8.
Habitat in Gallia.

punctulatus. 86. St. niger nitens, elytris punctatis pedibusque teſtaceis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 365. *n.* 11.
Habitat in Gallia.

curtulus. 87. St. niger nitens, thorace plano marginato, elytris punctatis pedibusque fuſcis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 365. *n.* 12.
Habitat in Gallia.

ſulcatus. 88. St. niger, thorace marginato ſulcato, pedibus rufis. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 730. *n.* 45.
Habitat in Gallia.

limbatus. 89. St. niger, elytris fuſcis: margine flavo. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 368. *n.* 19.
Habitat in Gallia, *flaveſcente multo major.*

ma-

maculatus. 90. St. niger, thorace utrinque elytrisque macula flava. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 369. *n.* 20.
Habitat in Gallia.

rubricollis. 91. S. atro-cæruleſcens: thorace rubro. *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 370. *n.* 23.
Habitat in Gallia.

cylindricus. 101. St. cylindricus totus ater glaber. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 967.
Habitat in Europa.

dichrous. 102. St. ater, capite thoraceque glabris, elytris fuſco-ferrugineis, antennarum baſi & articulis quinque ultimis plantisque ferrugineis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 970.
Habitat in Europa.

picatus. 103. St. ater, capite thoraceque piceis glabris. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 972.
Habitat in Europa.

glabra. 104. St. ater glaber. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 973.
Habitat in Europa.

erythropus. 105. St. ater, antennis, pedibus elytrisque rufis: his baſi nigris. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 974.
Habitat in Europa.

cruentatus. 106. St. ater, elytris ſingulis diſco gutta ſanguinea. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 975.
Habitat in Europa.

lugubris. 107. St. niger, antennis, elytris pedibusque fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 976.
β) St. ater, elytris, antennis pedibusque fuſco-teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 982.
Habitat in Europa.

bi-

biclavatus. 108. St. ater glaber, elytris pedibusque fuſco-teſtaceis, antennis biclavatis: baſi longa clavata atra. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.*978.
Habitat in Europa.

rufeſcens. 109. St. capite thoraceque atris punctatis, abdomine nigro, elytris, antennis pedibusque fuſco-rufeſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 979.
Habitat in Europa.

cephalotes. 110. St. ater, capite magno, elytris fuſcis, antennis ferrugineis, pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 980.
Habitat in Europa.

brevipes. 111. St. ater, elytris pedibusque teſtaceis, tibiis brevibus. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 981.
Habitat in Europa.

marginellus. 112. St. niger, thoracis abdominisque marginibus, antennarum baſi, elytris pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 982.
Habitat in Europa.

hæmorrhoidalis. 213. St. ater, thorace utrinque impreſſo, elytris, pedibus, ore anoque teſtaceis. *Muſ. Lesk.p.*44. *n.* 983.
Habitat in Europa.

craſſipes. 114. St. ater, thorace longo ſubquadrato glabro, elytris fuſcis, antennis pedibusque rufeſcentibus, femoribus anticis craſſis. *Muſ. Lesk. p.*44. *n.* 986.
Habitat in Europa.

flavicornis. 115. St. ater, punctis elevatis minimis undique obſeſſus, antennis flavis apice fuſcis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 990.
Habitat in Europa.

li-

lituratus. 116. St. ater, elytris teſtaceis, baſi macula communi & in medio ad marginem externum utrinque macula fuſca, antennis pedibusque teſtaceis. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 991.
Habitat in Europa.

alatus. 117. St. fuſcus, elytris longis, pedibus rufo-fuſceſcentibus. *Muſ. Lesk. p.* 44. *n.* 992.
Habitat in Europa.

** *palpis poſterioribus ſecuriformibus*, Oxypori Fabricii.

rufus. 6. St. rufus, capite elytrorum abdominisque poſterioribus, femoribus baſi nigris. *Fn. ſuec.* 844. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 338. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 1. *Scop. ent. carn.* 307.
Geoffr. inſ. par. 1. *p.* 370. *n.* 22. Staphylinus flavus.
Gadd ſat. 80. Staphylinus pallide rufus elytris cæruleſcentibus, capite & apice abdominis nigris.
Degeer inſ. 4. *p.* 24. *n.* 10. *t.* 1. *f.* 11. 12.
Schaeff. ic. t. 35. *f.* 3.
Habitat in Europæ *boletis.*

lunulatus. 7. St. rufus, capite abdominis elytrorumque poſticis nigris, femoribus totis rufis. *Fn. ſuec.* 845.*
Fabr. ſp. inſ. 1. *p.* 338. *n.* 2. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 2. Oxyporus flavus, elytris nigris baſi apiceque pallidis.
Habitat in Europæ *boletis.*

parvus. 92. St. flavus, elytris baſi anoque atris. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 3.
Habitat Kilonii, *antennis flavis apice fuſceſcentibus.*

thoracicus. 93. St. nitidicans, thorace rufo, elytris fuſcis baſi albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 338. *n.* 3. *mant. inſ.* 1. *p.* 222. *n.* 4. *Ha-*

Habitat Kilonii *in boletis.*

pygmæus. 94. St. nigricans, thorace elytrisque pallidis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 339. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 222. *n.* 5.
Habitat Kilonii *in boletis.*

flavipes. 22. St. niger, elytris, antennis pedibusque ferrugineis. *Fn. fuec.* 856. *
Fabr. sp. inf. 1. *p.* 339. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 222. *n.* 6. Oxyporus niger, elytris tibiisque fuscis.
Habitat in Europæ *boletis.*

abdominalis. 95. St. rufus, abdomine atro nitido. *Fabr. sp. inf.* 2. *app. p.* 501. *mant. inf.* 1. *p.* 222. *n.* 7.
Habitat in Norwegia, *reliquis hujus tribus minor.*

*** *palpis anterioribus clavatis*: Pæderi Fabricii.

riparius. 9. St. rufus, elytris cæruleis, capite abdominisque apice nigris. *Fn. fuec.* 846. * *It. gotl.* 173. *Degeer inf.* 4. *p.* 28. *n.* 14. *t.* 1. *f.* 1. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 339. *n.* 1. *mant. inf.* 1. *p.* 223. *n.* 1.
Scop. ent. carn. 308. Staphylinus gregarius.
Geoffr. inf. par. 1. *p.* 369. *n.* 21.
Schaeff. ic. t. 71. *f.* 3.
Habitat ad Europæ *ripas frequens.*

ruficollis. 69. St. niger, thorace rufo, elytris cyaneis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 339. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 223. *n.* 2.
Herbst apud Fuessli arch. inf. 8. *t.* 48. *f.* 5. a. b.
Habitat in Germania *sub lapidibus.*

elongatus. 14. St. niger, elytris posterius, pedibus antennisque ferrugineis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 339. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 223. *n.* 3. Pæderus niger, elytris postice pedibusque fulvis.
Habitat in Europa *boreali.*

218. FORFICULA. *Antennæ* ſetaceæ.
Palpi inæquales, filiformes.
Elytra dimidiata. *Alæ* tectæ.
Cauda forcipata.

auricularia. 1. F. elytra apice albis, antennis 14-articulatis.
Fn. ſuec. 860. *Geoffr. inſ. par.* 1. *p.* 375. *n.* 1.
Scop. ent. carn. 312. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 340. *n.* 1. *mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 1.
Degeer inſ. 3. *p.* 545. *n.* 1. *t.* 25. *f.* 16. Forficula major.
Mouff. inſ. 171. *f. inſ.* Forficula auricularia vulgaris.
Petiv. gaz. t. 74. *f.* 5. Forficula vulgaris.
Liſt. ſcar. angl. p. 391. *mut. t.* 31. *f.* A. Scarabæus ſubrufus, cauda furcata.
Friſch. inſ. 8. *p.* 31. *t.* 15. *f.* 1. 2. Vermis auricularius.
Fonſt. inſ. t. 16. *f.* 2.
Merian. inſ. t. 30.
Sulz. inſ. t. 7. *f.* 50.
hiſt. inſ. t. 7. *f.* 17.
Schaeff. elem. t. 63.
icon. t. 144. *f.* 3. 4.
Habitat in Europæ *fructibus frequens; aures dormientium interdum intrans, ſpiritu frumenti pellenda.*

gigantea. 3. F. pallida ſupra nigro variegata, ano bidentato: forcipe porrecta unidentata. *Fabr. mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 2.
Herbſt apud Fuessli arch. inſ. 8. *t.* 49. *f.* 1. Forficula bilineata.
Habitat in Europa *magis auſtrali, maxima.*

Forficulæ *larvæ agiles curſitant.*

bipunctata. 4. F. nigra, capite posterius pedibusque rufis, elytris macula alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 340. *n.* 2. *mant. inf.* 1. *p.* 224. *n.* 3.
Habitat in Italia, *antennis* 11-*articulatis.*

albipes. 5. F. atra, thorace posterius, elytris basi alis pedibusque albis. *Fabr. mant. inf.* 1. *p.* 224. *n.* 4.
Habitat in insulis Americæ *meridionali oppositis, mediæ magnitudinis.*

minor. 2. F. elytris testaceis immaculatis, antennis 10-articulatis. *Fn. suec.* 861. * *Geoffr. inf. par.* 1. *p.* 376. *n.* 2. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 340. *n.* 3. *mant. inf.* 1. *p.* 224. *n.* 5.
Fn. suec. 600. Forficula alis elytro concoloribus. *Degeer inf.* 3. *p.* 553. *n.* 2. *t.* 25. *f.* 26. 27. *Schaeff. ic. t.* 41. *f.* 12. 13.
Habitat rarior in Europa, *antennarum apice albido.*

flexuosa. 6. F. forcipe flexuosa, elytris punctis duobus flavis. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 341. *n.* 4. *mant. inf.* 1. *p.* 224. *n.* 6.
Habitat in Cayenna.

dentata. 8. F. fusca, antennis 10-articulatis, thoracis marginibus pedibusque pallidis, forcipe basi dentata. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 341. *n.* 5. *mant. inf.* 1. *p.* 224. *n.* 7.
Habitat in Madera.

parallela. 8. F. nigra, thoracis marginibus elytris pedibusque pallidis, forcipe recta inermi. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 341. *n.* 6. *mant. inf.* 1. *p.* 224. *n.* 8.
Habitat in Madera.

Morio. 9. F. atra, antennis fascia alba. *Fabr. sp. inf.* 1. *p.* 341. *n.* 7. *mant. inf.* 1. *p.* 224. *n.* 9.
Habitat in Tahiti.

pal-

palli-pes. 10. F. forcipe elongata unidentata nigra, pedibus albis. *Fabr. ſp. inſ.* 1. *p.* 341. *n.* 8. *mant. inſ.* 1. *p.* 224. *n.* 10.
Habitat in inſulis Promontorii viridis.

livida. 11. F. livida minima, forcipe ad lentem dentata. *Muſ. Lesk. p.* 46. *n.* 3.